


РФ - С 66532

1238/180 99


02.55

19,5 x 12,5 x 2,0




~ 33194 07

08



11



1792^{го} въ ноябре дана 1^{ша} 30^{го} въ Москве

С 66532

ВРАЧЕБНЫЯ НАСТАВЛЕНІЯ

О

616.5
п 38

ЛЮБОСТРАСТНЫХЪ
БОЛѢЗНЯХЪ,

616.5

кои приключаются въ разныхъ частяхъ
человѣческаго тѣла,

сочиненныя

Славнымъ врачомъ *И. И. ПЛЕЖКОМЪ.*

Съ Латинскаго на Россійскій языкъ

предложилъ

НЕСТОРЪ МАКСИМОВИЧЪ - АМБОДИКЪ

Надворный Совѣтникъ,

Медицины Докторъ и Профессоръ повиваль-
наго искусства.

Подъ вѣдѣніемъ Государственной Медицин-
ской Коллегіи.

502

Во градѣ С. Петра.

Печатано при Император. Акад. Наукъ.

1790 года.

С.-Петербургская

Общественная Библиотека

Императорской Академии Наукъ

РФ. С - 66532

616.5

П - 38

Нѣтъ ни единого столь сильнаго средства,
могущаго предохранить отъ необузданной
похоти, какъ сіе, когда кто тасто и со вни-
маніемъ станетъ разсматривать тѣ неща-
стнѣйшія, любострастнымъ недугомъ снѣ-
даемыя жертвы, кои въ особыхъ больницахъ,
наросито для врачеванія сего болѣзни укреж-
денныхъ, собранны находятся.

Фонъ Свитенъ.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ЕГОРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ

НАУМОВУ,

ГЕНЕРАЛУ МАЮРУ,

Военной коллегіи

ЧЛЕНУ,

ГЕНЕРАЛЬ-КОНТРОЛЕРУ,

и

ордена св. Владимира 2 степени

КАВАЛЕРУ,

Милоспивому Государю,

Усерднѣйшее приношеніе.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

1897

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ!

Угодно было вашему превосходительству препоручить мнѣ переводъ
сея нужныя и прелозныя книги, иле-
нцемыя; врачебныя наставленія о лю-
боспращныхъ болѣзняхъ, приключаются
въ разныхъ частяхъ человѣческаго шѣ-
ла; которую преложенную на росій-
скій языкъ, и впервыя нынѣ налетатан-
ную иждивеніемъ вашимъ, посвящаю
имени вашего превосходительства, яко
плодъ полетительному виновнику сего
принадлежащій. Сколь для меня было
лестно и пріятно видѣть и слышать
отъ собственныхъ устъ вашихъ, что
вы милостивый государь! и послѣд-
нія минуты, отъ исправленія воинска-
го званія вашего остающіяся, изволите
употреблять на ттеніе врачебныхъ со-
тиненій! Коликимъ удовольствіемъ вос-
хищались вы, предвидя будущую и отъ
сего сотиненія пользу! Въ самолюбѣ, по-
летеніемъ вашимъ, трезвѣ сіе доставляется
теперь лучшій и надежнѣйшій способъ, ко

Х

увра-

уврачеванію той опасной и повсюду укоренившейся болѣзни, которая почти вездѣ всякій возрастъ и полъ заражаетъ. Симъ одолжены вамъ будутъ особливо тѣ сожалѣнія достойные юноши, кои слѣпо иногда слѣдуя волненію необузданныхъ страстей, содѣлавшись больными, безразсудно стыдятся, просятъ совѣта, помощи и наставленія въ семъ слугѣ у благоразумнаго врача или лѣкаря. О! когда бы Россійское общество получило отъ сего новаго преложеннаго сочиненія столько пользы, сколько оную уже востуговствовали всѣ тѣ, кои вѣдая языкъ, на коемъ оно отъ изобрѣтателя издано, давно уже имъ пользуются! Съ симъ желаніемъ, имѣю счастье быть всегда со глубочайшимъ почитаніемъ.

Милостивый государь.

ВАШЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА

Всепокорнѣйшій слуга

Н. Максимовичъ-Амбодикъ.

ПРЕДИСЛОВІЕ

Отъ сочинителя.

Каждому врачу, въ цѣлительной наукѣ упражняющемуся извѣстно, что ни одна болѣзнь, не токмо въ многочисленныхъ городахъ, но даже и въ самыхъ малыхъ деревенскихъ селеніяхъ, столь частою не бываетъ, какъ любострастная, или вообще называемая французская. Для сея причины весьма прилично оную названъ можно безпрерывною и пошленно вездѣ распространяющеюся заразою; копорю юноши превосходныхъ дарованій, въ самомъ цвѣтущемъ ихъ возрастѣ, либо совсѣмъ отъ человѣческихъ обществъ истребляются, либо повреждаются и обезображиваются такъ, что къ отправленію разныхъ должностей совершенно неспособными дѣлаются. А какъ настоящая заразительная болѣзнь, или прилипчивая чума, рѣдко случается; напротивъ того любострастная зараза всегда и вездѣ свирѣпствуетъ; въ разсужденіи сего, со врачомъ Мидомъ, смѣло могу сказать, что весь человѣческій родъ давно бы уже отъ любострастного яда искоренился, если бы жестокая сея заразы свирѣпость,

II. П Р Е Д И С Л О В І Е

съ того времени, какъ она въ наши страны вывезена, сама собою не ослабѣла, и новоизобрѣшеннымъ прошивудѣйствующимъ лѣкарственнымъ средствомъ укрощена и обезсилена не была.

Сія прегнусная болѣзнь, купно со прочими заразами, имѣетъ общее сіе, что одна токмо нечистая женщина можетъ заразить многія семейства, села, деревни, и многолюдныя общества; какъ въ томъ насъ удостовѣряютъ многія врачебныя наблюденія, надъ кормилицами, любострасшнымъ ядомъ зараженными, учиненныя.

Сверхъ того, сія болѣзнь часто отъ родителей сообщается не токмо собственнымъ ихъ дѣтямъ, но и поздымъ ихъ потомкамъ, обыкновенно бываетъ наслѣдственною, и причиняетъ разныя многообразныя болѣзни, коихъ угадка и лѣченіе весьма часто врачей обманываютъ. На послѣдокъ не столько сія самая зараза, сколько худое и неисправное лѣченіе, погубляютъ многихъ людей, оною спраждающихъ; ибо едва не каждый деревенскій мужикъ, бородобрѣй, площадный лѣкарь или шарлашанъ, а особливо прислуживыя шарушки, пользуясь чужею легковѣрностію, въ тайнѣ осмѣливаются предпринимать
лѣ-

ПРЕДИСЛОВІЕ III.

лѣченіе таковыхъ болящихъ; а особливо по тому, что таковые несчастные больные, будучи угрызаемы совѣсшю, что они нѣкогда пользовались скрышными любовными дѣлами, безразсудно сшыдаясь въ семъ случаѣ просить совѣта и наспавленія у благоразумнаго врача или лѣкаря.


Для сихъ то причинъ я имѣю обыкнове-
ніе, каждаго года моимъ слушателямъ препода-
вавшъ цѣлой кругъ лекцій особо о любо-
спрасшныхъ болѣзняхъ; симъ самымъ поряд-
комъ, коимъ и здѣсь оныя читашелю предла-
гаю. Мой образецъ лѣченія сея болѣзни, по-
средствомъ камединной ртуты, о коемъ отъ
меня сообщено свѣсту еще въ 1766 году, снова
нынѣ похваляю и въ дѣйство оной произ-
водишь совѣшную. Сіе я дѣлаю не изъ пуста-
го щеславія, не съ шѣмъ намѣреніемъ, дабы
чрезъ то получишь шолько имя изобрѣта-
теля, и не для шого, чшобъ славнымъ во
врачебномъ искусствѣ мужамъ прошивурѣчишь.
Таковая глупая дерзость и неблагодарность
совѣмъ прошивны моему намѣренію. Но един-
ственно сіе шворю, искусившись въ томъ
двадцатилѣшнейю моею практикою; въ про-
долженіи копорой, съ великимъ успѣхомъ
производилъ я въ дѣйство сей же самый обра-

IV. П Р Е Д И С Л О В І Е

зецъ лѣченія для многочисленныхъ больныхъ, коихъ прощѣе ршущныя составы медлишельнѣе, или опаснѣе выпользовали, либо не совершенное имъ приносили врачеваніе. На послѣдокъ опыты въ разныхъ иностранныхъ государствахъ, какъ то въ Англіи, Франціи, Швеціи и въ другихъ областяхъ, отъ ученыхъ мужей, надъ камединою ршутью учиненные, удостовѣрили и самого меня въ томъ, что мой образецъ лѣченія заразительной болѣзни есть дѣйствителенъ и благоуспѣшенъ.

А какъ я самъ дозналъ собственнымъ опытомъ, чрезъ цѣлые два года сряду еще и то, что опіумъ, т. е. маковой сокъ, или сонное зѣлье имѣетъ въ сей же болѣзни преудивительное дѣйствіе; того ради весьма часто въ моей практикѣ смѣшивая сіе лѣкарство со ршутью, употребляю какъ внѣ такъ и внутренно.

Въ прочемъ, сверхъ порядка способствующаго ко преподаванію Академическихъ лекцій, какую именно еще другую пользу произвелъ я симъ сочиненіемъ моимъ; о томъ другимъ ученымъ людямъ впредъ судить предѣоставляю.



ОГЛАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЙ.

Часть первая.

	страницъ.
I. О болѣзняхъ любострастныхъ вообще.	1.
<i>Болѣзни внѣшнія любострастныя.</i>	
II. Болѣзни дѣтороднаго уда мужскаго. m. penis.	
Бѣлая грыжа любострастная. Gonorrhoea.	13.
Трудное мочеиспущеніе. Dysuria.	20.
Мочезадержание или запоръ мочи. Ischuria.	22.
Пузырки кристалловидные Vesiculae crystallinae.	26.
Пупырышки и бугорки дѣтороднаго уда мужскаго. Tubercula penis.	27.
Язвы плѣшки. Ulcera glandis.	28.
Шанкръ. Cancer glandis.	29.
Язвы мочеиспускательнаго стѣвола. Ulcera urethrae.	31.
Незалупа. Phymosis.	32.
Залупа незалупная. Paraphymosis.	34.
Приапизмъ, напряженіе или возстаніе плоти. Priapismus.	35.
Похоть любострастная. Satyriasis.	36.
Корча или скорченіе плоти. Curvatura penis.	37.
Невстаниха. impotentia virilis.	39.
III. Болѣзни сѣменниковъ или ядеръ. Morbi testiculorum.	
Воспаленіе ядеръ. Testiculorum inflammatio.	40.
Затвердѣлость ядеръ. — induratio.	41.
Язвы мошонки. Ulcera scroti.	42.
IV. Болѣзни предстательной железы. Morbi glandulae prostaticae.	

Воспа-

VI. оглавленіе содержаній.

Воспаленіе. Prostatæ inflammatio.	44.
Нарывъ. — abscessus.	46.
Скирръ или окръплая затвердѣлость. — scirrhus.	— 48.
V. <i>Болѣзни промежности проходной и зад-</i> <i>няго прохода. Morbi perinaei et ani.</i>	
Свищъ промежности проходной. Fistula perinaei.	50.
Свищъ задняго прохода. Fistula ani.	52.
Сожаніе. Arctura ani.	— 53.
Опухоли или нарощенія. Condylomata.	—
VI. <i>Болѣзни паховыя. Morbi inguinalium.</i>	
Паховики. Bubones.	— 56.
Затвердѣлость Окрѣпость сала, или шука. Physonia.	— 62.
VII. <i>Болѣзни кожныя. Morbi cutanei.</i>	
Пятна. Maculae.	— —
Чесотка. Scabies.	— 63.
Трѣщины. Rhagades.	—
Пупырышки. Psudrasia.	— 64.
Лишай. Herpes.	— 65.
Струпья головныя. Tinea.	—
Низпаденіе власовъ. Alopecia.	66.
Порча ногшей. Unguium corruptio.	67.
Зудъ, или свербѣжъ. Pruritus.	—
Проказа. Lepra.	— 68.
Язвы. Ulcera.	— 69.
VIII. <i>Болѣзни очныя. Morbi oculorum.</i>	
Окоболѣніе. Ophthalmia.	70.
Гноемеченіе. Lippitudo.	73.
Пятна роговой оболочки. Corneae maculae.	74.
Язвы. — ulcus.	— 75.
Загноеніе очной камеры. Nuporyum.	76.
Свищъ слезный. Fistula lacrymalis.	77.
Ячменедъ. Hordeolum.	—

БѢЛЪ-

Бѣльмо. Cataracta.	—	78.
Сѣкота или помраченіе зрѣнія. Amaurosis.		79.
IX. Болѣзни ушныя. <i>Morbi aurium.</i>		
Глухота. Sordosis.		80.
Гноемеченіе. Otorrhoea.		—
X. Болѣзни носовыя. <i>Morbi nasum.</i>		
Насморкъ. Coryza.	—	82.
Язва носовая. Ozaena.	—	83.
Безобразіе носа. Deformitas nasi.		84.
Безгласіе. Paraphonia.	—	85.
XI. Болѣзни устныя. <i>Morbi oris.</i>		
Молочница. Aphthae.	—	86.
Язвы нѣба. Ulcera palati.		88.
Чесотка или короста браны. Scabies menti.		89.
XII. Болѣзни выйныя и гортанныя. <i>Morbi colli et faucium.</i>		
Зобы выйные. Scrophulae.		—
Жаба. Angina.	—	90.
XIII. Болѣзни костныя. <i>Morbi ossium.</i>		
Костная опухоль. Tumor.	—	92.
Коспный наростъ. Hyperostosis.		94.
Костеѣдица. Caries.	—	95.
Гниль внутрѣкостная. Spina ventosa.		96.
Размягченіе костей. Mollities.		97.
Ломкость. Fragilitas.	—	98.
XIV. Болѣзни суставовъ. <i>Morbi articulationum.</i>		
Опухоли. Ganglia.	—	99.
Сращенія. Anchylosis.	—	100.
XV. Болѣзни любовнастрастныя женскаго пола. <i>Morbi venerei mulierum.</i>		
Теченіе бѣли. Morbi genitalium muliebrium.		102.
Воспаленіе дѣшородныхъ частей. Leucorrhoea.	—	106.
		Замвер.

VIII. оглавление содержаній.

Затвердѣлость дѣтородныхъ частей. <i>Phlogosis genitalium.</i>	—	108.
Язвы вѣшнія. <i>Ulceræ vulvæ.</i>		109.
Язвы рукава матки. — <i>vaginae.</i>		111.
XVI. Болѣзни матки. <i>Morbi uteri.</i>		
Превращеніе кровоспечения. <i>Menostasia.</i>		114.
Уязвленіе матки. <i>Exulceratio uteri.</i>		115.
Воздушно-водяная болѣзнь. <i>Timpanites uteri.</i>		116.
XVII. Болѣзни сосцовъ. <i>Morbi mammarum.</i>		
Воспаленіе сосцовъ. <i>Mammarum inflammatio.</i>		117.
Язва. — <i>ulcus.</i>	—	118.
Ракъ. — <i>Carcinoma.</i>	—	119.

• Часть вторая.

Болѣзни внутреннія любострастныя.

I. Лихорадки любострастныя. <i>Febres venereae.</i>		
Лихорадка любострастная простая. <i>Venerea simplex.</i>	—	122.
— — Воспалительная. — <i>inflammatoria.</i>		123.
— — Медлѣнная. — <i>lenta.</i>		124.
— — Желчная. — <i>biliosa.</i>		—
— — Перемежающаяся. — <i>intermittens.</i>		125.
II. Судорги и корчи. <i>Spasmi.</i>		
Судорга повсюдная. <i>Tetanus.</i>		126.
Падучая болѣзнь. <i>Epilepsia.</i>		127.
III. Болѣзни разслабляющія тѣло. <i>Adynamiae.</i>		
Слабость. <i>Langueur.</i>	—	128.
Параличь нижнихъ удовъ. <i>Paraplegia.</i>		—
— — Половины тѣла. <i>Hemiplegia.</i>		129.
IV. Боли. <i>Dolores.</i>		
Главоболѣніе. <i>Cephalaea.</i>		130.
Безсонница. <i>Agrypnia.</i>		131.
		Ко-

оглавленіе содержаній.

IX.

Колошье грудное. <i>Pleurodine.</i>	152.
Колошье въ животѣ. <i>Colica.</i>	133.
Ломота. <i>Arthritis.</i>	134.
Простуда. <i>Rheumatismus.</i>	135.
Шиагра. <i>Ischias.</i>	—
Боль костная. <i>Osteocopus.</i>	136.
V. Болѣзни Грудныя. <i>Aul elationes.</i>	
Одышка или задохѣ. <i>Dyspnoea.</i>	137.
Кашель. <i>Tussis.</i>	238.
Хрипота. <i>Raucitas.</i>	139.
VI. Болѣзненныя теченія мокротѣ: <i>Profluvia.</i>	
Слиношеченіе. <i>Ptyalismus.</i>	140.
Безпрерывный позывѣ къ испражненію низомѣ.	
<i>Tenesmus.</i>	—
Гноешеченіе задняго прохода. <i>Proctorrhœa.</i>	141.
Мочешеченіе гнойное. <i>Puuria.</i>	—
VII. Болѣзни изнурительныя. <i>Emaciationes.</i>	
Изушеніе тѣла. <i>Atrophia.</i>	142.
Сухотка. <i>Tabes.</i>	143.
Чахотка. <i>Phthisis.</i>	145.
VIII. Болѣзни женѣ беременных. <i>lues gravi-</i>	
<i>darum.</i>	146.
IX. Болѣзни младенческія. — <i>infantum.</i>	147.
X. Болѣзни скрытныя. — <i>latentes.</i>	151.
XI. Болѣзни многообразныя. — <i>laruatae.</i>	152.
XII. Болѣзни многосложныя. — <i>complicatae.</i>	154.
XIII. Предѣохраненіе отѣ любоспρασтной бо-	
лѣзни. <i>luis prophylaxis.</i>	160.

Часть третья.

I Врачебныя предписанія. <i>Formulae medicae.</i>	
1) Внутреннія. <i>Internae.</i>	162.
II) Внѣшнія. <i>Externae.</i>	174.

II.

X.  Оглавленіе содержаній.

II. Врачебныя примѣчанія на обѣ предвѣдущія части. *Annotationes medicae.* 182.

III. Алфавитное оглавленіе содержаній, кои во всѣхъ трехъ частяхъ заключающся. *Elenchus contentorum per alphabetum.*



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

О вѣншихъ любострастныхъ болѣзняхъ.

ОТДѢЛЕНІЕ I.

Объ оныхъ болѣзняхъ вообще.

1. Болѣзни отъ любострастнаго яда происхождѣющія, называются Венерическими, Французскими, или любострастными.

2. Морскій флотъ Христофора Колумба съ собою вывезъ сей ядъ въ Европу изъ Американскихъ острововъ, по повѣсіямъ, въ 1493 лѣто.

3. По томъ при осадѣ Неаполя сей ядъ такъ распространился повсюду, что отъ войскъ осаждавшихъ оной городъ названъ Французскою; отъ осажденныхъ же въ томъ городѣ Неаполитанскою; а отъ привезшихъ сіе новое зло въ Гишпанію, названъ онъ Гишпанскою болѣзнію.

4. Ядъ любострастный кажется быть отродкомъ Американской болѣзни, *яко* называется, наиболѣе островамъ Антильскимъ свойственной.

5. Сію болѣзнь ожесточаетъ и усиливаетъ климатъ такъ, что даже и въ наши времена любострастная болѣзнь тѣмъ болѣе

свирѣпствуетъ, чѣмъ ближе земная страна къ сѣверу клонится.

6. Сія новая зараза съ перваго своего начала въ Европѣ несравненно свирѣпѣе была; ибо вскорѣ все тѣло отъ нея покрывалось гнуснѣйшими язвами и опухолями: но съ продолженіемъ времени жестокость ея мало по малу сама собою умалилась.

7. Свойства сея заразы суть во всемъ отличны отъ всѣхъ прочихъ, по сіе время извѣстныхъ остроумъ и прилипчивыхъ заразъ; слѣдственно она есть зараза особливаго своего рода. А бываетъ сей ядъ

- 1). Тончайшій; ибо онъ вкрадывается въ тончайшіе сосудцы и скважинки человѣческаго тѣла.
- 2). Постоянный; ибо еще ни однимъ опытомъ не доказано, чтобы кто ни есть отъ одного испаренія, безъ сообщенія или прикосновенія къ самой заразѣ, оною зараженъ содѣлался.
- 3). Воспалительный отъ воздуха; ибо онъ, раздражая медлѣнныя вожженія, причиняетъ воспалительное згущеніе въ сокахъ и медлительныя язвы.
- 4). Имѣющій ближайшее сходство съ клейкими возгriвыми и маслеными соками; по чему, онъ столь часто заражаетъ возгriвыя желѣзы и кости.

- 5) Ни кислый, ни щелочный, ни алкалическій, ни гніючій, ни сольный.
- 6) Ночью наиболѣе и жесточѣе свирѣпствующій.
- 7) Одною ртутью испребляемый.
- 8) Никогда въ человѣческомъ тѣлѣ не раждающійся, но всегда въ оное отъинуда воспріимлемый.

8. Образъ или способъ, коимъ сей ядъ обыкновенно въ человѣческое тѣло воспріимлется, есть четверакій:

- 1) Порожденіемъ отъ зараженной матери, сообщавшей утробному своему плоду сей ядъ со кровію. Можетъ ли отецъ имѣющій зараженное сѣмя, заразить симъ же ядомъ и свое исчадіе безъ матерней заразы? Сіе сомнительно быть кажется.
- 2) Воздреніемъ. Такимъ то образомъ часто какъ младенцы отъ зараженной кормилицы, такъ и здоровыя кормилицы отъ зараженнаго младенца повреждаются.
- 3) Плоскимъ совокупленіемъ здороваго мужчины съ женщиною страдающею заразительнымъ печеніемъ бѣли, или здоровой женщины съ мужчиною страдающимъ заразительною бѣлою грыжею. Сей образъ заразительности есть частѣйшій. Изъ числа ста человѣкъ зараженныхъ 99 имѣютъ заразу по сей одной причинѣ.

4) Прикосновеніемъ къ заразительному яду, особливо когда касающаяся часть есть ранена, или токмо тонкою кожею покрыта. Примѣры доказываютъ, что зараза сообщена была поцалуемъ, рюмкою, плашлемъ, постелью, лежаньемъ на одной кровати, осязаніемъ, ланцетомъ, банками, рожками, и проч.

9. Рѣдкое есть свойство и расположеніе таковыхъ людей, кои сими четырьмя способами не заражаются.

Часть сперва заразѣ коснувшаяся, съ начала заражается. Однакожъ иногда, хотя и весьма рѣдко, причѣно, что зараза не сперва заражаетъ коснувшуюся часть, но оною токмо всасывается, и немедленно ко другой тѣлесной части переходитъ.

Первѣйшее въ зараженной части дѣйствіе заразы есть сіе:

- 1) Раздраженіе твердыхъ частей; отъ чего медлѣнное воспаление и стеченіе скопляющихся мокротъ слѣдуетъ.
- 2) Премѣненіе соковъ въ гнойную влагу; отъ чего въ зараженной части бывающъ теченіе гнойной влаги или скопленіе оной.
- 3) Язвы сальныя на послѣдокъ открываются.

10. Зараза, отъ части сперва зараженной всосана будучи, на послѣдокъ производитъ въ другой части, а иногда и во всемъ тѣлѣ болѣзни

болѣзни, первоначальному дѣйствию подобныя, и между собою различествующія однимъ токмо различіемъ зараженныхъ частей.

11. По сей причинѣ наилучшее любострастной заразы раздѣленіе быть можеть сие:

- 1) На мѣстную заразу, которая токмо одну часть обѣмлетъ.
- 2) На повсюдную или всемѣстную заразу, которая повреждаетъ все тѣло.
3. На скрытную или потаенную заразу, которая подъ видомъ другой болѣзни въ тѣлѣ скрывается.
- 4) На сложенную или смѣшенную, которая съ инною болѣзнію сопряжена бываетъ.

12. Врачеваніе любострастной болѣзни требуетъ.

- 1) Истребленія любострастной заразы.
- 2) Возобновленія твердыхъ и жидкихъ частей заразою испорченныхъ.

13. Великое есть множество лѣкарствъ, коихъ врачебная сила похваляется для истребленія любострастной заразы; но какъ съ теченіемъ времени сіи лѣкарства не соотвѣтствовали той похвалѣ, которую имъ приписывали: то въ разсужденіи сего оныя и преданы уже забвенію, либо токмо употреблялися такъ, какъ средства, ни вреда,

ни пользы неприносящія. Изъ числа оныхъ дѣйствительнѣйшими почитаются сѣи: баккаутъ, сассафрасъ, корень сарсапарели, песочной осоки, лапушника и чувашинской, корка корня волчьяго перца, стебельки песьяго трозда, лобелія, сурьма, дикій авранъ и опіумъ или сонное зѣлье.

14. Однакожъ безчисленные опыты насъ научающъ, что ртуть есть единое наилучшее и надежнѣйшее лѣкарство, любосіпрасному яду противудѣйствующее, и оной совсѣмъ испребляющее.

15. Способъ же давань ртуть вообще есть двоякій; ибо оная либо внѣ, либо внутрь предписывается.

1) Внѣ употребляется а) во ртутной мази; б) въ дыму киновари; с) въ промывательномъ состоящемъ изъ водянаго раствора ѣдкой ртутной или сулемы.

2) Внутрь предписывается, а) одна ртуть, б) смѣшенная, с) прѣготовленная искусствомъ.

Каждый изъ сихъ способовъ бываетъ больше или меньше дѣйствительнымъ, опаснымъ и труднымъ.

16. Смазываніе или шреніе ртутною мазью раздѣляется:

1) На слинопроизводное, когда она мажь ежедневно натирается въ толикомъ количествѣ, что отъ того причиняется слинотеченіе, и по продолженіи напирания чрезъ 6 или 8 недѣль терпѣливо переносится.

2) На угасительное, когда по выдержаніи 30 парныхъ бань или ваннъ, по очищеніи первыхъ пищепріемныхъ стезей, по употребленіи доброй пищи и питья кровочистительнаго, чрезъ долгое время употребляемаго, ршутной мази гранъ 20 либо и больше чрезъ 2 или 3 дни натираются. Количество мази, если надобность востребуешь, бережно умножать должно. Когдажъ знаки слинотеченія окажутся, тогда надлежитъ сіе преніе оставить, и внутренно дать легкое проносное. Найспособнѣйшія къ таковому напиранию суть внутренныя поверхности верхнихъ и нижнихъ удовъ, паховъ и лядвѣй. Напираніе всегда при огнѣ самымъ больнымъ чинимо быть должно.

17. Способъ слинопроизводный бываетъ

- 1) многотруднымъ, по причинѣ тяжелаго задоха и другихъ прежестокыхъ припадковъ;
- 2) крайне ненадежнымъ и бездѣйственнымъ, по причинѣ чрезмѣрно скорого испаренія ршуты изъ тѣла;
- 3) весьма опаснымъ, по причинѣ тойже ршуты застѣдающей въ разныхъ

тѣлесныхъ частяхъ; и на послѣдокъ 4) не нужнымъ, по тому что любострастная болѣзнь можетъ совершенно быть уврачевана безъ слиношеченія, какъ то опыты намъ доказываютъ.

18. Способъ угасительный едва есть лучше перваго, по причинѣ опасности происходящей отъ застѣвающей ршущи, медлѣннаго лѣченія и слиношеченія шрудно отшвращаемаго.

19. Дымъ киновари, по причинѣ опасенія отъ задоха и рѣдко отшвращаемаго слиношеченія вовсе оставишь должно.

20. Промывательное состоящее изъ водянаго раствора сулемы есть весьма опасно; по причинѣ неизвѣстнаго количества всосаннаго яда.

21. Ршущь одна, то есть живая, въ большемъ количествѣ поглощаемая, отъ кишкѣ не всасывается, но большею частью снова низомъ испражняется; а по сему и врачеваніе бываетъ бесполезное и ненадежное.

22. Ршущь смѣшенна быть можетъ съ различными веществами:

- 1) Съ рѣковыми жерновками, и называется Алкализованною.
- 2) Съ сахаромъ, и называется сахарною.

3) СѢ сѣрою, и называется ЕѣіопомѢ ЧернымѢ.

4) СѢ манною, медомѢ сыримѢ, или ревенемѢ;
и называется ршущю манноюю, медовою,
ревеневою.

ВсѢ сїи смѣшенныя средства легко ос-
павляющѢ ршущѢ въ перьвыхѢ сшезяхѢ; слѣд-
ственно малое количесшво сего полумешалла
входишѢ въ самую кровь; а по тому и вра-
чеванїе онѢ оныхѢ еспѢ весьма медлишель-
ное и ненадежное.

23. РшущѢ искусствомѢ прїуготовляешся:

1) СѢ куноросною кислотою, какѢ то шурпешѢ
минеральный.

2) СѢ сольною кислотою, какѢ то сулема и
сладкая ршущѢ.

3) СѢ селитреною кислотою, какѢ то, осажен-
ная красная ршущѢ.

4) СѢ уксусною кислотою, какѢ то, карсейзе-
ровѢ горошникѢ или катышки.

5) СѢ кислотою виннаго камня, какѢ то вода
прозябаемо - ршущьяная.

6) Долговременною перегонкою пережженная,
какѢ то ршущѢ сама чрезѢ себя пережжен-
ная.

ВсѢ сїи ршущьные составы, будучи вну-
пренно въ большемѢ количествѢ и чрезѢ дол-
гое время употребляемы, суть весьма опасны,
производятѢ прежестокое слиношеченїе, рѣзь

и боль въ животѣ, изсушеніе шѣла, кровоплеванье, чахотку и проч; а въ меньшемъ количествѣ будучи предписываемые, дѣйствуютъ весьма медлѣнно, и токмо предохраняютъ, а несовершенно врачуютъ болѣзнь, какъ въ томъ меня многочисленные опыты научили.

24. Ршущь камедьная состоящая изъ одной части живой ршущи и трехъ частей Аравійской камеди, посредствомъ цыхорейнаго и ревеневаго сиропа растертыхъ въ клей, внутрь употребляется въ видѣ пилюль, сиропа или микстуры, въ такомъ количествѣ, чтобъ по утру и въ вечеру 10 гранъ камедьной ршущи принимаемы были.

Сія ршущь 1) бываетъ непротивна ни запахомъ, ни вкусомъ, какъ прочіе искусствомъ прѣугошовленные составы. 2) Легко входитъ во вторыя спези, и проникаетъ во всѣ сосуды. 3) Весьма рѣдко причиняетъ слинопеченіе. 4) Не низлагается мѣстно, какъ ршущь съ какимъ нѣсть жиромъ растертая обыкновенно въ разныхъ частяхъ засѣдаетъ; по тому что клейкая Аравійская камедь ни когда не отстаетъ отъ ршущи въ жидкой влагѣ. 5) Не можетъ вредить ядовитою острою, по примѣру ршущьныхъ соляныхъ соста-

составовъ. 6) Всѣмъ людямъ даже и младенцамъ, беременнымъ, изсохшимъ и слабосильнымъ оную давать можно; чего о ртутной мази и соляныхъ составахъ сказать не лзя. 7) Напослѣдокъ по опытамъ моимъ она врачуетъ всѣ любостраспныя болѣзни, ршущю лѣчимыя; да и то скажу, что я многихъ больныхъ уврачевалъ одною камедною ршущю, коихъ прочіе пріуготовленные ршущныя составы исцѣлить не могли. 8) не требуетъ скучнаго пріуготовленія бань, ни увольненія отъ должностей, ни безпрерывнаго сидѣнья въ теплой комнатѣ. 9) Не причиняетъ убогимъ многого иждивенія.

25. Пріуготовленіе болящаго ко употребленію камедной ршущи требуетъ: 1) кровопусканія, если больной есть многокровенъ; 2) проносныхъ лѣкарствъ, кои чрезъ каждые 10 дней повторить должно, для очищенія перьвыхъ стезей; 3) пища разводящаго и клейкаго, состоящаго изъ корня сарсапарели и репейника, если сложеніе болящаго есть горячее и крѣпкое, или изъ древа бакауша, если онъ есть сложенія холоднаго и слабаго. 4) Здоровой пищи; при чемъ все то, что не скоро варится, жирное и кислое оставить должно. 5) Благораствореннаго воздуха; ибо
сту-

спужа вредитъ , а горничная теплота и одежда съ лишкомъ теплая легко производяшъ слинопеченіе. Въ хорошую погоду болящій долженъ часто прогуливаться пѣшкомъ. 6) Если знаки слинопеченія во устахъ окажутся; въ такомъ случаѣ должно чрезъ нѣсколько дней сряду оставить употребленіе ртуты и принять проносное. 7) Теплыя бани или ванны въ застарѣлой любострастной болѣзни, прежде и при употребленіи ртуты, предписывать должно; но въ болѣзни недавней можно оныя оставить. 8) Употребленіе ртуты продолжать должно до толѣ, покалѣ вся любострастная зараза совершенно истреблена будетъ. Что познается изъ того, когда любострастная болѣзнь болѣе отъ ртуты не перемѣняется, и болящій почнетъ съ трудомъ сносить употребляемую ртуть. Тогда надлежитъ ртуть оставить, и лечитъ болѣзнь обыкновенными лекарствами.

26. Средство образцовое, которое могло бы совершенно воспрепятствовать слинопроизводной силѣ ртуты, еще и понынѣ не извѣстно. Ни сѣра, ни канфора, ни лихорадочная корка, ни желѣзо, со ртутью употребляемая, къ тому способствовать не могутъ. Однакожъ проносныя, чрезъ каждые

8 дней повторяемая, такъ же ршуть еже-
дневно въ маломъ количествѣ употребляемая,
взвары клейкія, гласа и выя не чрезмѣрно о-
деждою согрѣваемые, окружности воздуха
свободная, и удаленіе отъ куренія табаку,
преняшшвующиѣ и удерживающиѣ снимоше-
ченіе.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е II.

О любострастныхъ болѣзняхъ подробно.

Г Л А В А I.

О бѣлой грыжѣ.

I. Бѣлая грыжа любострастная.

1. Бѣлая любострастная грыжа есть ис-
печеніе гнойной бѣлой слизи изъ мочеиспу-
скаштельнаго ствола и плѣшки.

2. Истекающая въ случаѣ бѣлой грыжи
влага, не есть настоящее сѣмя, ниже насто-
ящій гной, но клейкая слизь изъ возгри-
выхъ желѣзъ происходящая отъ любостра-
стной заразы, и перемѣнившаяся въ ост-
рую желто-зеленоватую мокроту, которая
во время плошскаго совокупленія заражаетъ
здоровую жену сею болѣзнію.

3. Ближайшая причина бѣлой грыжи не
есть язва въ мочеиспускартельномъ стволѣ
обрѣ-

обрѣшающаяся; ибо весьма рѣдко таковая язва въ ономъ стволѣ купно съ бѣлою грыжею находится; какъ раздробленіе мертвыхъ тѣлъ насъ тому научаетъ.

4. Ядъ бѣлой грыжи, какъ кажется, не разнится отъ яда или заразы любострастной.

5. Знаки, коими бѣлая грыжа любострастная отъ нелюбострастной различествуютъ, заимствовать должно отъ предшедшаго подозрительнаго соипія, отъ зеленоваго цвѣта и отъ шрудности, при испусканіи мочи бывающей; но единый и достовѣрнѣйшій знакъ есть зараза здоровой жены.

6. Мѣстопребываніе обыкновенной бѣлой грыжи соспоипѣ въ ложжинкахъ мочеиспускательнаго ствола Моргановыхъ.

7. Бѣлая грыжа, въ разсужденіи ея свойства, бываетъ 1) Простая, недавняя, и безъ всякой другой болѣзни бывающая. 2) Заспарѣлая, закоренѣлая, или долговременная. 3) Смѣшенная, или съ другою болѣзнію соединенная; таковая, съ малыми язвами дѣтороднаго мужескаго уда будучи соединена, легко причиняетъ заразу; по тому что ядъ удобнѣе всасывается отъ язвы, чѣмъ безъ оной.

II. Бѣлая грыжа простая.

8. спустя нѣсколько дней послѣ бывшаго нечистаго соитія, рѣдко по прошествіи нѣсколькихъ недѣль, раждается ненепріятное щекопанье въ плѣшкѣ и мочеиспускательномъ стволѣ дѣшроднаго уда мужескаго. Устье плѣшки пухнетъ, рдѣетъ, горитъ и зѣетъ; въ самомъ устьѣ мочеиспускательнаго ствола немножко тѣкаго гноя усматривается. По томъ спустя немного времени, ощущается жигучая и жестокая боль, при испусканіи мочи, а особливо при окончаніи, такъ что кажется будто бы иглами колешъ. При чемъ въ довольномъ количествѣ изъ мочеиспускательнаго ствола каплями истекаетъ слизъ желто-зеленоватая, иногда съ кровяными волокнами смѣшенная; въ тожъ самое время весь мочеиспускательный стволъ, даже до самой шейки мочевого пузыря, напрягается. При концѣ вся боль и припадки вожженія мало по малу умаляющся, моча едва жжетъ, и слизъ истекающая бываетъ бѣловатѣе и равнообразнѣе.

На послѣдокъ при испусканіи мочи боль опиюдь не ощущается, слизъ бѣлая, клейкая, на подобіе нити изъ мочеиспускательнаго ствола истекаетъ; мало по малу количество

чество оной слизи умаляется такъ, что токмо нѣсколько капель чрезъ двѣлой день или ночью, опшуда выжать можно, а по томъ и сіе совершенно перестаетъ.

9. Отсюда явствуетъ, что все теченіе сея болѣзни можетъ раздѣлено быть на четыре времени: 1) На время заразы, начинающейся отъ бывшего нечистаго сонія, даже до начала трудности бывающей при испусканіи мочи, и продолжающееся по большой части чрезъ нѣсколько дней, а иногда и гораздо долѣе. 2) На время воспаленія, которое познается по воспалишелоу боли, лихорадкѣ и трудности при испусканіи мочи бывающей, и мучитъ болящаго чрезъ одну или двѣ недѣли. 3) На время исшеченія, которое познается тѣмъ, что трудность при испусканіи мочи не бываетъ, и обыкновенно продолжается чрезъ нѣсколько недѣль. 4) На время теченія слизи, которое познается по исшеченію слизи небольшоу и безцвѣтнѣй.

10. Врачеваніе бѣлой грыжи простой бываетъ различное, взглядомъ различія времени.

- 1) Время воспаленія требуетъ: а) Кровопусканія, если боль и возженіе дѣшороднаго удасть жестоки; въ противномъ же случаѣ оно не нужно. б) отвара смягчительнаго и при томъ

шомъ воспаленію сопротивляющагося. Такой взваръ можно приготовить изъ корней сарсапарели, просвинокъ, перечищенного винного камня, селистры и сиропа маковыхъ дѣтвѣ и сѣменъ. или с) Оршада, т. е. молока прохладительнаго, приготовленнаго изъ сѣменъ огуречныхъ или миндалей, совокупно съ селистрою и сиропомъ бѣлаго маку. Таковое питье въ великомъ количествѣ употреблять, и долготу продолжать должно, пока боль при испусканіи мочи ощущается. d) Порошка слабительнаго состоящаго изъ приготовленныхъ раковинъ или черепашекъ, ревеня и горькой соли; котораго по полузолотнику трижды въ день принимать должно. e) Питанія тонкаго и прошивувоспалительнаго. При чемъ винограднаго вина, соипія, верховой ѣзды, и ночнаго испражненія сѣмени беречься должно. f) Въ теченіи сего времени весьма вредны крѣпкія смолистыя, острые, бальсамическія, какъ то: Копайскій бальсамъ, шерпеншинъ, сѣрный бальсамъ, острая тинктура сурьмовая, и вяжущія впрыскиванія; потому что либо умножаютъ воспаленіе, либо прекращаютъ бѣлую грыжу съ превеликою опасностью.

- 2) Время гноешеченія требуетъ: а) порошка слабительнаго смѣшеннаго съ нѣсколькими каплями Копайскаго бальсама, б) питья кровочистительнаго, состоящаго изъ корня лапу-

Часть

Ббл. ...

Библиотека

шника.

Фондъ

Орб. ...

Рост. ...

Библиотека им. Н. Н. Кривской

шника. с) вспрыскиванья ртутнаго, состоящаго изъ ползолотника сладкой ртуты, одного унца аравійской камеди, и одного фунта перетнутой воды. Такое вспрыскиванье трижды въ день повторять должно.

3) Время слизотеченія требуетъ лѣкарствъ крѣпительныхъ внутреннихъ состоящихъ изъ лихорадочной корки, стали, кориды и ртутнаго вспрыскиванья.

III. Бѣлая грыжа плѣшки.

11. Бѣлая грыжа плѣшки есть истеченіе гнойной слизи изъ скважинокъ плѣшки испразднительныхъ. Врачеваніе въ теченіи воспалительнаго времени, есть то же, что и въ бѣлой грыжѣ мочеиспускательнаго ствола; а въ продолженіи времени гноетеченія вмѣсто ртутнаго вспрыскиванья должно парить дѣшгородной удѣ въ ртутномъ растворѣ.

IV. Бѣлая грыжа застарѣлая.

12. Бѣлая грыжа застарѣлая или закоренѣлая есть истеченіе гноеватой слизи, ошѣ многихъ мѣсяцевъ или лѣтъ продолжающаяся. Причина сего вида болѣзни есть либо язва застарѣлая въ мочеиспускательномъ стволѣ, либо бездѣйствительность и расслабленіе протоковъ испразднительныхъ мочеиспускательнаго ствола. Виды оной.

- 1) Бѣлая грыжа застарѣлая слизоточная, отъ Агличанъ глитомъ называемая, познается по истеченію тонкой слизи, и по неоощенію мѣстной боли въ мочеиспускательномъ стволѣ. Причины ея суть сіи: частое соитіе во время бѣлой грыжи, балсамическiя лѣкарства съ лишкомъ долго употребляемая, и природное либо отъ старости, либо отъ иной болѣзни причиненное разслабленіе и бездѣйственность ложжинокъ слизоточныхъ.

Врачеваніе требуетъ лѣкарствъ крѣпительныхъ внутреннихъ и внѣшнихъ, какъ то вспрыскиванья купоросного, полосканья дѣшороднаго уда въ холодной водѣ, крѣпительнаго вина настояннаго съ лихорадочною и винтеровою корками, желѣзными опилками и горькими травами.

- 2) Бѣлая грыжа застарѣлая язвенная познается по гноеватой сукровицѣ истекающей изъ дѣшороднаго уда, и по мѣстной боли, въ какой нѣсть части мочеиспускательнаго ствола оощуваемой при испусканіи мочи, при запусканіи свѣчь, или во время здавливанія дѣшороднаго уда перстами.

Врачеваніе требуетъ 1) внутреннего употребленія камединой ртужи, 2) запусканія свѣчи смазанной меркуріальнымъ бальсамомъ, и 3) вспрыскиванья ртутнаго раствора смѣшеннаго съ соннымъ зѣльемъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О трудномъ мочеиспеченіи любово-страстно-мъ.

1. Трудное мочеиспечение любово-страстное есть испускание мочи жгучее и чувствительную боль причиняющее, отъ любово-страстной заразы происходящее.

2. Виды сея болѣзни суть сіи:

1) Трудное мочеиспечение воспалительное. Оно раждается отъ воспаления мочеиспускательнаго ствола, и причиняетъ весьма ощутительный жаръ при испускании мочи бывающій, безъ всякаго испеченія гнойной слизи изъ мочеиспускательнаго ствола. По сей причинѣ нѣкоторые писатели называютъ оное *сухрю*, *грыжею*.

Врачеваніе требуетъ, 1) Кровопусканія. 2) Оршада или молока прохлаждающаго. 3) отвара смягчительнаго корня проскурняка или наливка льняныхъ сѣменъ. 4) проноснаго сопрошивляющагося воспаленію. 5) Пилюль состоящихъ изъ камединой ртуты. 6) Омоления дѣтероднаго уда въ парномъ молокѣ съ камединою ртутью соединеннаго; и 7) Впрыскиванья масла и ртутнаго млека.


2) Трудное мочеиспечение бѣлогрыжное. Оно есть припадкомъ недавней бѣлой грыжи. Сіе доказывается тѣмъ, что страдающіе многократно бывшими бѣлыми грыжами въ началѣ бѣлой
гры-

грыжи отнюдѣ не страдаютъ труднымъ мочеиспусканіемъ, или едва оно слегка чувствуютъ; однакожъ иногда оно приключается послѣ ядовитой бѣлой грыжи прекратившейся отъ употребленія вяжущихъ лѣкарствъ. Боль утощается, или по меньшей мѣрѣ послабляется, какъ скоро бѣлая грыжа снова течь начинается.

Врачеваніе бываетъ то же, какъ и въ первомъ видѣ. При чемъ должно беречься того, дабы бѣлая грыжа прекратившаяся, разгорячительными лѣкарствами возобновляема не была.

3) Трудное мочеиспеченіе язвенное. Оно у мужчинъ отъ язвы мочеиспускательнаго ствола, а у женъ отъ язвы устья онагожъ ствола рождается. Сей видъ болѣзни долго продолжается; и познается по мѣстной боли: а о лѣченіи онаго зри язвы мочеиспускательнаго ствола.

4) Трудное мочеиспеченіе женское. Оно есть припадкомъ теченія бѣли, сопряженной съ воспаленіемъ мочеиспускательнаго ствола; ибо простое теченіе бѣли едва ли и въ самомъ своемъ началѣ имѣетъ сопряженное съ нимъ трудное мочеиспеченіе. Врачуется тѣмъ же образомъ что и трудное мочеиспеченіе мужское.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О мочезадержаніи любострастноиъ.

1. Мочезадержаніе любострастное есть за-поръ мочи, трудность или невозможность мочиться, такъ, что моча либо на подобіе ниши одинакой либо двоераздѣльной истекаетъ, или токмо каплями съ превеликою наругою выжимается.

Виды сего болѣзненнаго припадка суть слѣдующіе.

2. Мочезадержаніе воспалительное есть возженіе мочеиспускательнаго сшвола, или предстательной желѣзы, иногда въ самомъ началѣ бѣлой грыжи, или отъ той же бѣлой грыжи чрезъ вспрыскиванье прекратившейся, возрастаетъ до толикой степени, что путь мочи либо совсѣмъ заграждается, либо она дѣлается многотрудною.

Сей видъ болѣзни обыкновенно отъ мочевыхъ выпускниковъ или отъ употребленія свѣчъ весьма ожесточается. Лѣченіе оной требуетъ средствъ тѣхъ же, коими и трудное воспалительное мочетеченіе врачуется. О чемъ зри вышше. Когдажъ путь мочи онымъ способомъ вскорѣ не очищается, въ такомъ случаѣ прободеніе мочеваго пузыря уч-

чинить, и врачеваніе противувоспалительное продолжашь должно.

3. Мочезадержаніе отъ затвердѣлости предспательной желѣзы. Оно познается по холодной опухоли сокращающей начало мочеиспускательнаго ствола. Перстомъ въ задній проходъ запущеннымъ наилучше она о-пухоль желѣзы ощущается.

Врачеваніе онаго припадка требуетъ внутренняго употребленія камединой ртуши купно съ аммоніакальною камедью, такъ же красавицею, дикимъ авраномъ и прочими разводящими лѣкарствами.

Внѣ должно къ промежности срамнопроходной прикладывать ртутьную мазь съ мужскимъ корнемъ, mandragora, въ молоко свареннымъ. Зри о семъ затвердѣлую окрѣп-лость предспательной желѣзы.

4. Мочезадержаніе отъ узловатой опухоли пещеристаго вещества мочеиспускательнаго ствола. Сіе вещество, въ разныхъ мѣстахъ отъ мѣстной недѣйствительности плѣвы ограждающей внутреннюю поверхность мочеиспускательнаго ствола, обыкновенно выпучивается въ самую впадину онаго. Распознается же тѣмъ, когда посредствомъ мочевого выпуск-ника ощущается гладкое и мягкое препят-

ствіе. Врачеваніе требуетъ употребленія свѣчь.

5. Мочезадержаніе отъ опухоли или наросшаго бугорка какой нѣсть большой желѣзы. Сіи опухоли иногда бываютъ ноздревашья, а иногда мозолистые и зашвердѣлыя.

6. Мочезадержаніе отъ мозолистыхъ и вспухшихъ язвъ мочеиспускательнаго ствола, познается по теченію гноя или сукровицы изъ онаго ствола.

Врачеваніе требуетъ свѣчь ртутныхъ, бальсамомъ смазанныхъ.

7. Мочезадержаніе отъ рубчиковъ ославшихся послѣ бывшихъ язвъ въ мочеиспускательномъ стволѣ; кои составляютъ мозолистые просяженія сокращающія впадину онаго ствола; распознаются мочевымъ выпускникомъ, и врачуются свѣчами.

8. Мочезадержаніе плѣнчатое, или отъ мясистой и мягкой бородавки, внутрь мочеиспускательнаго ствола, послѣ бывшихъ въ немъ язвъ остающейся или возродившейся, познается по мягкому препятствію ощущаемому посредствомъ мочевого выпускника, и по мочи истекающей двояраздѣльною струею. Однакожъ весьма рѣдко плѣнка или бородавка

родавка бываетъ причиною мочезадержанія любострастнаго.

Брачеваніе требуетъ свѣчь.

9. Мочезадержаніе отъ самороднаго сокращенія или сожашія мочеиспускательнаго ствола, познается по тонкой струи истекающей мочи, и по запусенію свѣчи, кою рою мочеиспускательный стволъ либо вездѣ, либо шокмо въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сокращеннымъ ощущается Сей видъ легчѣ всѣхъ другихъ врачуется свѣчами.

10. Мочезадержаніе любострастное спариковъ. Люди имѣвшіе во своихъ молодыхъ лѣтахъ частую бѣлую грыжу, не рѣдко по прошествіи 50 лѣтъ страждутъ трудноватымъ мочешеченіемъ, кошорое иногда продолжается чрезъ многіе годы сряду, а часто превращается и въ мочезадержаніе.

Членораздробленіе шѣлъ умершихъ съ таковымъ мочезадержаніемъ, показываютъ намъ воспаленіе и сожашіе мочеиспускательнаго ствола, а не плѣшки и не бородавки, какъ нѣкоторые думали.

Примѣчаніе. Всѣ сіи виды мочезадержанія имѣютъ свое начало отъ преждебывшихъ и худо врачеванныхъ, или себѣ безъ всякаго лѣченія оставленныхъ бѣлыхъ грыжъ, либо отъ

язвъ мочеиспускательнаго ствола. Однакожъ весьма трудно чрезъ испытаніе мочевого выпускника, или свѣчами, исправно распознавать различіе причинъ. Въ прочемъ врачеваніе оныхъ едва различествуетъ, и требуетъ вообще 1) внутренняго употребленія камелинной ртутіи и отвара сарсапарели; ибо сими лѣкарствами любострастная зараза отвращается; 2) парной или теплой и смягчительной купѣли, коею мочеиспускательный стволъ смягчается, а чрезъ то и свѣчи туда лучше запускаются; 3) употребленія свѣчъ, коими сожатию мочеиспускательнаго ствола расширяется. Свѣчи сперва тонкія, а по томъ мало по малу потолщѣ запускать нужно. Таковыя свѣчи вскорѣ послѣ употребленія купѣли весьма легко внутрь ствола вкладываются.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О пупырышкахъ кристалловидныхъ любострастныхъ.

1. Пупырышки кристалловидные любострастные суть пузырьки прозрачные, на подобіе кристалловъ лоснящіеся, величиною горчичному сѣмени равные, на плѣшкѣ или кожищѣ, плѣшку покрывающей, случающіеся.

2. Они по большей части по прошествіи немногихъ дней превращаются въ малыя язвы, шанкромъ называемыя.

3. Врачеваніе совершается внутреннимъ употребленіемъ камединой ртуті, и внѣшнимъ омовеніемъ состоящимъ изъ раствора сладкой или мореной ртуті.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О бугоркахъ любострастныхъ дѣтороднаго уда.

1. Бугорки любострастные, на дѣтородномъ мужескомъ удѣ нарастающіе бывають величиною съ горошинку, а иногда и побольше.

2. Они раздѣляются въ разсужденіи мѣста, которое занимають, на

1) Бугорки плѣшки, кои около уздочки въ самомъ существѣ плѣшки въ Моргановыхъ желѣзкахъ, либо около, и надъ плѣшкою въ душистыхъ желѣзахъ имѣють свое сѣдалище.

2) Бугорки крайней плоти, въ самомъ покровѣ, плѣшку ограждающемъ, гнѣздящіеся.

3) Бугорки Ковперовой желѣзы, надъ самою луковицею мочеиспускательнаго ствола, и около раздѣленія пещеристыхъ шлѣвъ мочеиспускательнаго ствола обрѣтающіеся.

4) Бугорки прочихъ желѣзъ, по разнымъ мѣстамъ дѣшороднаго уда являющіеся.

6. Всѣ оныя бугорки, въ разсужденіи своего свойства, бываютъ либо жаркіе, либо холодные.

1) Жаркіе познаются по краскѣ, боли и испусканіи клейкой и бѣлой слизи, особливо если перстами здавлены бываютъ. Они иногда превращаются въ глубокія язвы.

Врачеваніе оныхъ требуетъ разогнанія чинимаго посредствомъ ртуты внутрь и внѣ употребляемой.

2) Холодные познаются по твердости и небытію воспаленія; врачуются же равно какъ и жаркіе бугорки.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О язвахъ любострастныхъ плѣшки.

1. Язвы любострастныя плѣшки разбѣдаютъ всю плѣшку или внутреннюю поверхность крайней плоти; отъ Французовъ называются шанкромъ.

2. Язвы млечныя молочнымъ подобныя. Онѣ рождаются отъ предшедшихъ кристалловидныхъ пузырьковъ, дежапъ на самой поверхности; и растворомъ ртутнымъ бальсamicкимъ, нѣсколько разъ въ сутки будучи смываемыя, легко врачуются.

3. Язвы обыкновенныя, бываютъ полукруглыя, въ окружности красноватыя, по срединѣ пѣсочныя, отъ молочничныхъ ширѣ и поглубже.

Врачеваніе требуетъ внутренняго камединной ртутіи употребленія; а внѣ должно прикладывать ртутной бальсамъ, или бальсамической растворъ.

4. Язвы въ шанкрѣ претѣняющіяся. Онѣ весьма великую боль причиняютъ, край имѣютъ разбѣденные и сосковатые, и разбѣдаютъ всю плѣшку. Зри шанкрѣ дѣтороднаго уда мужескаго.

5. Язвы внѣшнія дѣтороднаго уда мужескаго, вышше, ниже или по бокамъ дѣтороднаго уда мужескаго, какъ мнѣ нѣсколько разъ видѣть довелось, случающіяся.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О шанкрѣ любострастномъ дѣтороднаго уда мужескаго.

1. Шанкрѣ любострастный есть не что иное какъ превращеніе плѣшки или крайней плоти въ рака.

Весьма худой способъ есть тотъ, когда малую язву на плѣшкѣ случающуюся, яко ядъ испребляютъ, ежедневно по нѣсколько разъ

разъ прикасяся оной ѣдкимъ адскимъ камнемъ или синимъ купоросомъ; ибо отъ того часто любострастная простая язва плѣшки превращается въ рака весьма опаснаго.

2. Ракъ дѣтороднаго уда, взглядомъ своего свойства бываетъ двоякій:

1) Ракъ обыкновенный есть гнѣющая язва разѣдающая крайнюю плоть и плѣшку съ превеликою и безирерывною болью, и бывающая соскочающею и кровоточающею.

Врачуется камединою ртутью, съ соннымъ зѣлемъ внутренно, и бальсамическимъ растворомъ наружно употребляемыми. Когдажъ сїи лѣкарства никакой пользы не приносятъ, тогда надлежитъ искусствомъ отдѣлить дѣтородной удъ; но и опсѣченіе онаго не ползуетъ, когда паховыя желѣзы въ тожъ самое время отъ рака заражены и затвердѣлы находятся, какъ то мнѣ видѣть случилось.

2) Ракъ ноздреватый. Крайняя плоть, или только плѣшка, либо и та и другіи превращаются въ опухоль превеликую, ноздреватую, иногда кровавую, величиною съ голову. Сіе случается отъ язвъ плѣшки, худо лѣчимыхъ.

Врачеваніе требуетъ отнятія дѣтороднаго уда; что наилучше и безопаснѣе при концѣ таковой опухоли, посредствомъ перевязки совершается.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О язвахъ любострастныхъ мочеиспускательнаго ствола.

1. Любострастная язва мочеиспускательнаго ствола бывающъ либо на внутренней поверхности онаго, либо изъ другихъ частей приносящя ядъ въ самую его впадину.

2. Язва мочеиспускательнаго ствола простая познается по долговременной бѣлой грыжѣ, по мѣстной боли и жару, въ особливо и одной части онаго ствола ощущаемымъ, а особливо при испусканіи мочи, такъ же чрезъ виѣшнее прикосновеніе, и во время запусканія свѣчь.

3. Язва предстательной желѣзы познается по преждебывшему нарыву въ сей желѣзѣ, и по воспослѣдовавшему опшверстію онаго нарыва внутрь мочеиспускательнаго ствола. Зри нарывъ предстательной желѣзы.

4. Язва сѣменнаго пузыря познается по преждебывшему воспаленію и возгноенію сего жъ пузыря, такъ же и по истеченію сѣмени изъ ствола.

5. Язва какой нѣсть большой желѣзы. Познается по преждебывшему бугорку жаркому и глубокому, на дѣшородномъ удѣ, возгноенномъ, и ошкрывшемся въ самой стволѣ.

Иногда

Иногда таковыя язвы, какъ мнѣ видѣть случалось, открывающя даже на внѣшней поверхности дѣтороднаго уда, и изъ себя испускающъ мочу.

6. Врачеваніе язвъ въ самомъ стволѣ сокрывающихся, либо во оной зіяющихъ, кромѣ внутренняго употребленія камединой ршуты съ соннымъ зѣлемъ приуготовленной, требуетъ еще и запусканія свѣчь ршутнымъ бальсамомъ смазанныхъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

О незалулѣ любострастной.

1. Незалупа любострастная есть опухоль крайней плоти, преняшствующая обнаженію плѣшки.

2. Незалупа воспалительная имѣетъ свое начало отъ любострастнаго воспаленія крайней плоти.

Сіе воспаленіе рѣдко одинакое, по большей части съ язвами и опухольми плѣшки и крайней плоти, или съ бѣлою грыжею, сопряжено бываетъ.

Врачеваніе онаго, кромѣ кровопусканія и прочихъ внутреннихъ, воспаленію сопроти-вляющихся лѣкарствъ, требуетъ еще и пилюль состоящихъ изъ камединой ршуты,

и внѣшней купѣли или омовенія для дѣтороднаго уда состоящаго изъ ртутнаго млека или изъ водянаго раствора ртущи.

Весьма рѣдко требуется разрѣзаніе крайней плоти, да и надлежитъ сіе дѣлать весьма искусно. Я многократно примѣтилъ, что единое омовеніе дѣтороднаго уда парнымъ млекомъ, или водою прозябаемо минеральною, и смазываніе онаго неаполитанскою мазью не принесли ни какой пользы.

3. Незалупа кристалловидная есть опухоль прозрачная, лоснящаяся, опіѣку подобная, пасокою наполненная, на крайней плоти случающаяся.

Врачеваніе оной сверхъ внутренняго употребленія проносныхъ и камединой ртущи, требуетъ еще и омовенія состоящаго изъ водянаго ртутнаго раствора, съ водкою смѣшеннаго.

4. Незалупа окрѣплая и затвердѣлая есть затвердѣлость крайней плоти, большею частію бугорьковатая. Здѣсь приличествуютъ внутренне камединая ртуть купно съ прочими разводящими и разбивающими; а внѣ водяной ртутный растворъ пріуготовленный со смягчительными.

5. Незалупа ракомъ пораженная, когда вся крайняя плоть превращается въ превеликаго ноздревашаго рака. Зри ракъ дѣшородного уда.

6. Незалупа антоновымъ огнемъ пораженная. Иногда отъ ѣдкаго любострастнаго яда, а большею частью отъ худаго врачеванія, при воспаленіи употребляемаго, рождается антоновъ огонь на крайней плоти. Врачеваніе требуетъ внутреннихъ и внешнихъ гнилости сопротивляющихся, коими помершвѣлое отъ здороваго легко отдѣляется.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О залулѣ незалупной любострастной.

1. Залупа незалупная любострастная есть воспаленіе плѣшки любострастное, которое толико задерживаетъ или сожимаетъ крайнюю плоть, что она на подобіе пещи плѣшку давливаютъ и назадъ заворачивается.

2. Сей болѣзненный припадокъ крайне должно различать отъ залупы незалупной нелюбострастной, которая отъ сильнаго завороченія крайней плоти при плоскомъ соитіи иногда случается.

3. Виды залупы незалупной любострастной суть сѣи:

1) Залуа незалуаная любострастная воспалищельная; по большой части съ язвами или шишками плѣшки сопряжена бываетъ. Она требуетъ, кромѣ кровопусканія и внутренняго камединой ршущи употребленія, еще и омовенія дѣтороднаго уда, состоящаго изъ ршущаго раствора; а при томъ, если возможно и того, чѣмъ крайнюю плоть внизъ спустить.

2) Залуа незалуаная, въ антоновъ огонь превращающаяся, есть та, когда антоновъ огонь настоитъ; который означаетъ синевомъ плѣшки. Въ таковомъ случаѣ, крайнюю плоть назадъ завороченную посредствомъ боковыхъ насѣченій расширить и впередъ пригнуть должно.

Антоновъ огонь плѣшки требуетъ внутреннего и внешнего употребленія лѣкарствъ, гнилоспи сопротивляющихся. Рѣдко антоновъ огонь далѣе плѣшки простирается; слѣдственно и отнятіе оной не нужно, какъ то мнѣ видѣть случалось.

ГЛАВА ОДИНАТЦАТАЯ.

О напряженіи дѣтороднаго уда любострастно.

1. Напряженіе дѣтороднаго уда мужескаго есть непріятное, непохошливое и долго-

временно продолжающееся плоти воспаніе или вздрачиваніе.

2. Виды онаго сущь сїи.

- 1) Напряженіе дѣтороднаго уда бѣлогрыжное раждаеца опѣ воспаленїа моченспускашельнаго ствола, слѣдствєнно бываеца припадкомѣ труднаго мочешеченїа и воспалишельной бѣлой грыжи.

Врачеванїе требуетѣ камединной рштуи и лѣкарствѣ воспаленїю сопротивляющихся. Зри трудное мочешеченїе воспалишельное.

- 2) Напряженїе дѣтороднаго уда долговременное. Я видѣлаъ юношу, который чрезѣ цѣлыя шесть недѣль, послѣ бѣлой грыжи вяжущими лѣкарствами прекращенной, спирадалѣ напряженїемѣ дѣтороднаго уда, безѣ всякой другой любострастной болѣзни. Онѣ вылѣчился чрезѣ внутреннее камединной рштуи употребленїе и теплымѣ омыванїемѣ дѣтороднаго уда, состоящимѣ изѣ водянаго рштунаго раствора, и рштуною мазью, коею болящїй удѣ былѣ смазыванѣ.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

О похоти любострастной.

1. Похоть любострастная естѣ превеликое желанїе ко плотскому соипїю, сѣ похотливымѣ воспанїемѣ плоти, а часто и сѣ послѣдующимѣ истеченїемѣ сѣмени.

2. Похоть любострастная отъ нечистаго соишїя. Она примѣчается въ то время бѣлой грыжи, которое бываетъ между зараженїемъ и начинающимся бѣлогрыжнымъ воспаленїемъ. Слѣдственно она есть знакомъ заразы и предвѣщанїемъ бѣлой грыжи.

3. Она рождается отъ раздраженїя чувственныхъ жилъ, въ мочеиспускательномъ стволѣ раздѣляющихся, привлекающаго и сѣменные пузырьки въ сочувствїе.

4. Врачеванїе сего припадка требуетъ впрыскиванья ртутнаго въ мочеиспускательной стволѣ; симъ образомъ, какъ я самъ примѣшилъ, иногда бѣлая грыжа отворачивается.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

О корчѣ любострастной дѣтороднаго уда.

1. Корча любострастная дѣтороднаго уда есть накривленїе напряженной плоти, иногда въ верхъ, иногда въ низъ, а иногда на бокъ.

2. Корча дѣтороднаго уда бѣлогрыжная. Когда уздочка крайней плоти воспаляется, въ такомъ случаѣ дѣпородный удъ, во время бѣлой грыжи воспалительной, при самомъ издрачиванїи сильно извивается и накривляется. Писатели бѣлую грыжу, съ таковою

корчею сопряженную называютъ бѣлою грижею шепивною.

Врачеваніе пребуетъ лѣкарствъ прошивувоспалительныхъ съ камединою ршущю. Зри трудное мочешеченіе.

5. Корча дѣтороднаго уда отъ бугорковъ или бородавокъ. Отъ бѣлой грижи многократно бывшей иногда железы окрѣпляя или узлы пещеристаго существа въ мочеиспускательномъ стволѣ остающся, и причиняють оную корчу.

Корча всегда примѣчается оборочена въ ту сторону, которая есть прошивуположенна узлу. Такимъ образомъ узелъ въ правой сторонѣ, на лѣво: въ лѣвой направо: въ нижней въ верхъ, а въ верхней въ низъ, накривляетъ дѣтородный удъ. Таковыя узлы причиняють затрудненіе и испеченію мочи и испражненію сѣмени.

Врачеваніе сея корчи пребуетъ отнятія узла, бугорька, или бородавки; что однакожъ въ дѣйство произвести весьма трудно. Лучше спараться о томъ, чтобъ шакковыя узлы разогнать или привесити въ нагноеніе.

4. Корча дѣтороднаго уда отъ недостатка клѣпчешой сѣпи, которая въ нѣкоторыхъ

рыхъ мѣстахъ онаго отъ бывшей язвы и отъ великаго возгноенія разрушилась.

Врачеваніе едва ли есть возможное.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

О невстанихъ мужской любострастной.

1. Невстаниха мужская любострастная есть безплоднаго сѣмени испеченіе, или невозможное выбрашиваніе.

2. Виды оной бывающъ слѣдующіе:

1) Невстаниха отъ повсемственной заразы. Когда сѣмя купно отъ любострастнаго яда есть испорчено, тогда оное послужитъ къ распространенію заразы, а не ко произведенію дѣшей.

Врачеваніе требуетъ камединой ртупи.

2) Невстаниха отъ сѣменныхъ пузырьковъ сожатыхъ или скорченныхъ. Таковая порча сѣменныхъ пузырьковъ иногда была найдена въ мертвыхъ тѣлахъ послѣ предшедшихъ любострастныхъ болѣзней.

3) Невстаниха отъ сросшихся устьевъ прошочковъ выбрасывающихъ: и сія корча равно какъ и первая найдена въ мертвыхъ тѣлахъ любострастныхъ. Объ сіи корчи въ живущемъ человѣкѣ познать не лзя, и объ сущь неизлѣчимыя.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е III.

О болѣзняхъ сѣменныхъ яичекъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О воспаленіи любострастнымъ яичекъ.

1. Любострастное воспаленіе яичекъ есть опухоль жаркая и болѣзненная одного только или обоихъ яичекъ.

2. Воспаленіе яичекъ бѣлогрыжное. Оное раждаеиша во время воспалишельное бѣлой грыжи, отъ сочувствія мочеиспускательнаго спвола съ яичками, и само собою проходишь, по утолненіи воспаленія въ мочеиспускательномъ спволѣ.

Врачеваніе онаго требуетъ прошивувоспалительныхъ лѣкарствъ, коими воженіе яичекъ утолняется; вспухшія яички повязкою моиенки въ верхъ приподнимать должно.

3. Воспаленіе яичекъ отъ мѣснаго поврежденія. Часто одно или оба яичка воспаляются отъ скоро прекратившейся или мало точащей бѣлой грыжи, и отъ изсохшей язвы плѣшки.

Врачеваніе требуетъ, 1) пилюль состоящихъ изъ камединой ршупи, коими печеніе бѣлой грыжи часто возобновляется и ядъ истребляется; 2) оршада или молока прохладн-

хладительнаго и проноснаго противувоспалительнаго; 3) теплой припарки состоящей изъ смягчительной муки въ водѣ разваренной, коею боль и воспаленіе утѣляются; 4) повязки мошечной, коею яички вспухшіе въ верхъ приподнимаются.

4. Воспаленіе затгноившееся. Яичко затгноившееся познается по тому, когда послѣ предшедшаго въ ономъ воспаленія ощущается колебаніе гноя въ одномъ или въ многихъ мѣстахъ мошечки. Врачеваніе требуетъ разрѣзанія того мѣста, въ коемъ оно колебаніе примѣчается, и выпущенія онаго. Зри язвы мошечки.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О затвердѣлости любострастной яичекъ.

1. Затвердѣлость любострастная въ одномъ или обоихъ яичкахъ, есть опухоль твердая, холодная, едва болѣзненная.

2. Затвердѣлость яичекъ ошѣ предшедшаго воспаленія; ибо она иногда по утѣленіи воспаленія остается.

Врачеваніе требуетъ 1) камединой ртуты купно съ порошкомъ корня волчковаго.

2) теплой припарки состоящей изъ смягчительныхъ травъ и изъ сѣменъ льна, въ моло-

къ уваренныхъ. Иногда мазь, состоящая изъ переступня, мужескаго корня, дикаго аврана, и неаполишанской мази больше пользы принесла.

3) Иногда прививка бѣлой грыжи, посредствомъ свѣчи, гноемъ бѣлогрыжнымъ смазанной произведенная принесла пользу.

3. Зашвердѣлость прибавочнаго яичка. Она и по разогнаніи опухоли бывшей въ яичкѣ остается чрезъ многіе годы сряду.

4. Зашвердѣлость яичка ракомъ пораженная. Познается по жестокой боли, и по каменной швердоси яичка, воспослѣдовавшей послѣ застарѣлой окрѣпlosti. Врачеваніе требуетъ отнятія яичка, особливо когда сѣменная тежива найдется еще незашвердѣвшею даже до самаго паховаго кольца.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О язвахъ любострастныхъ мошени.

1. Язвы любострастныя мошени бываютъ причинены любострастнымъ ядомъ.

2. Онѣ въ разсужденіи своего положенія суть шроякія.

1) Язвы мошени закожныя, кои въ самой кожѣ обрѣщаются, и бываютъ широкія, верхнія, въ окружности красныя, а по срединѣ гнусныя или нечистыя.

Онѣ

Онѣ легко врачуются внутреннимъ употребленіемъ камединой ртуты, и внѣшнимъ прикладываніемъ ртутнаго бальсама или ртутнаго бальсамическаго раствора.

- 2) Язвы мошенки яичныя проникаютъ даже въ самое ея существо; а познаются щупомъ, такъ же по предшедшему воспаленію, возгноенію яичка, и истеченію вещества бѣловатаго волокнистаго.

Когда таковое существо яичка непрерывно вонъ исходитъ, тогда по уврачеваніи язвы осматывается изсушеніе яичка, бывающаго величиною едва въ орѣхъ.

Врачеваніе требуетъ, сверхъ внутренняго ртуты употребленія, еще и внѣшняго прикладыванія ртутнаго бальсамическаго раствора или другаго бальсама, дабы оное вещество яичка вонъ не выходило.

3. Язвы мошенки мочевыя; онѣ проникаютъ внутрь мочеиспускательнаго ствола; составляяютъ одинъ или многія ноздреватыя круглопродолговатыя тѣла, въ задней части мошенки ощущаемыя; кои рдѣютъ, краснѣютъ, болятъ, по истеченіи мочи изъ мочеиспускательнаго ствола, скоропостижно вступаютъ, и по томъ изъ многочисленныхъ скважинъ изъ себя испускаютъ мочу въ видѣ испарины; а на послѣдокъ по про-

прошествіи нѣсколька времени снова въ прежнее состояніе приходятъ.

Врачеваніе требуетъ сверхъ внутренняго употребленія камединой ртуті; 1) свѣчи жолобоватой, ртутнымъ бальсамомъ смазанной, запускаемой внутрь мочеиспускательнаго ствола съ тѣмъ, чтобъ язва въ ономъ стволѣ зіяющая зажила, а при томъ дабы и теченіе мочи въ клѣшечную сѣть мошонки воспрепятствовано было. 2) Продолговатую и ноздреватую опухоль въ мошонкѣ часто слегка выжимать, сулемою или осаженою красною ртутью посыпать, и растворомъ ртутнымъ бальсамическимъ смазывать должно.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е IV.

О болѣзняхъ предстательной железы.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О воспаленіи любострастнои предстательной железы.

1. Воспаленіе любострастное предстательной железы причиняется любострастнымъ ядомъ.

2. Знаки онаго суть сіи: 1) Ощущеніе тягости, жару, и боли въ задней кишкѣ,

а иногда и бѣлая подчревная часть болитъ.

2) Перстомъ запушеннымъ въ заднюю кишку ощущается бугорокъ или опухоль твердая и жигучая, подъ самую шейкою мочевого пузыря ощущаемая. Когда она опухоль бываетъ весьма великая, въ такомъ случаѣ она даже и въ самой срамнопроходной промежности перстомъ ощущается. 3) Теченіе мочи весьма трудно и мало по малу совсемъ прекращается. 4) Мочевой выпускникъ весьма трудно, либо и опнюдь не можетъ запушенъ быть въ мочевой пузырь, и при томъ онъ обрѣшаетъ шамо препяшствіе или сопротивленіе предъ шейкою мочевого пузыря. 5) Нечистоты низомъ испражняемыя, на себѣ показываютъ видъ впечатлѣнной опухоли; прежешокій и непрерывный иногда примѣчается позывъ къ испражненію низомъ, хотя въ прошчемъ тѣ же нечистоты низомъ испражняемыя бываютъ весьма жидкія. Таковое воспаленіе бываетъ весьма опасно; по тому что оно часто распространяется въ сѣменныхъ пузырькахъ и во всемъ мочевомъ пузырь, и антоновымъ огнемъ, въ ономъ пузырь, воспослѣдовавшимъ, болящаго умерщвляетъ. 6) Иногда бѣлая грыжа при томъ же случается, а иногда и отъ прекращенія оной таковое воспаленіе случается.

3. Врачеваніе требуетъ возобновленія бѣлой грыжи и разогнанія воспаленія. Сіи показанія съ успѣхомъ исполняются. 1) Чрезъ кровопусканіе. 2) Чрезъ употребленіе прохладительного оршада. 3) Пилюлями состоящими изъ камединой ршуши. 4) Теплыми примочками приготовленными изъ порошковъ смягчительныхъ и молока. 5) Промывательными изъ воды и смягчительныхъ травъ приготовленными, и въ маломъ количествѣ настаиваемыми.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О нарывѣ любострастнои предстательной железы.

1. Любострастный нарывъ предстательной железы есть опухоль оной гноеточащая. Виды онаго сущіи сѣи:

2. Нарывъ закрышый. Онъ познается. 1) По знакамъ преждебывшаго воспаленія. 2) Чрезъ осязаніе опухоли ощущаемой въ задней кишкѣ, во время воспаленія твердой, а по томъ мягкой и колеблющейся. 3) Посредствомъ мочевого выпускника, легко въ самой стволъ запускаемого.

Врачеваніе онаго состоитъ въ томъ, что если воспаленіе предстательной железы разог-

зогнать не лзя; въ такомъ случаѣ надлежитъ 1) теплыя и наиболѣе смягчительныя припарки прикладывать ко промежности срамнопроходной; 2) таковыя же смягчительныя промывательныя насосомъ впрыскивать въ задній проходъ; когда опухоль въ заднемъ проходѣ, запущеннымъ туда перстомъ ощущается уже мягка и колсблющаяся, и сама собою не прорывается; въ такомъ случаѣ мочевымъ выпускникомъ, въ мочеиспускательный стволъ глубоко запущеннымъ, или треугольною кривою иглою, въ задній проходъ запущенною, оной вскрыть можно.

3. Нарывъ открышый предстательной железы. Сей нарывъ чешвероякимъ образомъ прорваться можетъ.

1) Вънутрь мочеиспускательнаго ствола, въ коемъ оный весьма часто, особливо при вставливаніи мочевого выпускника внезапно прорывается. 2) внутрь заднепроходной кишки; что однакожъ рѣдко случается. 3) Вънутрь мочевого пузыря, что иногда примѣчается; и 4) въ самой промежности срамнопроходной, что чаще всего примѣчено.

Провалъ познается: 1) Когда большое количество гноя созрѣвшаго внезапно истекаетъ, либо изъ мочеиспускательнаго ствола,

48 окрѣплость предст. железы.

ла, либо изъ мочевого пузыря купно съ испускаемою мочою, либо изъ задняго прохода, либо изъ нарыва промежности срамно-проходной; 2) Когда моча истекаетъ свободно, а при томъ лихорадка и прочіе припадки, при воспаленіи бывающіе, внезапно и совсѣмъ прекращаются.

Врачеваніе нарыва открышаго требуетъ лѣкарствъ очищающихъ, насосцовъ впрыскиваемыхъ либо въ задній проходъ, либо въ мочеиспускательный стволъ, коими язва открытая воплощается. А внутренно должно употреблять камединную ртуть.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О затвердѣлой любострастной окрѣплости предстательной железы.

1. Затвердѣлая любострастная окрѣплость въ предстательной железѣ бываетъ отъ любострастного яда.

2. Затвердѣлая окрѣплость бываетъ обыкновенная или простая. Знаки оной суть сїи:

1) Прежде бывшее воспаленіе предстательной железы, не перемѣняющееся въ нарывъ. 2) Перстное осязаніе опухоли твердой, почти не болящей, въ задней кишкѣ ощущаемой. 3) Трудное испусканіе мочи. 4) нечистота

стопа низомъ испражняемая, имѣющая на себѣ видѣ впечатлѣнной верхушки.

Врачеваніе требуетъ того, чтобѣ зашвердѣлую окрѣплость разбить и разогнуть; чего ради должно употреблять: 1) ртуть камединную купно съ другими раздѣляющими лѣкарствами; 2) мазь ртутную смѣшенную съ мазью свиннаго хлѣба, прикладывать ко срамно-проходной промежности; 3) свѣчу запускать въ мочеиспускательной стволѣ. Не должно ли испытывать и прививку бѣлой грижи? Когдажѣ совершенный запорѣ мочи случится отѣ за твердѣлой окрѣплости предстательной желѣзы; тогда посредствомъ каменосѣчца, должно разрѣзать тѣло окрѣпнувшей и зашвердѣлой желѣзы, съ тѣмѣ намереніемѣ, дабы желѣза могла приведена быти въ возгноеніе.

3. Зашвердѣлая и ноздреватая окрѣплость предстательной желѣзы. Сіе особенное предстательной желѣзы болѣзненное состояніе, чрезѣ тщательное, посредствомъ мочевого выпускника, испытаніе самаго мочевого пузыря, уповашельно открыти можно. Врачеванію же здѣсь едва есть мѣсто. По учиненіи каменосѣченія не должно ли испыты-

вашъ и того, чѣмъ вырѣзашъ или перевязашъ
ноздраватую окрѣплоснѣ?

4. Зашвердѣлая окрѣплоснѣ ракомъ пораженная. Болѣ и прочіе знали рака, показующіе то, что зашвердѣлая окрѣплоснѣ превѣняется въ рака, въ тожѣ самое время означающѣ и сіе, что болѣзнь есть смертоносною. Врачеваніе въ семъ случаѣ предохранительное въ дѣйствіе производишъ должно.

ОТДѢЛЕНІЕ V.

О болѣзняхъ промежности срамнопроходной и задняго прохода.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О Свищѣ любострастномъ срамнопроходной промежности.

1. Свищъ любострастный въ срамнопроходной промежности есть нора или пазуха, любострастнымъ ядомъ причиненная.

2. Виды онаго сущѣ слѣдующіе.

1) Свищъ срамнопроходной промежности даже до самаго мочеиспускательнаго сѣвола проникающій. Онъ познается тѣмъ, когда моча изъ онаго сѣвола при истеченіи исходитъ многими скважинками или отверстіями.

Вра-

Врачеваніе онаго, кромѣ внутренняго употребленія камединной ртужи, требуетъ еще и того, чтобъ 1) въ мочеиспускательный стволъ вкладывать свѣчу пуспую ртутнымъ бальсамомъ смазанную, дабы итекающая моча не вкрадывалась въ клѣшечную сѣть срамнопроходной промежности, и дабы язва въ стволѣ зажила; 2) посыпать мѣсто свищемъ зараженное ртутью осаженною красною, и еще сверхъ того прикладывать растворъ ртутный бальсамическій.

2) Свищъ срамнопроходной промежности даже до предстательной желѣзы проникающій. Онъ познается по знакамъ предшедшаго воспаленія и возгноенія предстательной желѣзы, и по воспослѣдовавшемъ нарывѣ въ той же промежности.

3) Свищъ срамнопроходной промежности, даже до сѣменныхъ пузырьковъ проникающій. Онъ познается по предшедшему воспаленію и возгноенію сѣменныхъ пузырьковъ, по воспослѣдовавшемъ нарывѣ въ той же промежности, и по истеченію сѣмени. Врачуется же, хотя и труднѣе, тѣмъ же образомъ, какъ и первый видъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О свищѣ любострастноио задняго прохода.

1. Свищъ любострастный задняго прохода, въ окружности онаго, имѣетъ свое начало отъ любострастной заразы.

2. Виды онаго суть слѣдующіе:

1) Свищъ задняго прохода внѣшній. Онъ имѣетъ свое начало отъ любострастного вереда или нарыва, и отъ наращенія въ заднемъ проходѣ бывшихъ, и худо врачеванныхъ; но внутрь самой кишки не проникаетъ.

Врачеваніе совершается внутреннимъ употребленіемъ камединой ршуты. Растворъ ршутыный бальсамическій насосомъ впрыскивать или въ прикладывать можно. Иногда однимъ бальсамомъ ршутынымъ врачуется.

3. Свищъ задняго прохода внутренний. Онъ причиняется по большей части язвою бывшею въ предстательной желѣзѣ или сѣменномъ пузырькѣ. Познается же по предшедшему воспаленію и возгноенію оныхъ частей, и истеченію сѣмени въ заднюю кишку во время плотскаго совокупленія.

Врачеваніе испытывать можно впрыскиваніемъ раствора ршутынаго, и внутреннимъ употребленіемъ камединой ршуты. Когда враче-

чеваніе бываетъ безуспѣшно, въ такомъ случаѣ должно искусно разрѣзать всѣ подлежащія части, дабы лѣкарства къ поврежденному мѣсту, или къ самому дну свища, прикладываемы бытъ могли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О сожатіи любострастногѣ задняго прохода.

Сожашіе устья задняго прохода и задней кишки есть самородная корча сихъ частей, любострастнымъ ядомъ причиненная.

Врачеваніе требуетъ того, чтобъ 1) расширить сожаемое устье задней кишки, посредствомъ свѣчи, ртутнымъ бальсамомъ смазанной. Свѣчи отъ времени до времени толще вкладывать, и внутренне употреблять камединную ртуть; 2) если сожашіе задняго прохода отъ свѣчъ не расширяется; въ такомъ случаѣ учинить насѣченіе на самомъ устьѣ задняго прохода, и при томъ продолжать вкладываніе свѣчъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О нарощеніяхъ любострастныхъ.

1. Нарощенія любострастныя ноздреватая причиняются любострастнымъ ядомъ около задняго прохода.

2. Мѣсто, на коемъ наибѣе таковыя наращенія случаются, у мужчинъ подъ самою крайнею плотью плѣшки, а у женщинъ около задняго прохода. Однакожъ онѣя видалъ я такъ же на губкахъ дѣтороднаго уда женскаго, на всей мошонкѣ, на пахахъ, на устахъ, на лицѣ, даже одинажды и на цѣломъ шлѣ онѣя видѣть случилось.

3. Сія болѣзнь кажется состоить въ самихъ закожныхъ сосочкахъ онѣ любострастнаго яда раздражаемыхъ и сверхъестественно вырастающихъ.

4. Таковыя наращенія называются различными именами, взглядомъ ихъ вида и величины.

1) Нарощенія гребенныя. Они бывають своимъ видомъ и величиною подобны пѣтушесму гребню, плодамъ ежевичнымъ, шелковичнымъ и проч.

Врачеваніе оныхъ кромѣ внутренняго ршущи употребленія, требуетъ и того, чѣмъ таковыя наращенія ежедневно дважды особливою сѣдающею водою, или сладкою ршущею растворенною въ жидкомъ усыпительномъ Сиденгачомъ составѣ, посредствомъ перушка или кисточки смазываютъ, и по томъ немедленно ршущею мазью съ верху покрываютъ

смы были. Такимъ образомъ оныя легко чрезъ нѣсколько недѣль совершенно пропадаютъ.

2) Нарощенія фиговыя. Они бывають гладкія, видомъ и величиною изображають винную ягоду, или фигу. Висящъ на толстомъ черешкѣ, и наилучше употребляются посредствомъ перевязки или отсѣченія. А самое мѣсто, откуда оныя вырѣзаны, вытяжкою свинцовою смазывать должно, дабы тѣжѣ наращенія снова не произошли.

3) Нарощенія цвѣшныя, или цвѣточныя. Они величиною и видомъ изображають голову цвѣшной капусты. И сей видъ наращенія ножемъ или ножницами отнимать должно.

4) Нарощенія сосочковатыя. Иногда вся кожа на мошонкѣ, или на пахахъ, или около задняго прохода бываетъ покрыта весьма мѣлкими сосочками, чрезъ увеличительное стекло зримыми, кои, какъ я примѣтилъ, суть не что иное, какъ весьма мѣлкія наращенія. Врачуются тѣмъ же способомъ, какъ и наращенія гребенныя.

ОТДѢЛЕНІЕ VI.

О болѣзняхъ паховыхъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О любострастныхъ паховикахъ.

1. Паховики любострастные суть опухоли паховыхъ желѣзъ; коихъ числомъ иногда токмо одинъ, а иногда многіе на одномъ или на обоихъ пахахъ рождаются.

2. Видъ оныхъ большею частію бываетъ круглый или круглопродолговатый. Великою же они иногда малы, иногда съ голубиное или съ куриное яйцо, а иногда и побольше кулака случаются.

3. У кормилицъ, кои сосцами своими воспитываютъ дѣтей любострастнымъ ядомъ зараженныхъ, примѣчены паховики подъ крыльцами. Я однажды видѣлъ у нихъ паховика на самомъ лонѣ. У дѣтей, кормилицею, любострастной болѣзни подверженною, воспитываемыхъ, опухоли подчелюстные или зобы любострастные рождаются.

4. Различіе паховиковъ, въ разсужденіи пріобрѣтенія, есть четверакое. А именно:

- 1) Паховикъ бѣлогрыжный. Онъ весьма часто примѣчается во время бѣлой грыжи воспалительной, и послѣ послабленія бывшаго во-
спа-

спаленія въ мочеиспускательномъ стволѣ, снова самъ собою пропадаетъ. Сей видъ паховика, какъ кажется, раждается отъ одного воспаления мочеиспускательнаго ствола, чрезъ сочувствіе чувственныхъ жилъ.

Брачеваніе таковаго паховика требуетъ лѣкарствъ воспаленію сопротивляющихся.

2) Паховикъ отъ мѣстной заразы. Любострастная зараза, отъ прекратившейся или малотекучей бѣлой грыжи, а чаще отъ засохшей малой язвы бывшей въ плѣшкѣ, или въ крайней плоти, чрезъ сукровиценосные сосуды будучи занесена въ паховыя желѣзы, причиняетъ сей видъ паховика.

3) Паховикъ отъ повсюдной заразы. Сей видъ паховика случается послѣ любострастной болѣзни уже существующей и повсюду въ тѣлѣ распространившейся.

4) Паховикъ отъ пошанной любострастной болѣзни. Иногда безъ всякихъ другихъ настоящей любострастной заразы знаковъ, паховики оказываются происходящіе отъ пошанной болѣзни.

5. Различія паховиковъ, въ разсужденіи ихъ свойства, примѣчаются слѣдующія :

1) Паховикъ воспалительный. Онъ рдѣетъ, краснѣетъ, горитъ или жжетъ, болитъ, бываетъ твердоватъ, и возрастаетъ величиною съ куриное яйцо. Едва можно его раз-

бить и разогнать, по большей части онъ переимѣняется въ возгноеніе.

Врачеваніе состоитъ въ томъ, чтобъ

- а) виѣ или съ верху покрывать новоначинающійся паховикъ тепловатою густою припаркою разбивающею, состоящею изъ порошковъ смягчительныхъ разваренныхъ въ водѣ, или мазью приуготовленною изъ меду сырку и корня мандрагоры; б) внутренне давать илюли состоящія изъ камединной ртужи, а при томъ проносное чрезъ каждые три дни употреблять.

- 2) Паховикъ возгноивающійся. Если вожженный паховикъ симъ способомъ разогнанъ быть не можеть; въ такомъ случаѣ возгноенію пособлять должно пластыремъ смягчительнымъ, царскою мазью и густою тепловатою смягчительною припаркою. Употребленіе пищи должно быть изобильнѣе; а при ощущении колебанія влаги содержимой въ опухоли, оную разрѣзать или вскрыть должно.

Если жъ паховикъ сими средствами не можеть быть приведенъ до совершеннаго колебанія или возгноенія; въ такомъ случаѣ частицу разбѣдающаго адскаго камня, величиною съ чечвицу, или малую горошинку, чрезъ одинъ или два часа къ самой срединѣ паховика прикладывать; а приженной струпъ царскою мазью смѣшанною съ неаполитанскою, и теп-

лова-

ловашою смягчительною припаркою съ верьху прикрывать должно. Таковымъ образомъ паховикъ нечувствительно изъ себя испускаетъ гной въ немъ содержимый, и мало по малу совсѣмъ пропадаетъ.

Внутренно пилюли состоящія изъ камединой ршущи продолжать нужно

- 3) Паховикъ затвердѣлый. Онъ познается твердостью и неощущениемъ никакой боли; и иногда бываетъ столь жестокъ, что ни какими средствами не можно онаго ни разбить, ниже въ гной превратить.

Разогнаніе испытывать должно внутреннимъ камединой ршущи употребленіемъ, выпяжкою омега, камеди баккауса и другими разбивающими; внѣ прикладывать неаполитанскую мазь смѣшенную съ равною частью мази свиного хлѣба и порошка корня мандрагоры.

Иногда и жидкая примочка состоящая изъ водяного ршущаго раствора воспользовала. Если затвердѣлый паховикъ не можетъ быть разогнанъ, ниже приведенъ смягчительными въ возгноеніе: въ такомъ случаѣ разбѣдающій камень, тѣмъ же способомъ, какъ и при первомъ видѣ мною сказано было, прикладывая надлежитъ.

- 4) Паховикъ ошюковый. Иногда затвердѣлаго паховика великая свирожность вспухаетъ ошюкомъ,

комѢ , и отѢ прикосновенія перста вѢ себѢ сохраняетѢ впечатлѣнную яику.

Врачеваніе требуетѢ теплой , жидкой , разбивающей и ароматической теплой примочки , и повторенія проносныхѢ , кои сверхѢ внутренняго ртуши употребленія , давать должно.

- 5) ПаховикѢ антоновымѢ огнемѢ пораженный. Паховики вѢ дынгошныхѢ тѢлахѢ , гнилыхѢ и опочивающихѢ вѢ больницахѢ , иногда отѢ разбѣдающаго лѣкарства чрезмѣрно увеличеннаго , и къ нимѢ приложеннаго , превращающіся вѢ антоновѢ огонь.

Врачеваніе вѢ такомѢ случаѢ требуетѢ внутренняго и внѣшняго употребленія лѣкарствѢ гнилосни сопротивляющихся , какѢ то : лихорадочной корки , канфоры и бараньей травы.

- 6) ПаховикѢ язвенный. Язвы на паховикахѢ случившіяся иногда бывають малыя и легкія , и удобно исцѣляются фагаденовою водою или ртутнымѢ бальсамомѢ. А иногда таковыя язвы распространяются широко , болятѢ чрезмѣрно , бывають сосковатыми , сопротивляются всякому лѣкарству , и на себѢ являють видѢ опухоли вѢ рака претворяющейся. Врачеваніе требуетѢ того , чтобѢ внутренне давать камединную ртушь купно съ лихорадочною коркою ; а внѣ употреблять растворѢ ртутный бальсамическій , и присыпать осаженною

женною красною ртутью, тогда когда ноздреватое мясо при томъ нарастаетъ.

- 7) Паховикъ свищевый, ноздреватый, или дыравый. Паховикъ возгнояющійся, въ разныхъ мѣстахъ открывающа, и будучи оставленъ безъ всякаго смотрѣнія, иногда на одномъ, а иногда на многихъ мѣстахъ получаетъ глубокіе свищи; норы или пазухи.

Врачеваніе требуетъ того, чтобы норы и пазухи свищевыя вскрыть, разрѣзать, и такимъ же образомъ, какъ и первый видъ паховика врачевать.

- 8) Паховикъ ракомъ пораженный. Паховики чрезъ многіе годы будучи оставлены безъ всякаго лѣченія, либо бывши пользованы неприличными лѣкарствами, превращаются въ настоящаго зашвердѣлаго, окрѣплаго или ноздреватаго рака. Иногда взваръ лихорадочной корки, водка настоянная со смирною, жидкій усыпительный Сиденгамовъ составъ, и сладкая или мореная ртуть производятъ чудесное дѣйствіе.

Врачеваніе требуетъ того, чтобы вырѣзать цѣлаго рака, если токмо есть надежда истребить онаго съ корнемъ.

62 зашвердѣлость тука. пятна.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О затвердѣлости закожного тука.

Зашвердѣлость любострасшная закожного тука, жира или сала бываетъ на самомъ чревѣ. отъ любострасшнаго яда.

Врачеваніе требуетъ, кромѣ внутренняго рипуши употребленія, еще и того, дабы зашвердѣлость неаполитанскою мазью нѣсколько разъ въ сутки смазываема была.

ОТДѢЛЕНІЕ VII.

О закожныхъ любострасшныхъ болѣзняхъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О любострасстныхъ лятнахъ.

1. Любострасшныя пятна бываютъ краснотелыя, круглыя, нѣсколько возвышенныя, бѣлыми краями окруженныя, отъ любострасшнаго яда происходящія.

2. Онѣя весьма часто высypають около чела, и составляютъ такъ называемой венеринъ вѣнецъ. Не рѣдко на лицѣ, передней части туловища, и между лопатокъ, а иногда почти по всему шѣлу случаются.

3. Они весьма зудящъ и чешутся, иногда бываютъ весьма малы какъ веснушки, а

ино-

иногда весьма широки. У младенцовъ рожденныхъ отъ матери подверженной любострастной болѣзни, не много спустя послѣ родовъ, выступаютъ около задняго прохода и дѣшородныхъ частей.

4. Врачеваніе требуетъ внутренняго употребленія камединой ртути. А въ фугагеновою водою или разведеннымъ ртутнымъ растворомъ оныя смывать должно.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О любострастной чесоткѣ.

1. Любострастная чесотка или короста есть не что иное, какъ пупырышки твердые, красные, на самой верхушкѣ гноящіяся и струпьями покрытые.

2. Таковая чесотка, купно съ любострастными пятнами цвѣта желтаго или мѣднаго, на лицѣ и на прочихъ частяхъ выступаетъ.

3. Оная лечуется такимъ же образомъ, какъ и любострастные пятна.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О трещинахъ любострастныхъ.

1. Трещины любострастные бываютъ сухи и глубоки, на кожѣ около задняго прохода,

хода, и внѣшняго устья рукава матки, а иногда даже на ручныхъ ладоняхъ, и ножныхъ подошвахъ примѣчающся.

2. Онѣ врачуются весьма шрудно.

Внутренно должно давать камединную ртуть; а внѣ прикладывать насыщенной растворъ сулемы и мазь состоящую изъ осажденной бѣлой или красной ртути.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О пупырышкахъ любострастныхъ.

1. Пупырышки любострастные сперва бывающъ пятнами довольно возвышенными, потомъ вскорѣ премѣняющся въ язвы закожные.

2. Они всего чаще занимаютъ мѣсто на голеняхъ и около ручныхъ кистей, а иногда около задняго прохода и дѣшородныхъ частей.

3. Они рѣдко остаются долговременно безъ перемѣненія въ язвы; и для того сверхъ внутренняго употребленія ртути, немедленно и часто ртутнымъ растворомъ оныя смывать должно.

ГЛАВА ПЯТАЯ

О лишаихъ любострастныхъ.

1. Лишай любострастный есть пяшино красное, наполненное самыми мѣлкими со-сочками, пупырышками или пузырьками, пре-мѣняющимися въ чешуйки.

2. Лишай часто по ушамъ, головной ма-кушкѣ, а иногда какъ на груди, такъ и на прочихъ тѣлесныхъ частяхъ случающся.

3. Врачеваніе истребуешь того, чпюбъ вну-тренно употреблять камединную ршущь куп-но со взваромъ пасліона; а внѣ пользуется частое мытье той части, на коей лишай обрѣшается, фагаденовою водою, или рас-творомъ сулемы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О струльяхъ головныхъ любострастныхъ.

1. Сшрупья головныя любострастныя бы-ваютъ числомъ многія, сухія, бѣлыя, или зеленоватыя, обыкновенно на головной ма-кушкѣ, а иногда такъ же около чела и ви-скоеъ, у больныхъ любострасною болѣз-нью зараженныхъ примѣчаемыя.

2. Виды оныхъ суть слѣдующіе:

1) Сшрупья отъ любострастной болѣзни пов-сюдной или явной. Они бываютъ сопряжены

Часть I.

Д

сѣ

съ любострастными пятнами, а при томъ купно и съ нѣкоторыми знаками любострастной болѣзни.

Они врачуются внутреннимъ употребленіемъ камединной ршущи; а внѣ ршущимъ balsamomъ по мѣстамъ бережно смазываются быть должны. Въ закоренѣлой болѣзни, по примѣчаніямъ моимъ, смазыванье струпьевъ фаденовою водою, или растворомъ сулемы пользуютъ.

- 2) Струпья отъ любострастной болѣзни пощаенной или скрышной. Оныя у младенцовъ рожденных отъ матери подверженной болѣзни, или у дѣтей воспитываемыхъ таковою жъ кормилицею, безъ прочихъ знаковъ сего болѣзни случаются. Врачеваніе состоитъ въ томъ же средствѣ, какъ и въ первомъ видѣ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О власопаденіи любострастномъ.

1. Власопаденіе любострастное есть то, когда власы не шокмо изъ головы, но и изъ всего шѣла низпадаютъ.

2. Иногда брови и вѣки очные, такъ же и власы покрывающіе лоно низпадаютъ.

3. Врачеваніе бываетъ безуспѣшно, если корешки власовъ отъ любострастного яда уже совсѣмъ истребились; ибо въ таковомъ
слу-

случаѣ, власы, и по уврачеваніи сея болѣзни, болѣе никогда не вырастаютъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О порчѣ ногтей.

1. Порча ногтей бываетъ либо на одномъ которомъ ни есть, либо вдругъ на многихъ перстахъ, съ настоящими язвами.

2. Таковая порча чаще на ножныхъ, чѣмъ на ручныхъ ногтяхъ примѣчается.

3. Иногда она имѣетъ свое начало отъ явной или повсюдной, а иногда отъ скрыпной или частной любострастной болѣзни.

4. Врачеваніе совершается посредствомъ внутренняго употребленія камединой рпуши, особливо если еще и сулемы растворъ въ мастихитной водкѣ виѣ употребляемъ будешь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О зудѣ любострастномъ.

1. Зудъ, или чесотка любострастная, есть непрерывное ощущеніе побуждающее къ тому, чтобъ себя самого чесать и царапать ручными ногтями, отъ любострастного яда происходящее.

2. Зудъ въ дѣшродныхъ частяхъ ощущаемый, раждається у мужчинъ на самой

плѣшкѣ дѣшороднаго уда, а у женщинѣ на самомѣ виѣшнемѣ устьѣ рукава мапки, отѣ нечистаго совокупленія. Онѣ иногда бываешѣ споль сильный и жестокій, что бѣльные сами себѣ своими ногтями кожу разцарапывающѣ до крови, и чрезѣ многіе дни продолжаешся.

3. Врачеваніе требуешѣ частаго мышья зараженныхѣ частей, помощію водянаго ршущнаго раствора, или виѣшняго ршущной мази упошребленія.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О проказѣ любострастной.

1. Любострастною проказою называется то, когда кожа совсѣмѣ обнажаешся отѣ власовѣ, и при томѣ обезображиваешся шрѣщинами, буграми, или возвышенными наращеніями и спрупьями, на лицѣ и другихѣ частяхѣ шѣла, отѣ любострастнаго яда происходящими.

2. Врачеваніе требуешѣ, сверхѣ внутренняго упошребленія ршущи, еще и того, чтобѣ вся поверхность шѣла была смываема ршущнымѣ растворомѣ. Однакожѣ настоящая проказа ршущю не врачуется, но взваромѣ багульника.

ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ.

О язвахъ любострастныхъ закожныхъ.

1. Язвы любострастныя закожныя обезображиваютъ только одну кожу, большею часью бывають круглыя, сальныя, имѣють край мягкія и красныя.

2. Любострастныя язвы широкія много сходствуютъ съ ракомъ чувствительножилымъ, но въ любострастныхъ язвахъ край бывають мягкіе и красноватые; а въ пораженныхъ ракомъ бывають весьма твердые и блѣдные.

3. Язвы отъ любострастной заразы повсюдной или явной раждаются отъ предшедшихъ любострастныхъ пятенъ или пузырьковъ, и легко познаются по предшедшимъ, или еще существующимъ любострастнымъ припадкамъ. Онѣ врачуются внутреннимъ употребленіемъ камединой ршущи; а внѣ ршущей бальсамъ употребляшь должно.

4. Язвы отъ любострастной заразы сокрытой раждаются безъ обыкновенныхъ любострастной болѣзни знаковъ, отъ наслѣдственной или пріобрѣтенной и худо врачеванной сей болѣзни. Онѣ очищаются будучи сверху посыпавъ мореною ршущю, если только сущь любострастныя; но оная отнюдѣ

не пользуется, если онѣ имѣютъ свое начало отъ другой причины.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е VIII.

О любострастныхъ очныхъ болѣзняхъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О любострастномъ окоболѣніи.

1. Любострастное окоболѣніе есть красна и боль въ очахъ, отъ любострастного яда.

2. Виды онаго суть слѣдующіе:

1) Окоболѣніе отъ бѣлой грыжи есть жестокое воспаленіе очей, у мужчинъ отъ прекращенія бѣлой грыжи, а у женъ отъ прекращенія бѣли раждающееся. Причиною сего есть вещество бѣлой грыжи, чрезъ преселеніе засѣвшее въ клѣпчечой сѣтви союзной оболочки ограждающей очной шаръ и очныхъ вѣковъ поверхность.

Распознавается же симъ образомъ: на другой или третій день послѣ прекратившейся бѣлой грыжи раждается преизобильное изъ краснѣющаго ока печеніе гнойной блѣдно-желшовапой влаги весьма подобной веществу, во время бѣлой грыжи изъ дѣтороднаго мужескаго уда истекающему. Краска очей почти всегда перемѣняется въ воспа-

ле-

леніе столь сильное, что роговая очная оболочка совсѣмъ помрачается, и отъ чрезмерной опухоли бѣлочной плѣвы, кажется якобы въ ямку вдавленной.

Сіе окоболѣніе по большой части прѣмѣняется въ нагноеніе и язву роговой и бѣлочной оболочекъ; отъ чего непрозрачность роговой оболочки, или возгноеніе ока, либо неизлѣлимая слѣпота, по причинѣ разрушенія внутреннихъ частей очнаго яблока приключаются.

Врачеваніе требуетъ того, чтобъ 1) пустить кровь и дать проносное воспаленію сопротивляющееся; 2) внутренно употреблять камединой ршущи по 30 гранъ ежедневно; 3) воспаленное око повсечасно промывать теплымъ ршущымъ молокомъ или разведеннымъ растворомъ морской ршущи, посредствомъ маленькой очной чашечки либо другаго сосуда. Симъ однимъ средствомъ я счастливо укрѣпалъ многихъ, и отвратилъ слѣпоту.

Врачеваніе понынѣ употребляемое есть сіе: кровопусканіе, къ очнымъ глазкамъ приспавленные нарывныя, банки, рожки, источники, проносныя чрезъ каждую недѣлю предписываемыя, тепловатыя припарки разбивающія къ

очамъ, и смягчительныя примочки къ дѣтскому уду прикладываемыя, дабы бѣлая грыжа снова оказалась. Разрѣзаніе ока и союзной очной оболочки не принесло ни какой пользы. Я видѣлъ многихъ ошѣ сего способа ослабшихъ. Надлежало бы испытать, что могло бы произвести прививаніе бѣлой грыжи, посредствомъ малой свѣчи смазанной гноемъ ядовитой бѣлой грыжи, и запущенной въ мочеиспускательной стволъ, дабы она въ сей болѣзни снова отпрыгнулась?

2) Окоболѣніе отъ заразы повсюдной или явной. Сей видъ имѣетъ свое начало ошѣ любѣспрашной острошы, по всему шѣлу разлившейся. Краска бываетъ долговременная, однакожъ не столь жесткая, какъ въ окоболѣніи ошѣ бѣлой грыжи происходящемъ. Сей видъ болѣзни послабляетъ около ушреняго времени, и никогда не премѣняется въ воспаленіе ока, какъ то случается въ первомъ.

Врачуется внутреннимъ употребленіемъ камединой ршущи; а внѣ припарки и примочки тепловатыя состоящія изъ ршущаго млека, или очной ршущей бальсамъ прикладывашь должно. Взваръ просвинокъ, растворивъ въ фунтѣ онаго гранъ одинъ ршущи, иногда приносилъ скорое облегченіе.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О гноетеченіи очномъ любострастнымъ.

1. Гноетеченіе очное любострастное есть то, когда гнойная мокрота по краямъ очныхъ вѣковъ иссекаетъ.

2. Виды онаго суть слѣдующіе:

1) Гноетеченіе очное отъ прекращенія бѣлой грыжи или бѣли. Сей видъ есть предзнаменованіемъ имѣющаго быть окоболѣнія, отъ бѣлой грыжи происходящаго; а иногда оно бываетъ и долговременною болѣзнію.

Врачеваніе требуетъ кромѣ внутренняго употребленія камединой ртуті, еще и очнаго краснаго бальсама, или ртутнаго раствора въ взварѣ просвинокъ, какъ выше въ главѣ о любострастномъ окоболѣніи сказано.

2) Гноетеченіе любострастное новорожденныхъ дѣтей. Младенцы рожденные отъ зараженной матери, по прошествіи нѣсколька недѣль послѣ родовъ начинаютъ страдать опухолью очныхъ рѣсницъ; спустя немного времени великое количество бѣло-зеленоватаго гноя иссекаетъ изъ oka, такъ какъ и изъ мочеиспускательнаго сѣвола, въ случаѣ бѣлой грыжи; при чемъ воспаленіе oka иногда малое а иногда жестокое бываетъ.

Таковое гноепеченіе есть первѣйшимъ знакомъ любострастной заразы потасно кроющейся въ младенцѣ. Иногда оно оказывается безъ всякаго любострастнаго знака; и будучи худо лѣчимо, премѣняется въ весьма худое возгноеніе ока, и въ слѣпоту совершенную.

Брачеваніе требуетъ тѣхъ же средствъ, что и первый видъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О пятнахъ любострастныхъ роговой очной оболочки.

1. Пятна любострастные на роговой очной оболочкѣ суть не что иное, какъ перемѣна ея цвѣта, любострастнымъ ядомъ причиненная. Иногда токмо нѣкоторая ея часть, а иногда вся она помрачается, и потемняется.

2. Пятна отъ предшедшей любострастной очной болѣзни; какъ то отъ прежде бывшаго окоболѣнія, гноепеченія, или отъ язвы любострастной на роговой оболочкѣ.

Брачеваніе требуетъ внутренняго камединной ршущи употребленія; а внѣ пятно, или очную роговую оболочку потемнѣвшую, расшворомъ ршущи, ежедневно по два раза посред-

посредствомъ кисточки очищать, или только слегка оной касаться, и по томъ мазью красною очною, количествомъ около грана, трижды въ день смазывать должно.

3. Пятна отъ пошанной заразы новорожденныхъ дѣтей. Новорожденные младенцы, коихъ мать заражена была любострастною бѣлою, часто спорадичѣ помраченіемъ роговой очной оболочки, иссушеніемъ и бездѣйствіемъ очей.

Врачеваніе, посредствомъ лѣкарствъ для перваго вида похваляемыхъ, въ самомъ началѣ болѣзни производимое въ дѣйство, весьма часто приноситъ пользу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О язвахъ любострастныхъ роговой очной оболочки.

1. Любострастная язва на поверхности роговой очной оболочки бываетъ отъ любострастнаго яда.

2. Виды онаго суть слѣдующіе.

1) Язва отъ любострастной очной болѣзни, какъ то отъ преждебывшаго, или еще существующаго окоболѣнія, бѣлою грыжею, или любострастною заразою причиненнаго.

Врачеваніе требуетъ кромѣ внутренняго употребленія камединой ршуты, еще и того,

го, чтобъ внѣ прикладывать очной ртутной растворъ разведенной розовымъ медомъ.

2) Язва отъ заразы скрышной или повсюдной.

Въ обѣихъ случаяхъ иногда найдены были язвы въ роговой очной оболочкѣ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О любострастноиъ загноеніи очной камеры.

1. Загноеніе въ передней очной камерѣ бываетъ отъ любострастной заразы.

2. Виды онаго суть слѣдующіе:

1) Загноеніе очной передней камеры отъ прекращенія бѣлой грыжи. Я видѣлъ сей видъ очнаго загноенія бывшаго безъ жестокаго вожженія. Проносныя лѣкарства и теплая примочка, изъ взвару корня просфирока состоящая и съ молокомъ ртутнымъ смѣшенная принесли явственную пользу.

2) Загноеніе очной передней камеры отъ любострастнаго очнаго воспаления. Когда роговая очная оболочка будучи разбѣдена гноемъ, въ очныхъ камерахъ скопившимся, прѣснетъ или прорвется; тогда очныя влаги отъ гноя испортившіяся и разжидѣвшія, вонъ вытекаютъ; а отъ того очной луковицы бездѣйствіе, иссушение и слѣпоша неизлѣлимая послѣдуютъ.

Вра-

Врачеваніе новоначинающагося очнаго затносія есть тожъ самое, что и въ случаѣ окоболѣнія, бѣлою грыжею причиненнаго.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О свищѣ слезномъ любострастнои.

1. Свищъ слезный любострастный есть истечение гнойной мокроты, отъ давленія слезныхъ почекъ бывающее, отъ любострастнаго яда засѣдшаго въ желѣзкахъ слезнаго мѣшечка.

2. Виды онаго суть сѣи.

1) Свищъ слезный отъ прекращенія бѣлой грыжи. Врачуется внутреннимъ употребленіемъ камединой ртуті, а внешнимъ прикладываніемъ самаго тончайшаго водянаго раствора. Иногда такой свищъ бываетъ отъ скрытной заразы.

2) Свищъ слезный отъ костоѣдицы слезной кости. Сей видъ есть хуже всѣхъ прочихъ. Врачеваніе требуетъ, сверхъ внутреннихъ лѣкарствъ, еще и мастихичной водки смѣшенной съ усыпительною ртутью, прикладываемой къ самой костоѣдицѣ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О ячменцѣ любострастнои.

Ячменецъ любострастный есть шишка, или бугорокъ красный, малому вереду подобный,

бный, на рѣсницахъ очныхъ вѣковъ, отъ любоспрасшнаго яда нарастающій.

Врачуется внутреннимъ употребленіемъ камединой ртуті, и вѣшнимъ прикладываніемъ ртутнаго молока.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О бѣлмѣ любострастнои.

1. Бѣльмо любоспрасшное есть слѣпота отъ непрозрачности крышталловидной горошинки, причиненной любоспрасшною заразою.

2. Бѣльмо отъ прекращенія бѣлой грыжи. Иногда безъ окоболѣнія, бѣлою грыжею причиненнаго, бѣльмо рождается. Однакожь я дважды видѣлъ непрозрачность или помраченіе крышталловидной горошинки, оставшую по уврачеваніи окоболѣнія, бѣлою грыжею причиненнаго.

Врачеваніе предпринимать можно посредствомъ внутренняго употребленія камединой ртуті, или пилюль составленныхъ изъ мореной ртуті; а если врачеваніе бываетъ безуспѣшно, въ такомъ случаѣ должно сперва предпринять излѣченіе бѣлма.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О слѣлотѣ любострастной.

1. Слѣпоша любострастная есть помраченіе зрѣнія, безъ явственнаго очнаго поврежденія, причиненное любострастнымъ ядомъ.

2. Виды онаго суть сїи.

1) Слѣпоша ошѣ нечистаго совокупленія. Она я примѣчена была вскорѣ послѣ бывшаго соитїя. Въ семъ случаѣ немедленно надлежитъ внутрь давать проносное лѣкарство и камединную ршуть.

2) Слѣпоша ошѣ повсюдной или явной заразы. Сей видъ слѣпоты обыкновенно сопряженъ бываетъ съ очною болью и бессонницею. Слѣпоша раждающаяся ошѣ костнаго наращенія или бугорка сдавливающего чувствительную зрительную жилу, имѣетъ свое начало либо ошѣ водяныхъ любострастныхъ пузырьковъ бывающихъ въ сѣтеобразной очной оболочкѣ, или въ зрительной чувствительной жилѣ, которую посредствомъ слинопроизведенія лѣчить совѣшуютъ.

Внутренно можно давать камединную ршуть, или сулему купно со взваромъ волчьяго перца.

ОТДѢ-

80 глухота. гноешеченіе изъ ушей.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е IX.

О любострастныхъ ушныхъ болѣзняхъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О глухотѣ любострастной.

1. Глухота любострастная есть совершенное или несовершенное пошерыніе слуха причиненное любострастнымъ ядомъ.

2. Виды онаго суть сїи:

1) Глухота отъ прекращенія бѣлой грыжи, познается тѣмъ, что не много спустя по прекращеніи бѣлой грыжи примѣчается.

2) Глухота отъ костнаго наращенія, или отъ ушной сѣры, или отъ костобдицы слуховаго органа.

3) Глухота отъ порчи любострастной въ челюсти существующей; какъ то отъ Евстахіевой трубы сросшейся, по причинѣ бывшей въ ней язвы, или захряснувшей, или сожапой распухшими миндалинами.

3. Врачеваніе во всѣхъ видахъ глухоты пребуемъ внутренняго камединой ршущи употребленія.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О ушнои гноешеченіи любострастномъ.

1. Любострастное гноешеченіе ушное есть то, когда гнойная мокрота истекаетъ изъ
слу-

слуховаго виѣшняго прохода.

2. Виды онаго сущь сїи:

1) Гноетеченіе ушное простое, безъ язвы, по прекращенїи бѣлой грыжи, иногда случающееся.

Врачеваніе требуетъ употребленія ртути внутренняго, и впрыскиванія водянаго ртутнаго раствора.

2) Гноетеченіе отъ костеѣдицы. Слуховыя косточки и костяной ушной сводъ иногда отъ любострасной костеѣдицы разбѣдены бывающъ. Отъ чего сирадная и ошрая мокрота исшекаетъ, слуховыя косточки вонъ исходятъ, и неисцѣлимая глухоша послѣдуетъ; а когда еще отъ костеѣдицы и весь каменистый слуховой ошроспокъ даже до самаго мозга разбѣденъ будетъ, то отъ того и самая смерть приключиться можетъ.

Врачеваніе требуетъ кромѣ внутренняго камединной ртути употребленія, еще и того, чпюбъ растворъ ртутный бальсамическій былъ впрыскиваемъ въ самую слуховую впадину.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е Х.

О болѣзняхъ любострастныхъ носо-
выхъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О любострастномъ насморкѣ.

1. Любострастный насморкъ есть печеніе гнойныхъ мокротъ изъ самихъ ноздрей, безъ явственной язвы случающійся.

2. Виды онаго суть сіи:

1) Насморкъ бѣлогрыжнй, или бѣлая грыжа носовая. Спустя не много времени по прекращеніи бѣлой грыжи, иногда случается печеніе гнойной и изобильной клейкой мокроты изъ ноздрей безъ всякой язвы въ оныхъ; мокрота истекающая бываетъ весьма подобна мокротѣ истекающей при бѣлой грыжѣ.

Врачеваніе требуетъ внутреннаго употребленія камединной ршупи; а внѣ надлежитъ ноздрями втягивать спончайшій ршупный растворъ.

2) Насморкъ отъ внутренней заразы происходящій; когда напримѣръ посредствомъ плашка, или полошница, или ручныхъ перстовъ, любострастный ядъ ноздрямъ сообщается. Врачуется тѣмъ же образомъ, какъ и первый.

ГЛАВА

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О язвѣ любострастной носовой.

1. Язва любострастная носовая случается отъ любострастного яда внутрь или внѣ носовой впадины.

2. Виды оной суть сїи:

1) Язва носовая внѣшняя. Сперва раждается красное пятно около носовыхъ боковъ; по томъ оное мало помалу возвышается бугоркомъ плоскимъ, перемѣняется въ язву, разбѣдаетъ носовые бока и далеко повсюду распросирается, если правильное лѣченіе употреблено въ скоромъ времени не будетъ.

Врачеваніе пребудетъ того, чтобъ болящее мѣсто внѣ растворомъ ртутнымъ бальсамическимъ покрываемо, а внутрь камединовая ртуть употребляема были.

2. Язва носовая внутренняя, есть язва внутрь самихъ ноздрей, которая распознается по истеченію гноеватой сукровицы, и чрезъ разсмотрѣніе ноздрей.

Врачеваніе внутреннее пребудетъ камединовой ртутіи купно съ дурнымъ духомъ; а внѣ должно впрыскивать насосомъ, или ноздрями ытягивать воду ртутную известковую, или бальсамическій ртутный растворъ, смѣшенный съ розовымъ медомъ.

3) Язва носовая костеѣдная или гніючая rozpoзнается чрезъ исшеченіе тнойной и при томъ весьма смердящей сукровицы; а иногда и опломки ноздреватыхъ косточекъ, или носовой перегородки съ возгрями высмарки-
вающихся; и весь носъ внизъ приупадасѣ.

Врачеваніе есть то же самое, что и при первомъ видѣ.

4) Язва носовая пазухи мокротной лби-
ной. Язва костеѣдная или гніючая раждаеш-
ся надъ носовымъ корнемъ, проникающая
въ самую лбинную мокротную пазуху; что
посредствомъ щупа испытывается.

Врачеваніе требуетъ того, чтобъ косте-
ѣдная сукровица могла свободно исшекать
вонъ чрезъ устье пазухи, зѣяющее въ носо-
вую впадину; а еслибы оное было сросшее-
ся, въ такомъ случаѣ должно въ оной пазухѣ
внѣ учинить прободеніе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О безобразіи носа любострастно.иѣ.

1. Безобразіе носа любострастное есть
пріупаденіе носа, или потеря онаго съ обѣ-
ихъ или съ одной стороны.

2. Виды онаго суть сіи:

1) Безобразіе носа отъ приупаденія онаго. Когда кость лица разбѣдается носовую перегородку поддерживающую весь носъ; или когда, какъ по иногда случается, она поршѣ и собственныя носовыя косточки; въ такомъ случаѣ всѣ внѣшнія носа части внизъ припадаютъ: лице такихъ людей, подобно обезьянѣ, обезображивается, и цѣлая жизнь оныхъ представляетъ явные знаки преждебывшей любострастной болѣзни.

Таковъ болѣзненный припадокъ есть неисцѣлимый; иногда вмѣстѣ съ носомъ и цѣлое лице чуднымъ образомъ обезображивается.

2) Безобразіе отъ потери боковой части носа. Когда съ одной или съ обѣихъ сторонъ носа нижняя онаго хрящевая часть отъ язвы разбѣдена и испреблена бываютъ; въ такомъ случаѣ носъ только въ одну или въ обѣ ноздри безобразно зияетъ, либо съ одной или обѣихъ сторонъ теряется. И сей болѣзненный припадокъ, равно какъ и первый, есть неизлѣчимый.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О безгласіи любострастнолю.

1. Безгласіе любострастное есть не что иное, какъ непріятное рѣчи произношеніе.

2. Виды онаго суть сїи:

1) Безгласіе происходящее отъ поврежденія ноздрей. Когда ноздри язвою или опухолью любостраспною завалены бывають; въ такомъ случаѣ произношеніе рѣчи, одними только устами, безъ всякаго содѣйсствія ноздрей, бываешъ.

2) Безгласіе отъ поврежденія челюстей, какъ то отъ горпани язвами покрытой, отъ развѣденнаго язычка, и отъ сквознаго отверстія въ поднебеньѣ.

Врачеваніе требуетъ отвращенія того порока, который есть причиною безгласія.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е Х I.

О болѣзняхъ любостраспныхъ устъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О молочницѣ любостраспной.

1. Молочница любостраспная есть не что иное, какъ малыя язвы во впадинѣ рта, на поверхности онаго бывающія. Молочница не токмо занимаетъ всю впадину челюстей, миндалины и язычекъ; но и всю внутреннюю поверхность губъ и самые углы оныхъ. Но молочница рштуя причиняемая изобильно случается по сторонамъ и при основаніи
языка,

языка, также на внутренностяхъ ланитъ, и въ самыхъ устьяхъ Стененовыхъ пропоковъ слинопочащихъ.

2. Виды молочницы суть сїи :

1) Молочница отъ повсюдной заразы. Таковыя отъ молочницы малыя язвы бывають покрыты клейкою песочною или бѣлою слизью, и отъ одной ко другой части распространяются. Она распознается по преждебывшимъ любострастнымъ болезненнымъ припадкамъ.

Врачеваніе требуетъ внутренняго камединной ртуті употребленія, и внѣшняго ртутнаго полосканья.

2) Молочница отъ воздоенія сосцами любострастной кормилицы. Сей видъ молочницы весьма часто примѣчается въ младенцахъ воспитуемыхъ любострастною кормилицею; и, какъ я самъ видалъ, отъ однихъ поцалуевъ таковой кормилицы, дѣтямъ приключаются любострастныя язвы на губкахъ.

Врачеваніе таковыхъ дѣшей требуетъ ртутнаго сиропа. А внѣ должно полоскать ротъ ртутнымъ растворомъ смѣшеннымъ со ртутнымъ медомъ или сиропомъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О любострастныхъ язвахъ нюба.

1. Язвы любострастныя случаются въ нюбѣ или поднебеньѣ отъ любострастного яда.

2. Виды оныхъ суть сіи:

1) Язвы простыя. Онѣ начинаются сперва краснымъ пяшномъ, нѣсколько возвышеннымъ, копорое мало помалу превращается въ гниусную язву, и часто разѣдаетъ нюбныя кости костеѣдицею.

Врачеваніе внутреннее пребуешъ рштуьнаго бальсамического раствора смѣшеннаго съ розовымъ медомъ, и внутренняго камединой рштуи употребленія.

2) Язвы разѣдающія насквозь нюбо. Иногда костеѣдица разѣдаетъ нюбныя кости даже до самой носовой впадины; въ такомъ случаѣ съ превеликимъ омерзѣніемъ часть пищи и пищія во время поглощенія, выпадають въ ноздри, и по томъ вонъ изъ оныхъ.

Врачеваніе, кромѣ внутренняго камединой рштуи употребленія, пребуешъ еще и того, чшобъ оныя язвы ежедневно по нѣсколько разъ кисточкою смазываемы были бальсамическимъ рштуьнымъ растворомъ смѣшан-

шаннымъ съ медомъ, или чѣмъ трѣцкая губа оною ессенціею напоенная, посредствомъ нѣбнаго купора, къ костеѣдному отверстію прикладываема была.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О чесоткѣ любострастной подбородка.

Чесошка любострастная спирунная, отъ любострастнаго яда раждающаяся, объемлетъ всю окружность подбородка.

Врачеваніе требуетъ внутренняго камединной ршупи употребленія, и вѣшняго прикладыванія известковой ршупьной воды.

ОТДѢЛЕНІЕ XII.

О любострастныхъ болѣзняхъ вѣйныхъ и горшанныхъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О любострастныхъ зобахъ вѣйныхъ.

1. Любострастные вѣйные зобы, или желваки, суть затвердѣлая окрѣпости подчелюстныхъ, или вѣйныхъ желѣзъ, на самой выи случающіяся.

2. Виды оныхъ суть сїи:

1) Любострастные вѣйные зобы отъ повсюдной заразы. Они познаются по суще-

свующимъ другимъ любостраснымъ болѣзнямъ, и по большой части токмо слегка воспаляются. Иногда только одинъ, а иногда многіе зобы вмѣстѣ случаются. Рѣдко онѣ разбиваются, а большею частью премѣняются въ долговременныя язвы вѣйныя.

Врачеваніе требуетъ внутренняго камединой ршупи употребленія, и вѣшняго прикладыванія раствора ршутнаго съ соннымъ зѣлемъ смѣшеннаго.

2) Любострасныя вѣйныя зобы отъ скрышной заразы. Младенцы, коихъ родители прежде любострасной болѣзни подвержены были, шакъ же и тѣ дѣти, у коихъ спрунья на головѣ несовершенно лѣчатся, доспигши совершеннѣйшаго возраста, спраждутъ шакowymi зобами.

Для внутренняго врачеванія оныхъ зобовъ похваляются камединая ршуть, мореная ршуть, и минеральный еѳіопъ, или сѣрно-ршутный составъ съ соннымъ зѣлемъ смѣшенный.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О любострасной жабѣ.

1. Любострасная жаба есть трудное и съ болью сопряженное глопаніе причиненное
любо-

любострастнымъ ядомъ засѣдшимъ около горшани. Никакіе болѣзненные любострастные припадки споль часто не усматриваются, какъ пятна и язвы горшанныя.

2. Виды сея болѣзни суть сїи:

1) Жаба воспалительная. Познается пятнами красными и широкими, кои превворяются въ малыя язвы, на поверхности зримыя, или въ любострастную молочницу.

Врачеваніе требуетъ внутренняго камединой ртуті употребленія и простыхъ лѣкарствъ, возженію сопротивляющихся; и внѣшняго полосканья ртутнаго.

2) Жаба съ язвами сопряженная. Познается по язвамъ песочнымъ, гнуснымъ, сальнымъ, широкимъ, около воздушной и пищепрїемной трубы, такъ же около язычка, миндалинъ и нѣбной преграды распространяющимся; а при томъ хриплымъ и сквозь носъ произносимымъ голосомъ; и на концѣ смердящимъ, и клейкомокромнымъ слинопеченіемъ.

Врачеваніе состоитъ въ томъ, чтобъ внутренно давать камединую ртуть и изваръ сарсапарели; а внѣ употреблять ртутное полосканье.

3)

3) Жаба застарѣлая или укóренѣлая. Въ семѣ видѣ, язвы либо въ рака перемѣняющіяся, либо пѣла выйныхъ позвонковъ костеѣдицею испорчены бывающѣ. Смазываніе горшани ртутною растворенною въ жидкомѣ усыпишельномѣ соспавѣ и въ ессенціи смирны иногда и въ семѣ случаѣ мнѣ благоуспѣшно было.

4) Жаба ошѣ испорченнаго глотанія любострастнаго. Распознается по ощущенію препятствія или опухоли внутрь пищепрѣмной трубы, власно какѣ бы неподвижно пребывающихъ, и по преждебывшимъ или еще существующимъ любострастной болѣзни знакамъ.

Врачеваніе требуетъ камединой ртуты. Но тяжелое глотаніе происходящее ошѣ чрезмѣрной чувствительности горшани, и по совершенномѣ исцѣленіи язвѣ продолжающееся, со временемѣ само собою проходишѣ.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е XIII.

О костныхъ любострастныхъ болѣзняхъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О любострастной костной опухоли.

1. Любострастная костная опухоль есть мѣстное кости возвышеніе, ошѣ любострастнаго яда засѣдшаго въ костномѣ существѣ.

2. Костная опухоль твержѣ самой кости бывающая, костнымъ наращеніемъ; а весьма мягкая гуммою любоспρασшною называются.

3. Причина ближайшая сего есмь возвышеніе костныхъ бляшекъ, или надкостной оболочки, ошѣ любоспрасшной клейкой слизи, подѣ оными частями разлившейся.

4. Мѣсто или сѣдалище костныхъ опухолей есть головной черепъ, ключица, грудинная кость, локотная и голенныя кости.

5. Костная опухоль протная познается по опухоли глубокой, неподвижной, плоской, едва мягшей ошѣ самой кости, большею частью округлой, сѣ кожейс одноцѣпной, и по большой части болящей такъ, что боль вѣ самой кости ощущается.

Разогнаніе оной опухоли требуетъ внутренняго камединной рпуши употребленія и отвара сарсапарели купно сѣ корнемъ волчьего перца.

6. Костная опухоль костеѣдная познается по преждебывшему воспаленію и послѣдствующему отдѣленію и уязвленію мягкихъ частей.

Врачеваніе требуетъ обнаженія болящаго мѣста и прикладыванія раствора сулемы купно сѣ ессенціею смирны.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

*О костномъ наростѣ или наращеніи любо-
страстнои.*

1. Костное любоспращное наращеніе есть опухоль на всей конечности длинной кости бывающая, и засѣдшая въ ноздреватомъ костномъ существѣ отъ любоспращнаго яда.

2. Виды онаго суть сіи:

1) Костное наращеніе простое познается по опухоли цѣлой костной конечности. Когда оно еще не давно случилось, и еще не имѣетъ костяной швердости; тогда разгоняешся равно какъ и костная опухоль. Въ противномъ же случаѣ отнюдѣ не разрѣшается.

Внутреннее употребленіе осаженной бѣлой ршуши, ежедневно по одному грану внутрь принимаемой, въ сей болѣзни похваляется.

2) Костное наращеніе костеѣдное. Познается по знакамъ костной опухоли, въ язву открывшейся.

Врачеваніе, кромѣ внутренняго камединной ршуши употребленія, требуетъ еще и глубокаго просверливанія кости гнѣющей, дабы мозговой сокъ могъ вонъ вытекать. Когда костеѣдица уже объемлетъ всю конечность кости; въ такомъ случаѣ нѣтъ другаго средства, кромѣ ошнѣтїя оной.

ГЛАВА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О костеѣдицѣ любострастной.

1. Костеѣдица любострастная есть порча кости на внѣшней ея поверхности, отъ любострастного яда бывающая.

2. Мѣсто, или частѣйшее оной сѣдалище, бываетъ въ носовой впадинѣ, въ головномъ черепѣ, грудинной кости, локтѣ, и голени.

3. Виды оной суть сіи:

1) Костеѣдица мѣстная есть та, которая занимаетъ токмо одно мѣсто на кости. Она большею частью раждается отъ преждебывшаго воспаленія надкостной перепонки, такъ же отъ костной опухоли, или отъ гуммы превращающейся въ возгноеніе; не рѣдко отъ зажной язвы, самую кость разѣдающей случается. Врачеваніе требуетъ внѣшняго прикладыванія ршутнаго бальсamicкаго раствора купно съ розовымъ медомъ; и внутренняго употребленія камединой рштуи купно съ дурнымъ духомъ, взваромъ сарсанарели и волчьего корня.

2) Костеѣдица повсюдная есть гниль костная объемлющая почти всю поверхность одной или многихъ костей. Познается по тому, что на многихъ мѣстахъ мягкія части

спи покрывающія гнѣющую кость, язвами поражающся.

Врачеваніе нужно испытывать то же, что и въ первомъ видѣ; однакожъ оно рѣдко удаётся въ повсюдной костеѣдицѣ; по тому что сія по большой части изсушеніемъ соковъ болящаго убивается.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О любострастной внутрѣкостной гнили.

1. Любострастная внутрѣкостная гниль есть чорча начинающаяся внутри въ самомъ костномъ мозгѣ, и отсюда внѣ кости распространяющаяся.

2. Сія болѣзнь часто случается у дѣтей рожденныхъ отъ любострастныхъ родителей. Гниль внутрѣкостная у взрослыхъ людей случающаяся почти всегда есть любострастная.

3. Она по большой части поражаетъ кости ручныя и ножныя, такъ же и конечности длинныхъ костей.

4. Гниль внутрѣкостная новоначинающаяся познается по боли глубокой въ самой кости ощущаемой, долговременно продолжающейся, на послѣдокъ по краснѣющей и вспухающей внѣшней кожѣ покрывающей кость, костеѣдицею пораженную. 5.

5. Гниль внутрькостная явная или открытая. Пораженная часть на послѣдокъ получаетъ опухоль краснѣющую и ноздревашую, многими дырами зѣяющую и язвами покрывшую.

Врачеваніе состоитъ въ томъ, чтобъ внутренно давать камединную, или мореную ршуть купно съ дурнымъ духомъ и взваромъ лихорадочной корки, волчьяго корня, омега и сарсапарели; а внѣ къ язвамъ прикладываетъ эссенцію мастики купно съ сулемою и розовымъ медомъ, и по томъ еще съ верьху прикрывать опухоль неаполишанскою мазью. Я симъ образомъ уврачевалъ многихъ болящихъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ

О любострастной мягкости костей.

1. Любострастная мягкость костей есть гибкость оныхъ, любострастнымъ ядомъ причиненная.

2. Мягкость костей мѣстная. Иногда наиболѣе смягчается одно мѣсто на кости подобно воску, какъ то въ костныхъ опухоляхъ видѣть можно. Врачеваніе совершается равно какъ и въ костныхъ опухоляхъ.

3. Мягкость костей повсюдная, многія или всѣ мѣста кости заражающая.

4. Знаки повсюдной мягкости суть сїи: ростъ или станъ пѣла послѣ преждебывшей боли въ костяхъ умалается; болящій не можешь стояти на ногахъ; моча бываетъ съ известковою осадкою и мутная; кости накривляются; кости кривыя легко выправлены быти могутъ: однакожь и легко ломаются.

Таковая болѣзнь есть неисцѣлимая. Ни ртутныя мази, ни пропивуцынгошныя соки, ни солодовой взваръ, ниже маріюна не пользовали.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О любострастной ломкости костей.

1. Ломкость любострастная костей есть такое расположеніе оныхъ, когда онѣ отъ самомалѣйшей причины ломаются.

2. Сїя болѣзнь бываетъ мѣстная, или повсюдная и общая.

3. Ломкость отъ мягкости костей познается по тому, когда кость сама собою или легко накривляется. Преломленіе размягченной кости есть неизлѣчимо.

4. Преломленіе или переломъ опѣ любострастной сухопы въ костяхъ. Также преломленіе кости познается по тому, когда опѣ самой маловажной причины, случается хотя гибкость кости при шомѣ не бываетъ. Врачеваніе такового перелома пакъ же естѣ не возможно.

5. Переломъ опѣ любострастной костьеѣдицы; ибо таковая костьеѣдица разѣѣдающая внутреннее существо кости легко можетъ причинить переломъ кости въ шомѣ самомъ мѣстѣ, которое поражено костьеѣдицею.

Таковой переломъ врачеванъ бытъ не можетъ, развѣ прежде мѣсто кости гнѣющей опѣ гнилости блѣшками очистишся.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е XIII.

О любострастныхъ болѣзняхъ членосоединеній.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О опухоляхъ членовныхъ любострастныхъ.

1. Опухоли членовныя любострастныя бываютъ подобны сумочнымъ или пузырчатымъ, въ разныхъ мѣстахъ около членосоединеній, любострастною болѣзнію зараженныхъ, заключающіяся.

2. Опухоли пузырьчатые не любострастные бывающъ хладнаго свойства и ошнюдь не подвергаются воспаленіямъ и нагноеніямъ. Но опухоли пузырьчатые любострастные бывающъ сопряжены со внезапнымъ и скоро преходящимъ жаромъ, краскою и перемежающеюся болью.

Такъ же часто примѣчено и то, что многія таковыя опухоли совокупно являющся.

3. Членовныя опухоли разныя ошъ костной гуммы своею подвижностію; иногда ошъ явной или повсюдной, а иногда ошъ скрытной заразы рождаются равно какъ и ячменецъ на очныхъ вѣкахъ.

4. Врачеваніе требуетъ внутренняго камединной ртуті употребленія, и отвара лѣкарственныхъ деревъ, или сарсапарели съ коркою волчьяго перца, и внѣшняго прикладыванія раствора сулемы и ртутной мази.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О соращеніи членовъ любострастныхъ.

1. Любострастное членовъ соращенье есть недвижимость оныхъ, любострастнымъ ядомъ причиненная.

2. Виды онаго суть слѣдующіе:

1) Соращенье членовъ ошъ костнаго нароста. Познается чрезъ прикосновеніе самой
кост-

костной конечности вспухшей. Зри костное наращеніе.

2) Соращеніе членовъ отъ членовнаго сока стусшившагося. Опухоль членовная бываетъ круглѣе; хошя воспалительная и болящая опухоль въ членосоединеніи не предшествуепѣ.

Врачеваніе требуетъ внутренняго камединой ршущи употребленія и отвара лѣкарственныхъ деревъ или волчьяго корня, такъ же внѣшняго прикладыванія ртутнаго раствора, на подобіе тепловатой примочки, или ртутной мази купно съ аммоніаковою камедью.

3) Соращеніе членовъ отъ воспаленія связокъ. Опухоль при своемъ началѣ бываетъ весьма болящая и ночью нѣсколько краснѣющая или рдѣющая.

Врачеваніе требуетъ въ первомъ воспалительномъ времени камединой ршущи купно съ емульсіею селитреною и проноснымъ, воспаленію сопротивляющимся; и внѣшняго употребленія меда мужескаго корня купно съ неаполишанскою мазью. Иногда и ртутный растворъ внѣ приложенный воспользовалъ.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е XIV.

О любострастныхъ болѣзняхъ женскаго пола, и вопервыхъ о болѣзняхъ дышородныхъ частей женскихъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О бѣлой грыжѣ или теченіи бѣли любострастной.

1. Бѣлая грыжа любострастная есть теченіе гноеватой клейкой слизи изъ рукава машки, причиненное любострастнымъ ядомъ.

2. Бѣлая грыжа у женъ большею частью пріобрѣтается чрезъ плотское совокупленіе съ мужчиною зараженнымъ сею же болѣзнію; не столь часто она случается отъ воздоженія любострастного младенца, или по наслѣдству.

3. Знаки, по коимъ бѣлая грыжа любострастная отъ бѣли простой разнится, суть сіи: 1) Внезапное явленіе оной въ первой или на другой день послѣ нечислаго соитія. Обыкновенная бѣль медлѣнно начинается. 2) Жгучій жаръ въ рукавѣ машки ощущаемый или трудное мочеиспущеніе, часто съ не давнею бѣлою грыжею сопряжены бывають. Бѣль простая бываетъ безъ боли, развѣ будетъ за-
коре-

коренѣлая. 3) Пузырышки или пузырьки зудящіе, или малыя язвы гнойныя на молочницу похожія, въ самомъ рукавѣ машки гнѣздящіися, бывають сопряжены съ бѣлою грыжею любострастною недолго продолжающеюся; ибо язвы гнойныя токмо съ бѣлыю обыкновенною и уже весьма застарѣлою купно случаются. 4) Мокроша гнойная, желто-зеленоватая изъ рукава машки истекающая; которая въ обыкновенной бѣли бываетъ токмо клейкою возгровою, или бѣловою. 5) Зараженіе мущины здороваго бѣлою грыжею любострастною; что есть достовѣрнѣйшимъ знакомъ.

4. Виды различій бѣлой грыжи суть сіи: простая, сложенная и застарѣлая.

1) Бѣлая грыжа простая есть та, которая обрѣшается въ желѣзахъ слизоточащихъ, кои нижнюю окружность рукава машки объемлютъ. Познается по истеченіи гнойной клейкой слизи или рукава машки.

Сей видъ по большой части начинается безъ запора мочи, но съ легкимъ жаромъ и зудомъ въ рукавѣ машки ощущаемыми; долговременно продолжается; на послѣдокъ истекающая влага бываетъ совершенно клей-

кою слизью, и мало помалу, однакожъ нескоро, совсѣмъ перестаетъ.

Бѣлая грыжа у женъ по причинѣ непрерывной влажности рукава матки, труднѣе врачуется и долѣе продолжается, чѣмъ у мужчинъ.

Врачеваніе требуетъ 1) порошка легко слабительнаго, 2) отвара корня лапушника; коимъ въ первыя седмицы внутренно употреблять должно; по томъ 3) тогожъ порошка легкослабительнаго купно съ немногими каплями конайскаго бальсама; и на послѣдокъ 4) вырыскиванья состоящаго изъ ртутнаго раствора, по 4 раза въ сутки повтораемаго.

2) Бѣлая грыжа сложенная есть та, которая съ воспаленіемъ мочеиспускательнаго ствола, или устья онаго, или Санкшоріевой желѣзы сопряжена бываетъ. Познается зрѣніемъ краски въ воспаленномъ мѣстѣ: истеченіемъ гноеватой мокроты изъ устья мочеиспускательнаго ствола; или возвышеннымъ бугоркомъ воспаленнымъ Санкшоріевой желѣзы, по бокамъ мышцы, которая рукавъ матки сжимаетъ, лежащей: и на конецъ труднымъ мочетеченіемъ, во время испусканія мочи и послѣ онаго бывающимъ.

ющимъ. Въ то жѣ самое время и ощущеніе нѣкопорого шѣла, изъ рукава машки низпадающаго, чувствуется.

Врачеваніе съ начала требуется воспаленію сопрягающееся купно со камединною ртутью, равно какъ и во время продолженія бѣлой грыжи воспалительной. По прошествіи же онаго времени должно употребить врачеваніе бѣлой грыжѣ гнойной приличное, и продолжать впрыскиванья ртутныя.

Бѣлая грыжа сопряженная съ малыми язвами, пупырышками зудящими, опухолями задняго прохода, или съ другими болѣзнями, должна быть врачуема такимъ образомъ, какъ оныя болѣзни того особо требуютъ.

3) Бѣлая грыжа застарѣлая или укоренѣлая есть та, которая уже нѣсколько мѣсяцевъ, или больше года продолжается. Причиною оной есть бездѣйственность желѣзокъ, клейкую слизь отдѣляющихъ въ рукавѣ машки, или язва въ самой машкѣ, или въ окружности ея рукава обрѣзающаяся.

Виды оной суть слѣдующіе:

- а) Бѣлая грыжа застарѣлая клейкомокротная. Познается по истеченію клейкой и тонкой слизи негноеватой, и по тому, что бѣль

мѣстная въ матки, или въ ея рукавъ не бываетъ.

Врачеваніе требуетъ внутреннихъ лѣкарствъ крѣпительныхъ, какъ то винограднаго вина крѣпительнаго настояннаго съ ликорадочною и виншеровою коркою, такъ же съ листьями толочники и спалью или желѣзными опилками, а внѣ пользуется впрыскиванье купоросной или холодной воды, и холодная водяная купѣль.

б) Бѣлая грыжа застарѣлая съ язвами сопряженная. Познается по истеченію сукровицы гноеватой, по мѣстной боли, и чрезъ перспное испытаніе. Бѣлая грыжа отъ язвъ матки происходящая, и вяжущими лѣкарствами скорѣ прекращенная, премѣняется въ воздушноводяную болѣзнь.

Врачеваніе бѣлой грыжи, съ язвами сопряженной, требуетъ того, чтобъ исцѣлить язву въ матки или ея рукавъ сокрывающуюся; о чемъ зри язвы матки и ея рукава.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О воспаленіи любострастнаго, дѣтородныхъ женскихъ частей.

г. Воспаленіе любострастное бываетъ въ самомъ устьѣ, или рукавъ матки; и иногда съ бѣлою грыжею, а иногда безъ оной случается.

2. Воспаленіе устья рукава матки есть опухоль глубока дѣшороднаго уда женскаго и устья рукава матки. Оно познается зрѣніемъ, по жару въ дѣшородномъ женскомъ удѣ, и по трудному мочеиспеченію, при испусканіи урины ощущаемыми.

Врачеваніе пребуесть легкихъ проносныхъ, кровоспусканія, если воспаление есть великое, также емульсіи прохладительной купно съ камединою ршущюю; а въ должно употреблять ршущее молоко или водяной растворъ мореной ршули, въ видѣ тепловашой примочки.

Иногда одна, или обѣ губки дѣшороднаго уда женскаго возносяются, и тной опшуда испекаеиъ чрезъ многія отверстія; въ такомъ случаѣ должно въ прикладывать ршущую мазь смѣшенную съ пластыремъ дѣхильнымъ.

3. Воспаленіе Санкторіевой желѣзы познается по бугорку воспалительному, по сторонамъ устья рукава матки обрѣтающемуся, по сильному зуду и жару, въ рукавѣ матки ощущаемыми.

Врачеваніе есть то жѣ самое, что и въ первомъ видѣ.

4. Воспаленіе рукава матки есть жигучій

108 затвердѣлость дѣш. ж. частей.

чій жаръ въ самомъ рукавѣ матки ощущаемый, иногда чрезъ многіе мѣсяцы сряду продолжающійся, рѣдко безъ язвы, часто и безъ бѣлой грыжи случающійся.

Врачеваніе есть то же самое, что и въ самой язвѣ рукава матки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О затвердѣлости любострастной женскихъ дѣтородныхъ частей.

1. Затвердѣлость любострастная дѣтороднаго женскаго уда по большей части раждается отъ прежде бывшаго воспаленія, и отъ сильныхъ вяжущихъ лѣкарствъ, въ рукавѣ матки насосцомъ впрыскиваемыхъ.

2. Затвердѣлость устья рукава матки, есть окрѣпость дѣтородныхъ женскихъ губокъ; иногда и самое устье рукава матки, отъ таковой окрѣпости весьма сожатое обрѣшается.

3. Затвердѣлость бугроватая. Бугорокъ одинъ или многія въ самомъ устьѣ рукава матки, или въ губкахъ дѣтородныхъ женскихъ перстами ощупываются. Иногда и весь рукавъ матки таковыми жъ но меньшими бугорками наполняется.

Та-

Таковыя бугорки застарѣвши, иногда превращаются въ весьма худыя язвы рака.

4. Врачеваніе требуетъ внутренняго камединной ртуті употребленія купно съ соннымъ зельемъ. А внѣ должно прикладывать тепловатую примочку состоящую изъ взвары листовъ омега и изъ ртуті съ соннымъ зельемъ смѣшенной, а къ ночи ртутной мази.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О любострастныхъ язвахъ дѣшпороднаго женскаго уда.

1. Любострастныя язвы, въ дѣшпородномъ женскомъ удѣ случающіяся, отъ Французовъ шанкромъ называются.

2. Виды оныхъ суть сіи:

1) Язвы на молочницу схожія начинаются отъ пупырышковъ зудящихъ, или отъ кристаловидныхъ пузырьковъ, кои на послѣдокъ превѣняются въ малыя язвы, на поверхности разсѣянныя, цвѣтомъ пѣсочныя или бѣловатыя.

Онѣ легко врачуются чрезъ частое мытье дѣшпороднаго уда женскаго, посредствомъ ртутнаго бальсамическаго раствора.

2) Язвы распространяющіяся. Начинаются отъ пашна широкаго краснаго или отъ
бу-

бугорка воспалительнаго, въ малыхъ дѣтородныхъ губкахъ, или въ Санкторіевой желѣзѣ случающагося: весьма болящъ: и безпрерывно кругомъ распространяющагося шакъ, что мало помалу разбѣдающъ и меньшія губки, и пошочку, и все усъе рукава машинки, а особливо если въ скоромъ времени порядочное врачеваніе употреблено не будетъ.

Врачеваніе шребуешъ внутренняго ртутни употребленія и внѣшняго прикладыванія ртутнаго раствора, купна съ соннымъ зельемъ и розовымъ медомъ или съ эссенціею мастики смѣшеннымъ.

3) Язвы въ рака претворяющіяся; раждаются отъ окръпныхъ и затвердѣлыхъ бугорковъ, въ дѣшородномъ женскомъ удѣ случающихся, весьма болящъ, вскорѣ въ окружности распространяющагося. и трудно врачующагося, а иногда премѣняющагося въ настоящаго любострастнаго рака.

Врачеваніе шребуешъ того, чтобъ внутренно давати камединную ртуть и сонное зелье; а внѣ прикладывати насыщенной растворъ ртутной бальсамической.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О любострастныхъ язвахъ рукава матки.

1. Любострастные язвы случаются въ самомъ рукавѣ матки, и бывають различнаго свойства.

2. Язвы простыя, суть малыя, на внутренней поверхности рукава матки нѣсколько распространяющіяся, и не много болящія; а познаются по иссеченію гноя, и по мѣстной боли ощущаемой во время перстнаго испытанія.

Врачеваніе совершается посредствомъ внутренняго камединной ртуті употребленія, и впрыскиванья бальсамической ртуті.

3. Язвы далеко распространяющіяся. Онѣ бывають весьма болящія; по этому, что въ то жѣ время и воспаленіе объемлетъ всю окружность язвы, и поверхность рукава матки въ разныхъ мѣстахъ покрывается шрѣщинами, изъ коихъ преострая гнойная сукровица беспрестанно истекаетъ.

Врачеваніе требуетъ внутренняго ртуті употребленія купно съ соннымъ зельемъ; и внѣшняго впрыскиванья выше сего объявленнаго.

4. Язвы сокрытыя. Иногда язвы въ верхней части рукава матки гнѣздяшся, весьма мало боляшъ, и не много сукровицы изъ себя испочаюшъ. Таковыя язвы не причиняюшъ ни какого примѣшнаго припадка, которымъ бы бышѣ оныхъ означалось; либо ни боль, ни трудность при испусканіи мочи не примѣчаюшся; а легкая боль рукава матки, во время плотскаго совокупленія, или при перспномъ испытаніи ощущаемая въ самомъ уязвленномъ мѣстѣ, приписывается совсѣмъ другимъ и самымъ безвиннымъ причинамъ.

И по тому таковая женщина можетъ бытъ зараженною, которая по прилѣжномъ испытаніи и осмопрѣнтіи казалась бытъ здоровою, и которая даже и сама о себѣ не знала того, что она естъ заражена; по тому то иногда самыя мушны заракаются бѣлою грыжею или язвою, на плѣшкѣ дѣшороднаго уда оказывающеюся, отъ таковой женщины, которая совершенно здоровою бытъ являлась.

Врачеваніе должно бытъ прилагаемо то жъ самое, что и въ первомъ видѣ.

4. Язвы мочеваго пузыря, изъ рукава матки въ мочеиспускательной стволѣ, или въ мочевоу пузырѣ проникающія. Когда онѣ токмо проникаюшъ въ мочеиспускательной стволѣ,
въ

въ такомъ случаѣ моча, токмо при испусканіи оной, вытекаетъ въ рукавъ матки; когда жъ язва разбѣдаетъ и самую шейку или внутренность мочевого пузыря, въ такомъ случаѣ моча непрестанно каплями истекаетъ въ рукавъ матки.

Врачеваніе при первомъ случаѣ бываетъ легчѣ, а во второмъ многотрудно. Свѣчу маленькую внуши пусшую, ртутною мазью смазанную, должно впускать въ мочеиспускательной своль, или въ самую впадину мочевого пузыря; а въ рукавъ матки насосомъ впрыскивать ртутной составъ.

5. Язвы заднепроходныя суть тѣ, кои изъ рукава матки проникаютъ въ заднюю кишку, такъ, что нечистота низомъ испражняемая, хотя въ прочемъ и жидкая, чрезъ рукавъ матки вонъ испражняется.

Врачеваніе оныхъ есть многотрудное; однакожъ можно впрыскивать ртутной составъ въ рукавъ матки, и запускать туда жъ широковатую трубочку изъ маленькой свѣчи соспавленной, дабы нечистота низомъ испражняемая отъ задней кишки отводима была. Симъ образомъ исцѣленіе язвы скорѣе произшествуется.

114 прекращеніе кровотеченія.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е XVI.

О любострастныхъ болѣзняхъ матки.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О прекращеніи кровотеченія любострастнои.

1. Прекращеніе обыкновеннаго мѣсячнаго кровотеченія отъ любострастнаго яда приключается.

2. Прекращеніе мѣсячнаго кровотеченія отъ бѣли происходящее. Я видѣлъ премногихъ женъ, бѣльюю любострастною сираждушихъ, кои уже больше года отнюдъ не имѣли мѣсячнаго кровотеченія. Всѣмъ таковымъ камединовая ртуть, чрезъ нѣсколько мѣсяцовъ сряду данная, легко и въ скоромъ времени произвела обыкновенное кровоочищеніе.

3. Прекращеніе мѣсячнаго кровотеченія отъ повсюдной любострастной болѣзни. Иногда и безъ бѣли мѣсячное кровотеченіе останавливается отъ того, когда любострастный ядъ заражаетъ всю кровь, или причиняетъ захряслость въ маткѣ.

Врачеваніе требуетъ камединовой ртути употребленія.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О любострастноиъ уязвленіи матки.

1. Любострастное уязвленіе матки есть язвы случающіяся на внутренней ея поверхности, или на ея рыльцѣ, по большей части послѣ бѣлой грыжи заспарѣлой.

2. Язвы на всей внутренней поверхности матки, любострастнымъ ядомъ причиненныя суть сіи: жаръ въ самой маткѣ и около ея ощущаемый, бѣль гноеватая, трудное мочеиспечение, непрерывный позывъ къ испусканію мочи, изсушение всего тѣла, и медлѣнная лихорадка.

Врачеваніе по большей части бываетъ щещное, или многотрудное; однакожъ оно требуетъ внутренняго камединой ртутіи употребленія, купно съ соннымъ зельемъ и взваромъ насыщеннымъ сарсапарели и съ молокомъ; а внѣшняго впрыскиванья состоящаго изъ ртутіи и соннаго зелья, не токмо въ рукавъ матки, но и въ самую впадину матки, посредствомъ способнаго орудія.

3. Язвы устья или рыльца матки. Болѣзненные припадки бывающъ тѣ жъ самые, но легчѣ. Перстомъ можно ощупывать устье

или рыльце матки разорванное, или раздранное и язвами покрытое.

Врачеваніе оныхъ по жѣ самое испытывашь должно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О воздушно-водяной любострастной болѣзни матки.

1. Воздушно-водяная болѣзнь есть опухоль матки, происходящая отъ воздуха и гноеватыхъ мокрошъ, внутреннюю впадину матки разширяющихъ. Она по большей части приключается послѣ долговременныхъ язвъ бывшихъ въ маткѣ.

2. Воздушно-водяная болѣзнь матки отъ сросшагося рыльца матки. По предшествіи знаковъ бывающихъ при уязвленіи матки, рождается въ самой маткѣ и около ея опухоль въ подчеревной части, постоянная, круглая, упругая и равная: а при томъ никакой трескъ, или внезапное гноеватой влаги исшеченіе не примѣчаются.

Врачеваніа совершеннаго, по причинѣ рыльца матки сросшагося, ожидать не должно.

3. Воздушно-водяная болѣзнь отъ рыльца матки заваденнаго. По предшествіи знаковъ изъявляющихъ матку уязвленную,
матка

машка внезапно пухаетъ, какъ и въ первомъ видѣ; но иногда въ шожъ время внезапно истекаетъ гноеватая и острая влага купно съ шрескомъ рукава машини, или со смердящимъ воздухомъ, изъ онаго рукава съ великою силою вонъ исходящимъ, послѣ чего опухоль машини преждебывшая нѣсколько уменьшается.

Врачеваніе есть многотрудно и недосто-
вѣрно. Въ прочемъ однакожъ должно давать
внутренно камединную ршущь, купно съ на-
сыщеннымъ взваромъ сарсапарели; а внѣ спа-
раться о томъ, дабы рыльце машини всегда
было отверсто, чтобъ острая мокрота изъ
впадины машини свободно вонъ истекала, и
впрыскиванья ршущьныя внутрь оной вли-
ваемы бышь могли.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е XVII.

О любострастныхъ болѣзняхъ сосцовъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О любострастномъ воспаленіи сосцовъ

1. Любострастное воспаленіе сосцовъ
есть воспалительная опухоль оныхъ, любос-
страстнымъ ядомъ причиненная.

2. Воспаленіе сосочка. Оно раждается большею частью отъ воздоснїя младенца любострастнымъ ядомъ зараженного. Кожа около сосочка вспухающая, совершенно его закрываетъ.

3. Воспаленіе желѣзокъ. Сперва раждается бугорокъ глубоко простирающійся, жигучій, твердый, паховику паховому подобный. Трудно разбивается, и трудно въ возгноеніе приводится. Иногда при томъ и подкрылошная желѣза вмѣстѣ зашвердѣлою дѣлается.

Врачеваніе требуетъ внутренняго ршущи употребленія; а внѣ должно прикладывасть тепловашую примочку состоящую изъ раствора ршущаго и изъ смягчительныхъ порошковъ, или припарку разбивающую, съ прибавкою къ ней бѣлаго пшеничнаго хлѣба.

Если разогнаніе будетъ неудачно, въ такомъ случаѣ должно спараться произвести гозгноеніе, и поступать такимъ образомъ, какъ и при врачеваніи обыкновеннаго паховика.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О любострастныхъ язвахъ сосцовъ.

1. Любострастная язва въ сосцахъ раждается отъ любострастнаго яда.

2. Язва сосочка, шанкромъ именуемая. Большею частью приключается отъ сосанія младенца любострастного, или отъ высасыванія млека женщиною любострастною. Она объемлетъ только сосочекъ, или вмѣстѣ и весь онаго кружечекъ.

3. Язва закожная. Она разбѣдаетъ и кожу, и подъ оною обрѣтающійся жиръ, и далече въ окружности распространяется; а раждается сперва отъ широкаго пятна любострастного, повсюдною, или сокрытою разою причиненнаго.

Врачеваніе требуетъ кромѣ внутренняго камединной ршуты употребленія, еще и внѣшняго прикладыванія ршутнаго бальсама, или ршутнаго бальсамическаго раствора.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О любострастномъ ракъ сосцовъ.

1. Любострастный ракъ сосцовъ есть б-пухоль твердая, жестоко болящая, и безцвѣтная, въ одномъ или въ обѣихъ сосцахъ, любострастнымъ ядомъ причиненная.

2. Ракъ любострастный различится отъ настоящаго рака слѣдующими знаками: 1) настоящий ракъ большею частью медлѣнно, а любострастный скоро нарастаетъ. 2) Твер-

настоящемъ ракъ бываетъ почти обимевидная, а въ любострастномъ упругая, равно какъ и въ воспалительной опухоли, и не глубока. 3) Гной въ любострастномъ ракѣ бываетъ желтозеленоватый; а въ настоящемъ на сукровицу похожій, красноватый. 4) Ракъ настоящий отъ ршущи ожесточается, а любострастный оною исцѣляется.

3. Ракъ сосцовъ затвердѣлый и окрѣп-
 лый есть опухоль твердоватая, жестоко
 болящая, безцвѣтная, закрытая, или въ яз-
 ву превѣнившаяся.

Врачеваніе требуетъ внутренняго каме-
 динной ршущи употребленія купно съ сон-
 нымъ зельемъ и взваромъ сарсапарели; и внѣ-
 шняго прикладыванія ршущаго пластыря
 и раствора. Если врачеваніе будетъ неуда-
 чно: въ такомъ случаѣ ракомъ пораженный
 сосецъ совсѣмъ опиятъ должно.

4. Ракъ грибоватый или ноздреватый,
 есть опухоль ноздреватая, на грибъ похо-
 жая, жестоко болящая, любострастнымъ я-
 домъ причиненная.

Врачеваніе требуетъ камединной ршущи
 употребленія, купно со взваромъ сарсапаре-
 ли; или когда все вышепоказанное есть безу-
 спѣшно: въ такомъ случаѣ оную опухоль
 искусствомъ опиятъ должно.

5. Ракъ съ антоновымъ огнемъ сопряженный, или любострастная нома, есть язва любострастнымъ болѣзнямъ и антоновому огню свойственная. Она познается по красножелтоватому бугорку, который въ скоромъ времени превращается въ язву весьма глубокую, антоновымъ огнемъ пораженную, по краямъ красножелтоватую, весьма смердящую и болящую.

Врачеваніе требуетъ, чтобъ внутренно употреблять камединную ртуть, купно съ коркою лихорадочною; а внѣ растворъ сулемы водочный, или мореная ртуть, посредствомъ нащипанной пряжи прикладываемая, приносятъ пользу.

Конецъ первой части.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

О внутренних любострастныхъ бо-
лѣзняхъ.

ОТДѢЛЕНІЕ I.

О любострастныхъ лихорадкахъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О любострастной простой лихорадкѣ.

1. Любострастная простая лихорадка есть повседневная трясучка, или жестокая горячка, любострастнымъ ядомъ причиненная.

2. Она иногда вскорѣ послѣ нечистаго совокупленія, безъ всякой заразы дѣтородныхъ часшей; иногда послѣ исчезнувшихъ паховиковъ, или по прекращеніи бѣлой грыжи начинается. Иногда чрезъ 20, 30, или и больше, сутокъ продолжается; а иногда по прошествіи не многихъ дней снова прекращается.

3. Сія лихорадка означается чепверакимъ образомъ: 1) потомъ изобильнымъ и смердящимъ. 2) Мочею мутною и изобильною вонючею и жигучею. 3) Бѣлою грыжею, или печеніемъ бѣли снова возвращающимся.

4)

4) Низложеніемъ любострастнаго вещества во перьвыхъ по самой кожи: отъ чего пупырышки бѣлые, пшенному сѣмени подобные, пашна желтые, и прочія закожныя болѣзни; а во вторыхъ ко внутренностямъ: отъ чего боль жигучая, долговременная въ разныхъ внутренностяхъ; а въ третьихъ къ частямъ мышечнымъ: отъ чего ломота, ломъ въ суставахъ и боль въ головѣ, послѣ любострастной лихорадки приключаются.

4. Врачеваніе сея лихорадки требуетъ: 1) кровопусканія, если жестокая лихорадка или многокровіе примѣчается; 2) проносного лѣкарства воспаленію сопротивляющагося; 3) эмульсіи или оршада прохладительнаго; 4) отвара насыщеннаго сарсапарели и паслѣона; и 5) пилюль составленныхъ изъ камединой ршупи.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О воспалительной любострастной лихорадкѣ.

1. Воспалительная любострастная лихорадка есть жестокая горячка, съ любострастными воспаленіями сопряженная.

2. Она примѣчается во время воспалительной бѣлой грыжи, при вожженіи яичекъ, крайней

крайней плоти, предшательной желѣзы, и паховыхъ желѣзъ; также въ случаѣ окоболѣнія, бѣлою грыжею причиненнаго, и воспаленія горшани.

3. Она начинается съ воспаленіемъ, а по окончаніи онаго оканчивается; и всегда ночью примѣчается сильнѣе.

4. Врачеваніе требуетъ кровопусканія, отвара сарсапарели купно съ селиетрою и каиединою ртутью.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О любострастной медлѣнной лихорадкѣ.

1. Любострастная медлѣнная лихорадка бываетъ малая но долговременная, съ любострастнымъ изсушеніемъ шѣла сопряженная.

2. Она рождается отъ язвы скрытной или явной, коея гной всасывается кровеносными сосудами.

3. Врачеваніе требуетъ исцѣленія язвы. Зри чахотка любострастная.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О любострастной желчной лихорадкѣ.

1. Любострастная желчная лихорадка есть трясушка, имѣющая свое начало отъ желчныхъ нечистотъ обременяющихъ чревные
ныя

ныя внутренности, любострастнымъ людямъ часто приключаящаяся.

2. Желчная лихорадка есть не собственная, но припадочная любострастной болѣзни.

3. Она познается по нечислотѣ языка, по отвращенію отъ пищи, и по желчному расположенію.

4. Врачеваніе требуетъ сперва рвотныхъ и слабительныхъ лѣкарствъ, а потомъ истребляющихъ желчныя мокроты, какъ то шамариндоваго сока, купно съ перечищеннымъ виннымъ камнемъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О любострастной перемѣжающей лихорадкѣ.

1. Любострастная перемѣжающая лихорадка бываетъ повседневная, придневная, или чешверодневная, отъ любострастного яда происходящая.

2. Перемѣжающая лихорадка самородная есть та, которая рождается отъ самаго любострастного яда. Она отнюдь не прогоняется лихорадочною коркою, но шокмо одной ртуши мѣсто уступаетъ.

3. Перемѣжающая лихорадка припадочная есть та, которая имѣя свое начало отъ собственной своей причины, приключается любострастнымъ людямъ.

4. Она врачуетъ лихорадочную коркою
внутренно употребляемую купно со ршущью.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е II.

О любострастныхъ судоргахъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О Любострастной повсюдной судоргѣ.

1. Любострастная повсюдная судорга
есть судорожное сокращеніе всѣхъ мышцъ
хребетныхъ, челюстныхъ и членовныхъ.

2. Судорга повсюдная, отъ любостраст-
ной повсюдной заразы происходящая, поз-
нается по настоящимъ знакамъ, любостраст-
ной болѣзни свойственнымъ.

Врачеваніе требуетъ камединой ршущи
купно съ соннымъ зельемъ; или если не лзя
глошать ршущи, по причинѣ челюстей крѣ-
пко сожатыхъ или сведенныхъ; въ такомъ
случаѣ должно внѣ употреблять промыва-
тельные состоящія изъ камединой ршущи и
соннаго зелья: а при томъ внѣ тереть составы
ршущью, даже до произведенія слинотеченія.

3. Судорга, отъ скрытной любостраст-
ной заразы происходящая, можетъ распозна-
ваться по давнимъ и прежде бывшимъ любо-
страстнымъ болѣзнямъ. Вра-

Врачеваніе есть пожѣ самое, что и въ первомъ видѣ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О Любострастной падучей болѣзни.

1. Любострастная падучая болѣзнь есть временная цѣлаго тѣла судорга, съ совершеннымъ потерянiемъ чувствъ.

2. Падучая болѣзнь отъ внутренняго костнаго наращенія головного черепа. Оную распознавать можно по постоянной боли, подъ самымъ головнымъ черепомъ, въ какомъ нѣсть мѣстѣ ощущаемой.

Въ сей болѣзни можно внутренно давать камединную ршуть и взваръ волчьяго корня. Такъ же можно на болящемъ мѣстѣ учинить просверливаніе, яко послѣднее средство.

3. Падучая болѣзнь отъ скрышной любострастной заразы, есть немочь младолѣтнихъ дѣтей рожденныхъ отъ таковыхъ родителей, кои прежде сами страдали любострастною заразою.

Въ семъ случаѣ можно таковымъ младенцамъ давать сиропъ съ камединною ршутью.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е III.

О любострастномъ безсиліи или разслабленіи тѣла.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О Любострастной слабости.

1. Любострастная слабость тѣла есть крайнее безсиліе всѣхъ тѣлесныхъ частей, отъ любострастной заразы происходящее.

2. Слабость тѣла отъ скрытной любострастной болѣзни. Таковая немочь чрезъ шесть лѣтъ, продолжаемою млечною діею и упошребляемыми ршущными лекарствами уврачевана была.

3. Слабость тѣла отъ любострастной лихорадки. Зри лихорадка любострастная.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О любострастномъ параличѣ нижнихъ чюдоев.

1. Любострастный параличъ нижнихъ чюдоевъ есть разслабленіе ногъ и лядвй, отъ любострастной болѣзни происходящее.

2. Параличъ нижнихъ частей отъ прекращенія бѣлой грыжи. Врачеваніе требуетъ, кромѣ внутренняго камедниной ршущи упошребленія, еще и того, чтобы прививаніемъ произвесши бѣлую грыжу.

3. Параличъ нижнихъ частей отъ нароста или другаго порока приключившагося около хребетной спановой жилы; какъ то случается, когда любострасшной заразы мокроты засядутъ въ самомъ каналѣ позвоночномъ, или въ хребетной коспи.

Врачеваніе испытывать можно то жъ самое, что и въ случаѣ любострасшныхъ наростовъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О параличѣ любострасстноиъ половины тѣла.

1. Параличъ любострасстный половины тѣла есть разслабленіе правой или лѣвой стороны, начиная отъ самой головной макушки даже до самой подошвы ноги, любострасстнымъ ядомъ причиненное.

2. Параличъ половины тѣла отъ прекращенія бѣлой грыжи. Требуемъ того жъ врачеванія, что и выше сего описанный параличъ нижнихъ частей, отъ прекращенія бѣлой грыжи случающійся.

3. Параличъ половины тѣла, отъ какого нѣсть порока или порчи въ головномъ черепѣ или мозгѣ производящій. Такимъ то образомъ сея болѣзни причиною были наростъ внутренней бляшки головного черепа, или

часная мозга затвердѣлость, возгноеніе или другій какій нѣсть порокъ.

Врачеваніе такового паралича есть много-трудно, и рѣдко бываетъ удачно; однакожъ можно оное предпринимать посредствомъ ршущи и взвара волчьяго корня и наслѣдна.

ОТДѢЛЕНІЕ IV.

О Любострастной боли.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О любострастномъ Главоболѣніи.

1. Любострастное главоболѣніе есть боль въ головѣ, любострастнымъ ядомъ причиненное.

2. Оно по большей части въ вечернее время усиливается, ночью бываетъ прѣжестокое, такъ какъ будто бы кости головного черепа одни отъ другихъ развалились или опдѣлились хотѣли; а около утра снова умягчается или послабляется.

3. Главоболѣніе отъ повсюдной, или явственной любострастной болѣзни. Въ семъ видѣ ломъ въ соснавахъ, ломота и боль въ костьяхъ и во всемъ тѣлѣ совокупно случаются. Таковая головная боль наймаче лобъ, или чело и зашлокъ объемлетъ.

Враче-

Врачеваніе требуетъ камединой ртуті употребленія и взваровъ, любострастной болѣзни сопротивляющихся.

4. Главоболѣніе отъ нароста головного черепа, познается по онухоліи и боли мѣстной или постоянной.

Врачеваніе есть то жъ самое, что и въ случаѣ нароста.

5. Главоболѣніе отъ пошанной заразы. Въ семъ видѣ прочіе припадки любострастные не оказываются; однакожъ боль, ночью ожесточающаяся, наводитъ нѣкоторое о сей болѣзни сомнѣніе; и для того врачеваніе требуетъ употребленія ртуті.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О Любострастной бессонницѣ.

1. Любострастная бессонница есть то, когда сна отнюдѣ нѣтъ, по причинѣ яда или боли, отъ любострастной болѣзни происходящихъ.

2. Бессонница отъ боли. Всякой любострастной боли есть такое свойство, что она ночью, и отъ постельной теплоты, умножается. Таковая боль въ вечеру наступаетъ, о полуночи бываетъ неспосною, а около утра послабляетъ и умалывается.

И потому то любострастною болѣзнію зараженные, по причинѣ прежестокой боли часпо встають съ постели, ложась на холодномъ полу въ своей спальнѣ, и только начинаютъ засыпать при восхожденіи утренняя денницы.

3. Безссоница безъ боли. Любострастной болѣзни подверженные, иногда безъ всякой, или по крайней мѣрѣ безъ великой боли отнюдѣ спать не могутъ. Я видѣлъ, что младенцы спорадающіе шокмо одними любострастными пиянами, можетъ быть по причинѣ любострастного зуда, въ самую полночь, чрезъ многія седмицы сряду кричали и не спали.

Врачеваніе требуетъ употребленія ртутти.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О Любострастномъ Грудномъ колошѣ.

1. Любострастное грудное колошье есть боль, любострастнымъ ядомъ причиненная.

2. Грудное колошье отъ нароста на ребрѣ, или грудинной кости, познается по мѣстной опухоли и посюоянной боли на оныхъ костяхъ.

Врачеваніе совершается такимъ же образомъ, какъ и нароста.

3. Грудное колошье отъ потаенной заразы. Объ ономъ подозрѣвать можно по ожесточенію боли бывающей ночью, и по тому, что оно уступаетъ мѣсто ршущи.

4. Грудное колошье отъ окрѣплой затвердѣлости железы зобной грудной происходящее. Познается по тупой и постоянной боли, подъ грудинною костью ощущаемой. Зри тяжелая одышка.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О любострастномъ колошѣ въ кишкахъ.

1. Любострастное колошье въ кишкахъ есть боль въ чревныхъ внутренностяхъ ощущаемая, отъ любострастной заразы происходящая.

2. Сія боль иногда повсюду въ чревѣ распространяющуся, а по большей части постоянной и долговременною въ одномъ мѣстѣ бываетъ.

3. Колошье чревное, или въ кишкахъ, отъ прекращенія бѣли, или отъ паховика разогнаннаго происходящее. Сія боль по большей части бываетъ воспалительнаго свойства; и для того врачеваніе требуетъ кровопусканія, лѣкарствъ воспаленію сопротивляющихся, отвара сарсапарели и камединой ршущи.

4. Колошье въ кишкахъ отъ скрышной заразы. Когда послѣ нечистаго соитія, безъ поврежденія или заразы дѣшородныхъ часшей, колошье въ кишкахъ долговременное, ночью ожесточающееся случится; тогда можно подозрѣвать сей видъ колошья.

Врачеваніе пребуешъ камединной ршущи купно съ сышнымъ взваромъ сарсапарели.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О любострастной ломотѣ.

1. Любострастная ломота есть жестокая боль въ составахъ, ночью найпаче беспокоивающая и усиливающаяся, отъ любострастнаго яда происходящая.

2. Ломота любострастная по большей части поражаетъ средину членовъ, и не столь часто, какъ прочіе виды ломоты, мучитъ самые члены.

3. Ломота отъ повсюдной или явственной заразы. Она наступаетъ вмѣстѣ со прочими любострастными припадками: легко распознается: и, если не есть еще закоренѣлою; то легко врачуется камединною ршущю.

4. Ломота отъ скрышной заразы. Она обыкновенно приключается послѣ того, когда любострастные паховики чрезъ долгое время

время разбиваемы, и малыя язвы бывшія на самой плѣшкѣ, высушены были.

Врачеваніе есть то жѣ самое что и въ первомъ видѣ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О любострастной простудѣ.

1. Любострастная простуда есть боль въ одной или многихъ мышцахъ ощущаемая, любострастнымъ ядомъ причиненная.

2. Она по большей части бываетъ мѣстною, и ночью ожесточается и усиливается.

3. Врачеваніе шребуетъ камединой ртужи купно со взваромъ изъ лѣкарственныхъ деревъ и сарсапарели составленнымъ, а при томъ еще и тепловатой купѣли.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О любострастной шіагрѣ.

1. Любострастная шіагра есть боль въ сѣдалныхъ костяхъ, отъ любострастной заразы раждающаяся.

2. Шіагра отъ паховика разогнаннаго. Я дважды видѣлъ, что отъ паховика исчезнувшего боль около членосоединенія бедровой кости съ неименованною, воспослѣдовала, и больные отъ того хромыми содѣлались.

Врачеваніе требуетъ камединой рштути, сурмы и сарсапарели.

3. Шіагра отъ скрытной заразы. Сей видъ болѣзни распознается отъ прочихъ ея видовъ чрезъ преждебывшія примѣты и ожесточеніе ночью.

Врачеваніе производить должно тѣмъ же образомъ, какъ и въ первомъ видѣ.

ГЛАВА ОСМАЯ.

О любострастной костной боли.

1. Любострастная костная боль въ самихъ костяхъ причиняется любострастнымъ ядомъ.

2. Боль костная отъ явной или повсюдной заразы. Она бываетъ прѣжестокая, власно, какъ костную связь раздробляющая, такъ что кажется, будто бы кости одна отъ другой разваливаются; большею частью объемлетъ лобъ, затылокъ, лопатки, плечи, лядвія и бедра а найпаче голени, такъ что бѣдствующимъ болящимъ, опочивающимъ на самой мягкой постелѣ, и покрытымъ легчайшими покрывами, кажется будтобы они лежатъ въ печѣ жарко истопленной, и какъ огнемъ жегомы бываютъ. Ночь и постельная теплота усугубляетъ оную боль, а около утренняя времени она послабляетъ и умалается.

Вра-

Врачеваніе требуетъ камединой ртуті купно съ соннымъ зельемъ и взваромъ, любострастной болѣзни сопротивляющимся.

3. Боль костная посшоянная. Она имѣетъ свое начало или отъ нароста, или отъ размягченія самой кости. Она распознается по существованію сихъ болѣзней; а врачуетъ чрезъ отдаленіе оныхъ. Зри наростъ костный и костьѣдица.

ОТДѢЛЕНІЕ V.

О тяжеломъ дыханіи.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О любострастныхъ тяжелыхъ одышкахъ.

1. Любострастная тяжелая одышка есть долгое трудное дыханіе, любострастнымъ ядомъ причиненное.

2. Тяжелое дыханіе отъ скрытной заразы. Весьма рѣдко тяжелое дыханіе бываетъ припадкомъ повсюдной или явственной заразы; а чаще любострастная болѣзнь есть скрытная, или пошаянная. Иногда она производитъ наросты на ребрахъ, или сгущая сукровицу въ легкомъ, причиняетъ зашвердѣлости и нарывы въ ономъ.

Врачеваніе требуетъ камединной рпути употребленія, купно со отварами разводящими, любострастной болѣзни сопротивляющимися.

3. Тяжелое дыханіе отъ какого нѣсть порока въ дыхалѣ. Сію болѣзнь видали врачи произшедшую отъ того, что дыхало любострастнымъ ядомъ разѣдено было, а уврачевали оную опиятіемъ хрящеваго кольца.

4. Тяжелое дыханіе отъ зобной железы вспухшей. Во многихъ трупахъ людей зараженныхъ любострастною болѣзнію, кои во время своей жизни спрадали тяжелымъ дыханіемъ, по смерти ихъ найдена зобная железа заваленная, вспухлая и гнилью пораженная.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О любострастномъ кашлѣ.

1. Любострастный кашель есть отдыханіе звонкое и судорожное, любострастнымъ ядомъ причиненное.

2. Кашель отъ прекращенія бѣлой грыжи. Вещество бѣлой грыжи около воздушной трубы, или дыхла засѣдшее, причиняетъ сей кашель.

Врачеваніе требуетъ камединной рпути и произведенія вновь бѣлой грыжи.

3. Кашель отъ явспивенной или повсюдной бѣлой грыжи. Разпознается по тому, когда

когда любострастной болѣзни припадки сущесwуюшѣ. Врачеваніе пребуешѣ камединной ршущи купно со взваромѣ сарсапарели. Разшворѣ водочный сулемы вѣ любострастныхъ болѣзняхъ; грудь заражающихъ, ешѣ весьма вреденѣ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О Любострастной хрипотѣ.

1. Хрипоша любострастная есть произношеніе гласа неравное, трудное и неявственное, любострастнымъ ядомъ заражающимъ дыхало причиняемая.

2. Хрипоша отѣ язвѣ гѣ дыхалѣ находящихся: какѣ шо вѣ мершвыхъ шѣлахъ иногда оныя найдены. Врачеваніе пребуешѣ камединной ршущи употребленія купно со взваромѣ сарсапарели.

3. Хрипоша отѣ скрытной заразы. Я видѣлѣ человека чрезѣ долгое время страдавшего любострастною чесоткою, хрипотою, и кашлемѣ, и выпользовавшагося чрезѣ внутреннее употребленіе камединной ршущи и засшуженныхъ похлебокѣ.

140 слиношеченіе. позывъ на низъ.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е VI.

О любострастныхъ испеченіяхъ мокроть.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О любострастномъ слиношеченіи.

1. Любострастное слиношеченіе называется то, когда слина или слизъ часто изорта вонъ ишекають и выплевывающа.

2. Слиношеченіе отъ язвъ горшани. Таковыя язвы, раздражая чувствєнныя жилы железъ, слизъ, възри и слину отдѣляющихъ, и безъ употребленія ршущи причиняють слиношеченіе. Врачеваніе пребуеть того, чтобъ оныя язвы уврачеваны были. Зри жабу съ язвами сопряженную.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О любострастномъ лозывѣ къ изпражненію низомъ.

1. Любострастный позывъ къ испражненію на низъ есть непрерывное къ тому побужденіе, но токмо съ весьма малымъ изверженіемъ клейкой слизи.

2. Непрерывный позывъ къ испражненію, отъ бѣлой грыжи происходящій. Онъ
раж-

раждается отъ воспаленія предстательной железы. О врачеваніи зри воспаленіе оной железы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О любострастнои гноетеченіи.

1. Любострастное гноетеченіе есть испражнение гноеватои слизи или настоящаго гноя изъ задняго прохода.

2. Гноетеченіе отъ язвы задней кишки происходящее. Оно часто приключается послѣ возгноенія предстательной железы. Врачеваніе требуетъ впрыскиванья бальсамическаго ршутнаго раствора.

3. Гноетеченіе безъ всякихъ язвъ. Я видѣлъ юношу страдавшаго опухольми, задній проходъ объемлющими, у коего въ то жъ самое время и гноеватая слизь истекала изъ онаго прохода.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О любострастнои гнойнои мочетеченіи.

1. Любострастное гнойное мочетеченіе есть испусканіе урины гноеватои, любострастнымъ ядомъ причиненное.

2. Гнойное мочетеченіе отъ язвы мочевого пузыря. Когда любострастная язва зара-

ражаетъ впадину мочевого пузыря; въ такомъ случаѣ сіе гнойное мочеиспеченіе примѣчается. Врачеваніе требуетъ внутренняго камединной ршупи употребленія купно съ соннымъ зельемъ и водяною вышляжкою смирны.

3. Гнойное мочеиспеченіе отъ бѣлой грыжи происходящее. Обыкновенно при окончаніи бѣлой грыжи волокнцы клейкія, возгнвывая или гнойныя въ мочи примѣчаются. Оно врачуетъ само собою.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е VII.

О оскудѣніи тѣлесныхъ силъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О любострастномъ иссушеніи тѣла.

1. Любострастное иссушеніе тѣла есть оскудѣніе соковъ безъ медлѣнной лихорадки.

2. Иссушеніе тѣла отъ бѣлой грыжи или отъ течения бѣли. Оно бываетъ сопряжено съ долговременною бѣлою грыжею у мужчинъ, и съ такимъ же теченіемъ бѣли у женъ случающимся. Врачеваніе требуетъ, кромѣ лѣченія бѣлой грыжи или бѣли, еще крѣпительныхъ лѣкарствъ и доброй питательной пищи.

3. Изушеніе тѣла отъ зашвердѣлыхъ желѣзъ.

Вскрытіе мертвыхъ тѣлъ, любострастною болѣзнію зараженныхъ, научаетъ насъ, что оныя железы часто отъ любострастного яда премѣняются въ зашвердѣлыя окрѣпlosti, и причиняютъ изушеніе всего тѣла.

4. Изушеніе всего тѣла отъ скрышной заразы. Я примѣтилъ сей видъ болѣзни у тѣхъ, кои будучи не совершенно отъ любострастной заразы исцѣлены, воздерживаются отъ употребленія ртутіи. Ибо таковыя по употребленіи камединной ртутіи и отвара сарсапарели, въ скоромъ времени содѣлались шучными и полношѣлыми.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О любострастной сухоткѣ.

1. Любострастная сухотка есть оскудѣніе добрыхъ соковъ и изушеніе тѣла съ медлѣнною лихорадкою, однакожъ безъ кашля и безъ выплевыванія гноя.

2. Сухотка отъ ночной боли. Такимъ образомъ ломотною крѣпкою болью, и бессоницею любострастною страдающіе, вскорѣ истощены будучи, обыкновенно поражаются медлѣнною лихорадкою. Врачеваніе
тре-


требуетъ камединой ршуты купно съ соннымъ зельемъ, взвара сарсапарели и исландскаго моха съ молокомъ.

3. Сухошка отъ любострастной язвы, какъ то отъ уязвленія матки, отъ нарыва въ легкомъ или въ другой внутренности. Нарывъ въ легкомъ любострастный иногда чрезъ долгое время больныхъ лихорадочнымъ истощеніемъ изнуряетъ, а на послѣдокъ и убиваетъ. Врачеваніе то жъ самое предпріемлется, что и въ первомъ видѣ, однакожъ рѣдко бываетъ удачливо.

4. Сухошка отъ язвы въ костномъ мозгѣ. Она познается по наростѣ костномъ гніючемъ, или по внутренней костеѣдицѣ.

Врачеваніе требуетъ того, чтобъ пробуравить зараженное мѣсто. Зри гниль внутрькостная.

5. Сухошка отъ зашвердѣлости, или отъ наращения любострастныхъ бугорковъ въ легкомъ. Сей видъ сухошки вмѣстѣ причиняетъ и тяжелое дыханіе, и по большей части смертію оканчивается. Зри тяжелое дыханіе.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О любострастной чахоткѣ.

1. Любострастная чахотка есть изсушеніе шѣла купно съ выплевываніемъ гноя, съ кашлемъ и медлѣнною лихорадкою.

2. Чахотка грудная есть та, которая имѣетъ свое начало отъ любострастной язвы плушей, а познается по преждебывшему тяжелому дыханію и выплевыванію клейкихъ густыхъ и гнойныхъ мокротъ, бывающему при любострастныхъ болѣзняхъ. Сей видъ чахотки рѣдко врачуется; а особливо если она чрезъ долгое уже время продолжалася.

Врачеваніе испытывать должно посредствомъ камединой ршущи взваромъ сарсапарели и исланскаго моха, купно съ лихорадочною коркою, медомъ и молокомъ. Бракъ Моршонъ въ семъ случаѣ похваляетъ минеральнаго Эѳіопа.

3. Чахотка горшанная есть та, которая имѣетъ свое начало отъ язвъ, горшанъ сильно развѣдающихъ. Она разпознается по хрипливому или сипливому голосу.

Хотя въ сей чахоткѣ легкое бываетъ здорово: однакожъ болящій спраждаетъ частымъ гноеватымъ мокротъ выплевываніемъ, из-

сушеніемъ шѣла и медлѣнною лихорадкою. При всемъ же помѣ сей видѣ скорѣе врачуется, чѣмъ первый.

Врачеваніе требуетъ сперва лѣченія гор-
тани. О чемъ зри жабу язвенную.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е VIII.

О любострастной болѣзни беремен- ныхъ женъ.

1. Опыты насъ научаютъ, что жены страж-
дущія бѣлою грыжею, не токмо зачать во
утробѣ, но и будучи беременными, въ продол-
женіи своея беременности, любострастною
болѣзнію заразиться могутъ.

2. Въ обѣихъ случаяхъ любострастный
ядъ, посредствомъ крови сообщается самому
зароду.

3. Беременные жены страждущія любо-
страстною болѣзнію легко выкидываютъ,
или не доносивши раждаютъ. Выкидываніе и-
ногда, а не всегда при себѣ имѣетъ знаки
любострастной болѣзни.

4. Камединная ртуть, послѣ кровопу-
сканія, по собственнымъ примѣчаніямъ моимъ,
безопасно беременнымъ давать можно.

. Ибо

Ибо оная приноситъ врачеваніе какъ беременной женѣ, такъ и ея утробному плоду.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е IX.

О любострастной болѣзни младенцевъ.

1. Младенцы, либо еще въ матерней утробѣ будучи, отъ любострастной маіери, либо уже послѣ родовъ, отъ любострастной кормилицы заразиться могутъ.

2. Слѣдственно любострастная болѣзнь младенцевъ есть врожденная, или послѣ родовъ пріобрѣтенная.

3. Любострастная болѣзнь младенцевъ врожденная. Таковыя младенцы рождаются съ пятнами желтыми бывающими около задняго прохода, промежности срамнопроходной, около мошонки, или около дѣшороднаго уда женскаго, а иногда и по всему шѣлу. Оныя пятна чрезъ нѣсколько недѣль премѣняющіяся въ закожныя, жирныя и во всѣ стороны распространяющіяся язвы: часто гортань и спайки губъ вмѣстѣ разѣдающъ; отъ чего голосъ хрипливый, непрерывный крикъ, и бессонница ночью, глотаніе трудное, и самая смерть приключаются.

Иногда паховики у отроковъ, или печеніе бѣли, купно съ любострастными пятнами вскорѣ послѣ родовъ, или спустя не много по томъ оказываются.

4. Любострастная зараза младенцевъ потаенная. Иногда младенцы отъ любострастной маперы, безъ обыкновенныхъ любострастныхъ пятенъ, или безъ всякой иной любострастной порчи и заразы рождаются, а по томъ чрезъ двѣ или три недѣли кажущаясь бытъ весьма здоровыми; но по истеченіи сего времени обыкновенно очныя рѣсницы вспухаютъ, и изъ себя источаютъ изобильную бѣло-желшоватую влагу; по томъ же вскорѣ, если врачебная помощь подана не будетъ, оказываются любострастные пятна дѣшородныхъ частяхъ. Для сея то причины гноепеченіе изъ очей есть первѣйшимъ знакомъ потаенной любострастной болѣзни, въ младенцахъ существующей. Зри очное гноепеченіе.

Иногда любострастный ядъ потаенно сокрывающійся, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ причиняетъ язвы въ гортанѣ, или сшрупья на головѣ, или зобы и опухоли на выи, или падучую немочь. Зри болѣзнь многообразная.

Слѣд-

Слѣдственно отсюда явствуетъ, что въ первыя послѣ родовъ недѣли не всегда бывають достовѣрные знаки, по коимъ можно бы было утвердить то, что новорожденный младенецъ есть зараженъ любострастною болѣзнію.

5. Любострастная зараза младенцевъ послѣ родовъ пріобрѣтенная или нажитая. Младенцы рожденные отъ здоровой матери, но любострастною кормилицею будучи воспитываемые, получають язвы въ гортанѣ, устахъ, губныхъ спойкахъ: голосъ у нихъ бываетъ хрипливый, или сипливый, глотаніе трудное и невозможное; а на послѣдокъ изсушеніе всего тѣла оканчиваетъ жизнь оныхъ.

6. Образъ врачевать любострастную болѣзнь у дѣтей, отъ врачей предлагается пшеничный а именно.

- 1) Малымъ ртутьнымъ треніемъ тѣла младенческаго. Однакожъ примѣчено, что дѣти симъ образомъ лѣчимые, вскорѣ получають водяную немочь и умирають.
- 2) Ртутьнымъ треніемъ любострастной матери, грудью воспитывающей младенца. Я видалъ, что и отъ сего образа лѣченія младенцы, любострастною болѣзнію зараженные, умирали.

3) Ртутнымъ преніемъ здоровой кормилицы. Сосцы здоровой кормилицы, отъ младенца любострастного вскорѣ заражены будучи, по томъ дѣлаются неспособными въ воздоенію; и для того съ великимъ трудомъ, даже и за большія деньги рѣдко можно имѣть здоровую кормилицу.

4) Ртутнымъ преніемъ козы, въ какомъ нѣсть мѣстѣ обрѣтой. Такое воздоеніе есть весьма безпокойно; и какъ коза, такъ и дѣтя вскорѣ погибаютъ.

5) Мореною ртутью, или инымъ ртутнымъ составомъ, самому младенцу или кормилицѣ внутренно даваемымъ. Но таковыя ртутныя составы производятъ во младенцахъ кровавый поносъ, или сипотеченіе смертоносное.

7. Образъ врачевать любострастную болѣзнь, врача Пленка есть сей. Онъ имѣетъ обыкновеніе любострастной матери, когда она въ силахъ находится, сосцами кормить свое дѣтя, внутренно давать пилюли составленныя изъ камединой ртути, и сытной взваръ сарсанарели; а младенцу въ то жъ самое время, ежедневно по утрамъ и вечерамъ совѣтуетъ давать по маленькой чайной ложечкѣ ртутнаго сиропа. При чемъ утверждаетъ, что онъ симъ образомъ весьма счастливо и удачно излѣчилъ многихъ дѣтей,

съ

съ помощію воздоеія матери или кормилицы, также и безъ оной.

Сейже врачъ о себѣ объявляетъ тако: опыты меня научили, что дѣти еще въ матерней утробѣ, любострастною болѣзнію зараженные, могутъ даже и въ самой маткѣ излѣчиться отъ оной болѣзни посредствомъ камединой ртуті, беременною матерью внутренно употребляемой.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е X.

О любострастной болѣзни скрытной или пощаенной.

1. Любострастный ядъ или зараза иногда чрезъ долгое время, пощаенно сокрывается въ шѣлѣ, безъ причиненія всякой другой болѣзни.

2. Скрытная или пощаенная любострастная болѣзнь не оказывается ни какимъ примѣтнымъ знакомъ, однакожъ иногда заражаетъ другихъ чрезъ плотское соитіе.

3. Время опредѣлить не лзя, въ которое любострастный ядъ, въ шѣлѣ существующій, можетъ пощаенно сокрываться дошолѣ, поколѣ явственнo откроется въ настоящую болѣзнь.

4. Если подозрѣніе есть въ томъ, что любострастный ядъ потаенно сокрывается въ шѣлѣ младенцевъ рожденныхъ отъ зараженной матери, или воспитанныхъ любострастною кормилицею; или въ шѣлѣ взрослыхъ людей, кои нѣкогда страдали любострастною болѣзнію; или если совокупленіе съ мужчиною или женщиною кажущеюся быть здоровою, заражаетъ другихъ; въ такомъ случаѣ немедленно должно внутрь давать камединную ршущь купно со взваромъ сарсапарели и пасліона; которыя лѣкарства, по мнѣнію врачей, выводятъ наружу ядъ любострастный.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е ХІ.

О многообразной или подозрительной любострастной болѣзни.

1. Многообразная или подозрительная любострастная болѣзнь есть та, которая въ шѣлѣ человѣческомъ оказывается подъ многоразличными видами друхихъ болѣзней.

2. Любострастный ядъ скрытый или явственный иногда производитъ болѣзни, любострастной заразѣ необыкновенныя.

3. Любострастныя болѣзни обыкновенныя суть сїи: бѣлая грыжа, язвы дѣшородныхъ частей и горшани, паховики, опухоли или шишки около задняго прохода, незалупа, ко-
стные наросты, пяшна желшья на шѣлѣ, ломота и главоболѣніе ночное.

4. Любострастныя болѣзни необыкновенныя суть сїи: любострастная лихорадка, кашель, колошье въ животѣ, слабость, параличъ, падучая немочь, сухотка и проч.

5. Нѣтъ почти ни одной болѣзни, подѣ которою бы не могъ сокрываться ядъ любострастный.

6. Всѣ сїи болѣзни разпознаются по нижеслѣдующимъ примѣтамъ, аименно.

1) Когда мущина совершенныхъ лѣтъ самъ о себѣ сознаетъ то, что онъ нѣкогда страдалъ бѣлою грыжею, или язвами бывшими на плѣшкѣ, или паховикомъ. Или 2) Когда его отецъ, мать, или кормилица любострастною болѣзнію заражены были. 3) Когда настоящая болѣзнь сопротивляется всѣмъ обыкновеннымъ лѣкарствамъ. 4) Когда болѣзнь около полуночи усиливается, а около утренняго времени послабляетъ и умалается. 5) Когда отъ употребленія ртутіи болѣзненные припадки уменьшаются.

7. Всѣ же сїи вычисленные знаки суть токмо вѣрояшныя, а недостоверныя. Ибо всякая болѣзнь страждущаго зависить единственно отъ любострастнаго яда.

8. Врачеваніе всякой таковой подозрительной болѣзни требуетъ употребленія камединой ртужи и прочихъ лѣкарствъ, любострастной болѣзни сопротивляющихся.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е XII.

О любострастной болѣзни многосложной, сопряженной съ какою нїесть другою.

1. Любострастная зараза можетъ быть сопряжена со всякою другою болѣзнію.

2. Таковое сопряженіе болѣзней иногда пошемняетъ и угадку и врачеваніе оныхъ, и причиняетъ въ ономъ великое затрудненіе.

3. Сопряженіе любострастной болѣзни всего чаще случается.

1) СЪ цынгою. Когда цынготный вмѣстѣ есть подверженъ любострастной болѣзни: тогда врачеваніе оныя есть весьма трудно; потому, что ртуть въ больныхъ цынготныхъ дѣйствуетъ на подобіе яда. И для того врачеваніе больныхъ цынготно Любострастныхъ требуетъ того, чтобъ сперва имъ внутренно

но предписывать лѣкарства противуцынгош-
ныхъ, а потомъ присоединять къ онымъ мало по
малу уже камединную ртушь купно съ соннымъ
зѣлемъ. Наливокъ солодовой купно съ сокомъ
жерухи, ложечной травы, или ибунки, предъ
всѣми прочими здѣсь наиболѣе приличеству-
ющъ. Скорченіе колѣнъ иногда послѣ употре-
бленія ртуши приключается тѣмъ, у коихъ
цынга еще не явственна открылась; врачуеш-
ся же хорошо лѣкарствами противуцынгош-
ными, а особливо припаркою состоящею изъ
травы молодыла мѣлко истолченной.

- 2) Съ зобомъ, или выйными желваками. Боль-
нымъ подверженнымъ любострастной заразе
и выйной опухоли, безопасно ртушь давать
можно. Пилюли составленныя изъ шаковыхъ
лѣкарствъ, кои сопротивляются сего города
опухольмъ, и изъ минеральнаго еѳіопа, отъ
многихъ врачей отлично похваляются про-
тивъ зобовъ.
- 3) Съ проказою. О семъ сопряженіи болѣзней
зри любострастная проказа.
- 4) Съ зудомъ или коростою. Любострастные
язвы у больныхъ чесоточныхъ, по большой
части отъ употребленія ртуши дѣлаются
хужѣ; для сего причины сперва чесотку скры-
пную или явную, порошкомъ состоящимъ изъ
Ѳеіопа минеральнаго, или изъ перечищенной
сѣры, и канфоры нѣсколькихъ гранъ, и на-
ливкомъ

ливкомъ бузиновыхъ цвѣтовъ, также и прочими противучесоточными лѣкарствами лѣчить, а потомъ уже ртуть внутренно давать надлежитъ.

- 5) Съ жестокою болѣзнію. Когда лихорадка воспалительная желчная, или гнѣющая приключилась любострастному; тогда онъ находится въ превеликой опасности. Однакожъ врачеваніе противъ жестокой болѣзни направлять должно.

Любострастная зараза отъ моровой язвы не предъхраняетъ, какъ то нѣкоторые несправедливо думали.

- 6) Съ разными болѣзнями, отъ неумѣренности въ любострастїи происходящими. Таковыя болѣзни часто поражаютъ любострастныхъ. Отъ неумѣреннаго потерянїя сѣмени рождаются усталость, боль въ головѣ и мозгѣ, падучая немочь, приступленіе всѣхъ чувствъ, а особливо приступленіе зрѣнїя, слѣпоша, изсушеніе шѣла, чахотка, медлѣнная лихорадка, бѣлая грыжа, и истеченіе сѣмени особливо ночью. Сїи болѣзни разпознаются изъ повѣсти болящаго, изъ припадковъ предшествующихъ заразѣ, изъ бездѣйствїя мошонки и изъ прочихъ знаковъ.

Врачеваніе требуетъ, кромѣ камединой ртути въ маломъ количествѣ употребляемой, еще и нижеслѣдующаго, а именно.

а) Воздержанія отъ плотскаго совокупленія и отъ испусканія сѣмени; б) Пищи состоящей изъ такихъ питательныхъ веществъ, кои легко и скоро свариваются, каковыя суть сарацинское пшено, желе или застуженныя похлебки, молоко; а особливо исландскій мохъ здѣсь полезенъ; с) Питья состоящаго изъ ячменя и сарсапарели, въ молокъ разваренныхъ; д) Свѣжаго и открытаго загороднаго воздуха; е) Лихорадочной корки купно съ желѣзными опилками, коричнею шинкурою, и горькими крѣпительными лѣкарствами, если токмо медлѣнная лихорадка не показываетъ чего нѣсть сему противнаго; ф) Холодной бани или купѣли, кою рою ослабѣвшее тѣло весьма сильно подкрѣпляется.

7) Съ болѣзнями ршущю причиненными. Дѣйствіе отъ употребленія ршущи различать должно отъ дѣйствій, любострастнымъ ядомъ причиненныхъ; дабы кто нѣсть, безъ разсмотрѣнія счисляя болѣзни, отъ ршущи происходящія, любострастными, и умножая количество ршущи, не погубилъ болящаго.

Дѣйствія же ршущи въ неумѣренномъ количествѣ употребляемой, суть нижеслѣдующія:

а) Кровообращеніе усугубленное такъ, что число біеній боевыхъ жилъ иногда простирается даже отъ 120 до 130.

б)

- б) Разжиженіе крови; отъ чего лъживое многокровіе, и воспалительная лихорадка, часто при началѣ врачеванія посредствомъ ршущи, примѣчается.
- в) Гнилость крови. Отъ чего въ продолженіи врачеванія, иногда лихорадка гноеваго-желчная сопряженная съ кровстеченіями и смерть; или цынга со слабостію колѣнъ и кровоточащими деснами; отъ чего вонь изорота исходящая, моча и потъ смердящіа; а отъ того кровавое слинотеченіе приключаются.
- г) Слинотеченіе неумѣренное. Отъ того тѣло истощенное, слабое, иногда во всѣхъ членосоединеніяхъ скорченное; отъ того жаба или воспаленіе горшани, съ весьма худыми язвами около слинныхъ прошочковъ на внутренней поверхности ланитъ и подъ языкомъ; отъ того задохъ, слиноточащимъ больнымъ, и самая смерть приключаются. Иногда скорченіе челюстей и соращеніе ланитъ съ самими деснами, попреодолѣніи слинотеченія, оспаюшся.
- д) Осадка ршущи въ различныхъ мѣстахъ, а особливо въ костяхъ. Отъ того боль въ составѣхъ или въ костяхъ, дрожаніе, кровоплеванье, оскудѣніе силъ, разширеніе кровеносныхъ сосудовъ, падучая немочь, и прочія долговременныя болѣзни приключаются.

4. Ошсюдю явспивуетъ, что болѣзни ршущю причиненныя могутъ раздѣлены быти

на

на воспалишельныя, гнѣющія и долговременныя.

5. Болѣзни воспалишельныя, равно какъ лихорадка и жаба воспалишельная, требуютъ: 1) Воздержанія отъ употребленія ртутныхъ лѣкарствъ; 2) кровопусканія; 3) слабительныхъ легкихъ, воспаленію сопрошивляющихся; 4) емульсии или оршада съ селитрою; и 5) Вывара ячменного купно съ селитрою и аравійскою камедью.

6. Болѣзни гнѣющія, какъ то лихорадка гнѣющая, язвы устные смердящія и цынга, кроме ртутныхъ лѣкарствъ, требуютъ 1) наливка солодового ячменного съ соками противуцынготными; 2) корки лихорадочной, и 3) пищи изъ растѣній состоящей.

7. Болѣзни долговременныя отъ ршуты, въ шѣлѣ оставшей, произшедшія, какъ то: скорченіе или сведеніе связокъ, боль въ суставахъ и дрожаніе мышцъ, врачуются, если къ лѣкарствамъ противуцынготнымъ присоединены будутъ, еще и нижеслѣдующія: 1) бани парныя, или теплая купель многократно повтораемая. 2) потовыя, какъ то взваръ корня девесилового, или царского, есенція пимпнели, а особливо аншимонія или сурьма. 3) иногда просныя; и 4) молоко; а для истощенныхъ діеша молочная пользуютъ.

ОТДѢ-

О Т Д Ъ Л Е Н І Е. XIII.

О предохраненіи отъ любострастной болѣзни.

1. Средство, которое могло бы воспрепятствовать тому, дабы здоровый мужчина, совокупляясь съ женщиною имѣющею бѣль, или язвы въ рукавѣ матки, не заразился любострастныхъ ядомъ, или заразившись онымъ, снова отъ онаго могъ бы освободиться, еще и понынѣ неизвѣстно.

2. Омовеніе дѣшороднаго уда, вскорѣ послѣ совокупленія чинимое, иногда полезно быть можетъ, если зараза любострастная еще не проникла въ самыя ложжинки мочеиспускательнаго стволѣ. Но по большей части оный ядъ скоро всасывается въ скважинки оныхъ ложжинокъ.

3. Смазываніе дѣшороднаго уда, чинимое прежде совокупленія, посредствомъ масла или рипушной мази, или мѣшечкѣ наложенный на дѣшородный удъ, и вымысленный сообразно рукаву матки, кондомъ именуемый, и прочіе презрительные искусственные способы, отнюдъ не отвращающъ заразы; какъ то я на многихъ больныхъ испыталъ многократно.

4. Впрыскиваніе мыльнаго щолока, или цыпроннаго сока, водою разведеннаго, и немедленно послѣ совокупленія употребляемаго, и прочія отъ разныхъ писателей похваляемыя средства не имѣли добраго успѣха, какъ то опыты насъ научаютъ.

5. Большихъ успѣховъ ожидать должно отъ раствора мореной или сладкой, или камединой ртуты, молокомъ раствореннаго, и употребляемаго вмѣсто полосканья, и впрыскиванья. Хотя все сіе многими опытами, нарочитыми съ намѣреніемъ учиненными; еще болѣе впродъ изслѣдовать остается.

6. Слѣдственно воздержаніе отъ любострастнаго блага, есть единое и надежнѣйшее предъохранительное средство отъ любострастнаго зла.

Конецъ второй части.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ОТДѢЛЕНІЕ I.

I. Врачебныя предписанія лѣкарствъ, въ семь сочиненіи похваляемыхъ.

I) Внутреннія врачебныя предписанія.

1. Растворъ камединной ртуты.

Возми живой перечищенной ртуты драхму 1.
Аравійской камеди въ порошокъ разтертой
драхмъ 3.

Сиропа дихорейнаго и ревеннаго сколько потребно.
Мѣшай долго въ стеклянной ступкѣ, мало по малу
прибавляя нѣсколько сиропа, покалѣ вся ртуть
совершенно превратится въ клей чли клей-
кую слизь. Когда весь составъ хорошо смѣшаш-
ся, тогда мало помалу прибавляй розовой воды
унцовъ 12. По томъ храни его въ стеклянной
банкѣ, и по утру и въ вечеру употребляй по сто-
ловой деревянной ложкѣ.

Употребленіе. Сей растворъ есть первѣйшимъ лѣ-
карственнымъ внутреннимъ средствомъ во всѣхъ
любострастныхъ болѣзняхъ; ибо онымъ скоро,
безопасно и пріятно истребляется любострас-
тная зараза. Онъ рѣдко причиняетъ слиношече-
ніе, особливо если пилюли проносныя, или по-
рошокъ проносный же, внутренно даны будутъ
черезъ каждые десять дней. Растворъ приниматъ
должно въ деревянной ложкѣ по тому, что ртуть
легко пристаетъ къ серебряной, или изъ другаго
крушца здѣланной ложкѣ. Тѣ, у коихъ слина на-
чинаетъ шечь, должны принять проносное лѣкар-

I. Formulae remediorum in hoc opusculo laudatorum.

I) Formulae internae.

I. Solutio mercurii gummosi.

R_x. Mercurii vivi deputatissimi ʒi.
gummi arabici puluerifati. ʒiij.
Syrupi cichorei cum rheo. q. ʒ.

Conterantur in mortario vitreo, sensim adfundento aliquantum syrupi, donec mercurius omnis abiit in mucum. His satis subactis, addantur sensim conterendo,

Aquae rosarum ʒxij.

Detur in ampullam. S. mane ac vespere duo cochlearia lignea mensualia assumantur.

Usus. Haec solutio in omnibus morbis venereis primum remedium internum est, quod cito, tuto ac jucunde miasma venereum delet. Raro salivam movet, si omni decima die pilulae purgantes vel pulvis purgans exhibeatur. Solutio ex cochleari ligneo assumi debet; cochleari enim argenteo vel metallico mercurius adhaeret, Quibus saliva moveri incipit,

164 внутреннія врачевныя предписанія.

ство, и чрезъ нѣсколько дней воздержашься отъ употребленія сего раствора.

2. *Пилюли состоящія изъ каменной ртути.*

Возми живой ртути перечищенной драхму 1. Аравійской въ порошокъ растертой камеди драхмы 3. сиропа дихорейнаго и ревеннаго, сколько потребно. Мѣшай все хорошо въ мраморной или стеклянной ступкѣ, пока вся ртуть превратится въ клейкую слизь. Потомъ къ ней прибавь мягкаго пшеничнаго хлѣба полъ унца. Хорошо смѣшавъ все, здѣлай изъ того пилюли въсомъ въ 3 грана, и посыпавъ оныя порошокомъ солодковаго корня, употребляй по утрамъ и по вечерамъ по 10 пилюль.

Употребленіе. Сіи пилюли лучше внутренне принимать можно, чѣмъ растворъ; и по тому я чрезъ нѣсколько лѣтъ сряду весьма часто съ великою пользою оныя больнымъ предписываю. Уже чрезъ два года къ нимъ примѣшиваю полдрахмы перечищеннаго соннаго зѣлья, и называю оныя пилюлями ршущьными и ошашными или усышительными.

3. *Сиролъ ртутный.*

Возми живой перечищенной ртути гранъ 20. Аравійской въ порошокъ растертой камеди гранъ 60. Сиропа ревеннаго и дихорейнаго сколько потребно, мѣшай все въ стеклянной ступкѣ, пока ртуть превратится въ клейкую слизь; сверхъ того при растираніи прибавь еще сиропа дихорейнаго и ревеннаго унцъ 1. съ половиною. Смѣшай все, и давай по утрамъ и въ вечеру дѣтямъ по маленькой деревянной ложечкѣ; количество же онаго мало по малу умножать должно.

hi assumant pargans, et aliquot dies a solutione abstineant.

2. *Pilulae ex mercurio gummoso.*

R \acute{e} . Mercurii vivi depuratissimi ʒi.
gummi arabici puluerisati ʒiij.
Syrupi cichorei cum rheo. q. s.

Conterantur bene in mortario marmoreo vel vitreo, donec mercurius omnis in mucum abiit; tunc adde micae panis albissimi ʒβ.

Subigantur bene in massam pilularem. Fiant pilulae gr. iij. Conspergantur pulvere liquiritiae. d. S. mane ac vesperi assumantur pilulae x.

Vsus. Commodior harum pilularum, quam salutionis assumptio est; hinc ab aliquod jam annis frequentissime his pilulis magno cum effectum utor. jam a duobus annis ʒβ Opii depurati admisceo, et pilulas a mercurio gummoso-opiato voco.

3. *Syrupus mercurialis.*

R \acute{e} . Mercurii vivi depuratissimi. ʒi.
gummi arabici puluerisati ʒiij.
Syrupi cichorei c. rheo. q. s.

m. Conterantur in mortario vitreo, donec mercurius abiit in mucum; adde insuper conterendo.

Syrupi cichorei c. rheo ʒiβ.

m. d. u. S. mane ac vesperi detur infantibus cochleare paruum ligneum; dosis sensim augeatur.

166 внутренія лечебныя предписанія.

Употребленіе. Сей сиропъ весьма способно давать можно младенцамъ, любострашною болѣзнію зараженнымъ.

4. Обыкновенныя проносныя пилюли.

Возми состава пилюль Руффовыхъ поддрахмы, смолы ялапповой и мореной ршупи по 4 грана, смѣшай все, здѣлай пилюли вѣсомъ въ 3 грана и прими на одинъ пріемъ.

Употребленіе. Я сими пилюлями произвожу слабительное дѣйствіе у шѣхъ, кои ршутъ употреблять. Онѣ легко и дѣйствительно слабятъ по 7 разъ и больше. Болѣе чѣмъ тысячи больнымъ оныя мною предписаны были, и не причинили оныиъ сильнаго проноснаго дѣйствія ни рвоты.

5. Вваръ проскурняка большого.

Возми корня большого проскурняка унцовъ 2, листовъ ржи и цвѣтовъ полевого маку по полуторсти. Вари въ довольномъ количествѣ воды чрезъ четверть часа; продолженнаго ввара фунтовъ 2 употребляй чрезъ 2 часа по 2 чашки или стакана, усладивъ сахаромъ или сиропомъ усыпительнымъ.

Употребленіе. Онѣ пользуютъ во время воспалительное бѣлой грыжи и въ другихъ болѣзняхъ.

6. Порошокъ легкослабительный отъ бѣлой грыжи.

Возми отборнаго ревеню, соли удивительной и перечищеннаго виннаго камня по 3 драхмы, смѣшавъ изотри въ порошокъ, раздѣли его на 12 равныхъ частей, и ежедневно чрезъ 3 часа употребляй по одному порошку. Ufus.

Ufus. infantibus venereis hicce syrupus commodissimo
adhibetur.

4. *Pilulae purgantes ordinariae.*

R_x. Massae pilularum Ruffi 3β.
resinae ialappae.
aquilae albae āā gr. iv.

m. f. pil. gr. iij. S. assumantur pro una dosi.

Ufus. His pilulis omni decimo die alvum moveo illis,
qui mercurio utuntur. Hae pilulae septies vel saepius
alvum facile et certo movent, millenis aegrotis praef-
criptae hypercatharfin non causerunt.

5. *Decoctum althaeae.*

R_x. Radicis althaeae 3ij.
Fol. malvae.
Flor. papav. rhoeatos āā mβ.

Coque in. S. q. aquae per horae quadrantem. Dentur
col. ij.

S. Omni bihorio cum syrupo diacodii vel sacharo
hauriantur vascula duo.

Ufus. in Gonorrhoeae et aliorum morborum stadio in-
flammatorio conducit.

6. *Pulvis eccoproticus ad gonorrhaeam.*

R_x. Rhei electi.
Salis mirabilis.
cremoris tartari āā 3ij.

m. f. pulv. dividatur in xii doses aequales. S. omni
trihorio de die assumatur unus.

168 внутренній врачевный приписаніѣ.

Употребленіе. Онѣ умѣриваетъ жаръ мочеиспускательнаго ствола, и чрезъ нѣсколько недѣль переимѣнуетъ сыогрыжной тной въ водяную влагу.

7. Бальзамическая кашка отъ бѣлой грыжи.

Возми отборнаго ревеню, удивительной соли и перетищеннаго виннаго камня по 5 драхмы, бальсама копайскаго съ сахаромъ хорошо растертаго полдрахмы; кашки слабительной сколько потребно; смѣшай все, сдѣлай кашку и ежедневно употребляй по полудрахмѣ.

Употребленіе. По утолненіи жара, при испусканіи мочи чувствуемаго, и при истеченіи водяной мокроты онѣ вскорѣ лѣчитъ болѣзнь, если нечрезмѣрное бываетъ разслабленіе мочеиспускательнаго ствола.

8. Кашка крѣпительная отъ бѣлой грыжи.

Возми корки винтеровой и перуанской по 3 драхмы, корки померанцовой и корицы, такъ же выпяжки желѣзной яблочной по 2 драхмы, сиропа корки померанцовой, сколько потребно. Смѣшай все, сдѣлай кашку и употребляй ежедневно четыре раза по 1 драхмѣ.

Употребленіе. Пользуется въ случаѣ теченія бѣли, и во время сукровичной бѣлой грыжи, особливо когда болѣзнь начинаетъ быть долговременною, и болящаго приводитъ въ истощеніе и оскудѣніе силъ.

9. Вино крѣпительное.

Возми опилокъ желѣзныхъ незаржавѣлыхъ, корки перуанской, винтеровой и корицы по полу унцу, смѣшавъ изотри въ порошокъ, налей на оной стараго австрійскаго или французскаго краснаго
Ufus.

Ufus. compescit ardorem urethrae et pus gonorrhoeicum intra aliquod septimanas reddit lymphaticum.

7. *Electuarium Balsamicum ad gonorrhoeam.*

R̄. Rhei electi.

Salis mirabilis.

Cremoris tartari ṁṁ 3iŷ.

Balsami copaivae cum saccharo bene subacti 3β.

Electuarii lenitivi q. ſ.

m. f. elect. S. quater de die assumatur drachma semis.

Ufus. Cessante urinae ardore ac effluvio iam lymphatico existente, morbum brevi curat, si non nimis magna adest laxitas urethrae.

8. *Electuarium Roborans ad gonorrhoeam.*

R̄. Cort. Winterani.

—— peruviani ṁṁ 3iŷ.

—— aurant.

—— cinamomi.

Extract. martis pomati ṁṁ 3iŷ.

Syrup cort. aurantiorum. q. S.

m. f. electuar. S. quater de die assumatur drachma una.

Ufus. in leucorrhoea et in lymphatico gonorrhoeae fladio, si morbus incipiat chronicus fieri ac aegrotum emaciet, conducit.

9. *Vinum Roborans.*

R̄. Limaturae martis non rubiginos.

Cort. peruviani.

—— Cinamomi.

—— Winterani ṁṁ 3β.

K 5

ВИНА

170 внутреннія лечебныя предписанія.

вина фунтовъ 2. поставь въ тепломъ мѣстѣ чрезъ 24 часа, по томъ когда устоится, процѣди и употребляй по 5 разъ въ день по ложкѣ, мало по малу умножая количество онаго.

Употребленіе есць то жѣ, что и каши крѣпительной, шо есць: оно лѣчитъ бѣлую грыжу и бѣль тогда, когда оныя содѣлаются не любострастными.

10. Вварѣ дерева бакаута.

Возми дерева бакаута наскобленнаго 2 унца, свари въ фунтахъ 2½ чистой рѣчной или ключевой воды, поколѣ останется только фунта 2. пей ежедневно по 2 фунта.

Употребленіе. Онѣ найденѣ прежде употребленія ртуті въ любострастной болѣзни, и у предшественниковъ нашихъ былѣ единымъ въ сей немочи средствомъ. Пользуется найпаче людямъ мокротнымъ. Нѣкоторые къ сему ввару еще придають живой ртуті и сурмы по 1 драхмѣ, завязавъ оныя въ особыя мѣшечки, и называютъ вваромъ бакаутовымъ сложеннымъ.

11. Вварѣ деревъ сурьмовый.

Возми корня сарсапарелли, сандала бѣлаго и краснаго по 3 драхмы; корня солодкового; корки волчьяго перца по полѣ унца; дерева родоскаго, бакаута и сассафраса по 1. унцу; сурмы унцовъ 2. смѣшавъ, налей кипячей чистой воды фунтовъ 10; оставь въ тепломъ мѣстѣ чрезъ 24 часа, по томъ вари на легкомъ огнѣ, поколѣ останется только фунтовъ 5, процѣди и давай больному пить сперва по полтора фунта, а по томъ умножай количество онаго даже до 5 фунтовъ.

m. f. pulv. cui affunde vini generosi austriaci ℥℥. Relinque in leni digestionem per 24 horas, dein colaturam per inclinationem exhibe.

S. Detur ter de die cochleare unum, sensim augendo dosin.

Ufus est ut electuarii roborantis, nempe gonorrhacae ac fluorem album, non amplius venereum, curat.

10. *Decoctum ligni guaiaci.*

Rx. Rasurae ligni guaiaci ℥℥.

coq. in aquae font. ℥℥β.

ad remanent. ℥℥.

d. S. hauriantur quotidie ℥℥.

Ufus. Ante mercurii usum in lue venerea inuentum, unicum in hoc morbo maioribus nostris fuit remedium. Convenit subiectis phlegmaticis. Sunt qui addunt decocto huic argēti vivi et antimonii crudi in sacculis singulis ligati ℥i, et vocant decoctum ligni guaiaci compositum.

11. *Decoctum lignorum Antimoniale.*

Rx. Rad. Sarsaparillae

Santali albi et rubri āā ℥i℥.

Rad. glycyrrh.

Cort. mezeracii āā ℥β.

Ligni rhodii.

— guaiaci

— assafras āā ℥i.

172 внушреннія врачевныя предписанія.

Употребленіе. Сей взваръ есть общій Лиссабонскимъ врачамъ, кои онымъ отвращаютъ болѣзни оспающіяся послѣ сииотеченія и послѣ употребленія ртути въ большемъ количествѣ. Зри сл. Мунная зборъ лѣкарствъ кн. 1 страниц. 338.

12. *Взваръ сарсапарели.*

Возми корня сарсапарели унцовъ 3. Вари въ чистой рѣчной или ключевой водѣ фунтахъ 2 съ половиною, поколѣ останется фунта 2. пей ежедневно по 2 фунта.

Употребленіе. Сей взваръ есть весьма хорошее разводящее и крѣпительное въ любострастной болѣзни лѣкарство. Онъ найпаче пользуется людямъ горячаго и многокровнаго сложенія.

13. *Взваръ сарсапарели сложенный.*

Возми корня сарсапарели унцовъ 2, корки волчьяго корня полдрахмы, вари въ чистой ключевой или рѣчной водѣ фунтахъ 3, поколѣ останется унцовъ 30. прибавь шуда водянаго раствора сулемы унцъ 1. Смѣшай и употребляй ежедневно по 2. фунта, продолжая чрезъ цѣлой мѣсяцъ.

Употребленіе. Сей взваръ похваляется и часто употребляется въ закоренѣлой любострастной болѣзни зажной и въ костяхъ гнѣздящейся. Зри собраніе сочиненій къ практическому употребленію врачей служащее.

14. *Взваръ корки волчьяго корня.*

Возми свѣжей корки волчьяго корня полъ унца, вари въ чистой водѣ фунтахъ 6; поколѣ останется фунтовъ 4. при окончаніи прибавь корня солодковаго унцъ 1. Процѣди и давай больному четыре раза въ сутки сего взвара по полуфунту.

м.

m. et infund. cum aqua font. ebull. ℥x. per horas 24.

Dein coqu. ad rem. ℥v. Collaturae capiat aeger ℥iβ.

Sensim augendo dosim ad ℥v.

Ufus. Hoc decoctum Lisbonae inter medicos familiare est, quo morbos post ptyalimum et usum mercurii liberaliorem residuos tollunt. vid. III. Muppai. apparatus medicament. vol 1. p. 338.

12. *Decoctum saraparillae.*

R̄. Radicis saraparillae ℥iij.

Coq. in aquae font. ℥iijβ.

ad remanentiam ℥ij.

d. s. Hauriantur quotidie librae duae.

Ufus. Optimum diluens et mundificans in lue venerea est. Convenit praecipue subiectis calidis, sanguineis.

13. *Decoctum sarsaparillae compositum.*

R̄. Radic. Sarsaparillae ℥ij.

Cort. mezerai 3β.

Coq. in aquae fontanae ℥iij. ad remanentiam unc. xxx.

adde solutionis aquosae sublimati ℥i.

m. d. s. Hauriantur quotidie per 30 dies ℥ij.

Ufus. in lue inveterata cutis ac ossium magni usus esse laudatur. V. Samml. zum gebrauch. practischer aerzte

2. st. 85. S.

14. *Decoctum corticis mezerai.*

R̄. Corticis e radice mezerai recentis 3β.

Coquatur in aquae fontanae ℥vj.

ad remanentiam ℥iv.

Sub finem adde radicis liquiritiae ℥i.

Collatura detur. S. Huius decocti ℥β.

bibat aeger gvater de die.

Упом.

174 внутреннія лечебныя лѣкарства.

Употребленіе. Сей взваръ похваляется въ случаѣ костныхъ опухолей любострастныхъ, такъ же отъ боли въ костяхъ ночью случающейся, и отъ опухоли любострастной въ членосоединеніяхъ бывающей.

15. Взваръ пасліона или лесьяго грозда.

Возми свѣжихъ верхушекъ пасліона полдрахмы, воды рѣчной или ключевой унцовъ 16. вари поколъ останется унцовъ 11. пей по трижды въ день съ молокомъ по три унца или по чайной чашкѣ.

Употребленіе. Сей взваръ весьма похваляется въ костномъ наращеніи, отъ лишаевъ и ломоты любострастныхъ. Зри лечебный журналъ томъ 22 стран. 236.

II) Внѣшнія лечебныя предписанія.

1. Растворъ ртутный простой.

Возми сладкой ртути драхму 1. Клею аравійской камеди унцъ 1. Воды розовой фунтъ 1. Смѣшай долго растирая въ мраморной иготѣ или стекляннѣй ступкѣ.

Употребленіе. Сей растворъ служитъ для вприскиванья, въ случаѣ бѣлой грыжи и печенія бѣли. Я предписывалъ болящимъ, окоболѣніемъ отъ бѣлой грыжи производящимъ, чтобъ они симъ растворомъ промывали очи. Онъ будучи смѣшанъ съ 1. унцомъ меда внѣ прикладывается къ язвамъ вмѣсто воды отъ ранъ, и для полосканья горшани, въ случаѣ язвъ тамо находящихся. Наховики, костныя опухоли, незалупа и прочія любострастныя наращенія должны быть съ верху покрываемы симъ растворомъ вмѣсто тепловатой примочки. Ufus.

Ufus. Laudatur in tophis, nodis venereis, doloribus osteocopis nocturnis, ac tumoribus venereis articulationum.

15. *Decoctum stipitum dulcamarae.*

R̄. Stipitum dulcamarae recent. 3β.

Aquae fontanae 3xvj.

Coquantur ad uncias xj. s. ter de die bibantur cum lacte 3iij.

Ufus. in exostosi, herpete, arthritide venerea valde laudatur. V. journal de medecine. F. 22. p. 236.

II) Formulae externae.

1. *Solutio mercurialis simplex.*

R̄. Mercurii dulcis 3i.

mucilaginis gummi arabici 3i.

Aquae rosarum ꝑi.

m. Soluantur contetendo exacte in mortario vitreo vel marmoreo.

Ufus. inseruit haec solutio pro iniectioe in Gonorrhoea et fluore albo. in ipsa ophthalmia gonorrhoeica hac solutione oculos elui curabam cum mellis 3i. mixta. Ulceribus loco aquae vulnerariae ac faucibus ulcerosis forma gargarismatis applicatur. Bubones, tophi, phimosis, ac alii tumores venerei, forma fomenti, hac solutione tegantur.

176 внутреннія лечебныя предписанія.

2. Растворъ ртутный бальзамическій.

Возми шинкуры смирновой, или роснаго ладона полъ унца; жидкаго усыпительнаго сосшава, взвара перуанской корки по 1. унцу; сладкой ртутти гранъ 20. смѣшай все хорошо въ ступкѣ растирая непрерывно и долго.

Употребленіе. Сей растворъ врачуетъ язвы гнусныя, застарѣлыя, въ рака претворяющіяся, кости разбѣдающія, любострастныя. Когда горшанъ шаковыми язвами поражена бываетъ, въ шаковомъ случаѣ оную посредствомъ кисточки дважды или трижды въ день симъ растворомъ смазывашь должно.

3. Вода ѣдкая для проходныхъ опухолей.

Возми спирта французскаго или самой крѣпкой водки; и перегнаннаго уксусу по полтора унца, сулемы драхму 1, квасцовъ, канфоры, и бѣлизы по полдрахмы, жидкаго усыпительнаго Сиденгамова сосшава унцъ 1. смѣшай все какъ должно.

Употребленіе. Проходныя опухоли, посредствомъ кисточки, сею водою дважды въ день смазывать, а по томъ еще сверху ртутною мазью прикрывать должно. Такимъ образомъ оныя опухоли вскорѣ и мало помалу исчезаютъ. Въ прочемъ кожа здоровая между шаковыми опухольми обрѣшающаяся, отъ сея воды не поришется и не уязвляется.

4. Молоко ртутное.

Возми ртутти перечищенной драхму 1. Аравійской камеди въ порошокъ растертой полъ унца; сиропа усыпительнаго сколько потребно. Смѣшай все хорошо растирая въ мраморной иготѣ, ма-

2. *Solutio mercurialis Balsamica.*

℞. Tincturae myrrhae ʒβ.
Laud. liquid Sydenh.
decocti cort. Peruviani ṽṽ ʒi.
aquilae albae ʒij.
misce conterendo.

Usus. Sordida inveterata, concrefcentia et cariosa ulcera venerea sanat; si fauces talibus afficiantur ulceribus, tunc hae ope penicilli bis vel ter de die hac solutione tangantur.

3 *Aqua caustica pro condilomatibus.*

℞. Spiritus vini rectificati.
Aceti destilati ṽṽ ʒiβ.
mercurii subl. corros. ʒi.
aluminis crudi
camphorae
cerussae ṽṽ ʒβ.
Laudani liquidi Sydenh. ʒi.

m. Solut. d. u.

Usus. Condylomata ope penicilli hac aqua bis de die illiniantur, et dein linimento mercuriali tegantur. Condylomata sic brevi ac sensim evanescunt; cutis sana, condylomatibus intermedia, ab hac aqua non exulceratur.

4. *Lac mercuriale.*

℞. Mercurii vivi depuratissimi ʒi.
gummi arabici puluerifat. ʒβ.
Syrupi diacodii q. S.

— *Уаcмz III.*

Λ

ΛO

до по малу прибавляя онаго сиропа, покуда все прописанное здѣлается клеемъ, къ которому по томъ мало по малу прибавляй молока коровьяго парнаго или кипячаго унцовъ 8. смѣшай все и употребляй.

Употребленіе. Сіе молоко виѣ прикладывается къ очамъ, въ случаѣ окоболѣнія бѣлою грыжею причиненнаго, посредствомъ особливаго баннаго сосуда, такъ же въ незалупѣ любострастной, для полосканья дѣшороднаго уда; сверхъ того сіе жѣ молоко съ великою пользою употребляется отъ жабы любострастной, съ болью сопряженной, въ видѣ полосканья.

5. *Бальсамъ ртутный.*

Возми мази царской полтора унца; ртутти осаженной красной драхмы 2. смѣшай все сколько возможно.

Употребленіе. Сей бальсамъ виѣ прикладывается къ любострастнымъ язвамъ для заживленія, и къ костнымъ опухольмъ или окрѣплымъ зашвердѣlostямъ любострастнымъ. Съ такою же пользою Г. Пленкъ употреблялъ его вмѣсто ртутти осаженной красной, сладкую ртуть смѣшавъ съ какимъ нѣсть бальсамомъ.

6. *Бальсамъ огный красный.*

Возми свѣжаго рускаго масла унцовъ 3. бѣлаго воску полъ унца: расплавивъ все прибавь туда ртутти и шертой драхму 1, канфоры въ яичномъ маслѣ растворенной граиъ 45. Смѣшай и здѣлай мазь, которою количесвомъ съ горошинку ежедневно по три раза смазывай болящее око.

Употребленіе. Сей бальсамъ хорошо врачуетъ пятна роговой очной оболочки, язвы и помраченія, такъ же гноепеченія и прочія любострастныя очныя долговременныя болѣзни.

m. Conterantur in mortario marmoreo sensim addendo syrupum donec omnia abeant in mucum, cui sensim adde.

Lactis ebullientis vaccini ℥viij.

m. d. usui.

Usus. in ophthalmica gonorrhoeica ope vasculi balneatorii et in phymosi venerea, forma peniluvii applicetur. idem lac in angina venerea dolorosa sub forma gargarismatis optimo cum successu adhibetur.

5. *Balsamus mercurialis.*

Rx. Vunguent. basilic. ℥iβ.

mercur praecipitat. rubr. 3ij.

m. exactissime.

Ufus. ad ulcera venerea consolidanda, ad tophos aut scirrhos venereos resolvendos, adhibetur. Eodem cum effectu, loco mercurij praecipitati rubri, mercurium dulcem, cum balsamo quodam mixtum adhibuit Plenkius.

6. *Balsamus ophthalmicus ruber.*

Rx. Butyri recentis insulsi 3ij.

Cerae albae 3ij. liquefactis adde

mercurii praecipitati rubri 3ijβ.

Tutiae praeparatae 3i.

Camphorae in oleo ovorum 3β. Solutae gr. XLV.

m. f. unguent. S. ter de die lentis magnitudo illiniatur oculo.

Usus. Corneae maculas, ulcera et obscuraciones, nec non lippitudinem ac reliquos oculorum morbos venereos, chronicos, egregie curat.

7. *Мазь разбивающая отъ паховиковъ.*

Возми мази глисто-гонной и неаполитанской по 1. унцу, корня мандрагоры въ порошокъ, растертаго 1½ унца, меду сколько потребно. Смѣшай все, чтобъ была мазь.

Употребленіе. Сія мазь похваляется для разогнанія заплывдѣлыхъ паховиковъ. Паховикъ нутру и въ вечеру смазывать, и по томъ сею же мазью прикрывать должно.



6. *Unguentum resoluens ad Bubones.*

Rx. Unguenti de arthanita

———— neapolitani $\tilde{a}\tilde{a}$ $\tilde{z}j$.

Pulu. rad. mandragorae $\tilde{z}i\beta$.

mellis communis. q. S.

m. f. Lenimentum.

Ufus. Ad bubones induratos resoluendos laudatur. Inungatur bubo mane ac vesperi, et dein tegatur hocce unguento.



ОТДѢЛЕНІЕ II.

*Врачебныя прилѣжанія на обѣ предвѣду-
щія части.*

Примѣч. 1. страниц. 1. Но. 2. Многіе писатели, какъ то Бекешъ, Саншесъ и прочіе ушверждающъ, что любострастная зараза, въ Италіи и Франціи, существовала уже самымъ дѣломъ, гораздо прежде возвращенія Христофора Колумба изъ Америки. Видманъ тоже самое мыслитъ о Германіи. Но писатели XIV и XV вѣковъ писали токмо о болѣзняхъ и язвахъ дѣпороднаго уда мужескаго, кои приключилися людямъ отъ плотскаго совокупленія съ женщиною подверженною проказѣ, или другому заразительному и прилипчивому недугу; ибо оныя болѣзни были токмо мѣстныя или частныя, никогда не перемѣнялися въ любострастныя, и безъ употребленія ртутіи совершенно врачевалися. А настоящая любострастная болѣзнь свирѣпствовала сперва съ такою жестокостію, что отнюдѣ не могла бы ушамъ отъ знанія столь многихъ врачей, кои писали о разныхъ болѣзняхъ до возвращенія Колумбова, или по меньшей мѣрѣ не была бы забыта и безименна не оспалась, если бы еще прежде тѣхъ временъ господствовала въ Европѣ. Зри врача Аструка книгу о любострастныхъ болѣзняхъ. Томъ II. 2.

2. — Н. 3. Нѣкоторые писатели называютъ любострастную болѣзнь свѣфидою, производя сие наименование отъ Свѣфиды пасуха, который пася стадо Царя Алцифоа, и горделиво величаяся какъ множествомъ такъ и красотою овецъ и прочихъ ввѣренныхъ его спражи животныхъ, насмѣхался солнечному свѣшлу; но боги, въ наказание таковой горделивой его дерзости, какъ сказуютъ, низ послали сию жестокую болѣзнь на землю. Зри (Фонъ Свигена шолкованій томъ V. стр. 372. издан. Лейден.

3. — Н. 4. Сл. Галлей былъ такого мнѣнія, что Американская болѣзнь именуемая *яесъ* есть мать нашей любострастной болѣзни. Поелику болѣзнь яесъ, чрезъ соитіе и воздоеніе дѣшей другимъ сообщается и врачуется ршутью; то по сему думаю, говоришь сей писатель, не безъ причины можно производить начало нашей заразы отъ той же самой болѣзни; хотя нѣкоторые писатели вопреки сему думаютъ, якобы болѣзнь яесъ не есть любострастная, по тому что въ нашихъ странахъ не приключается. Любострастная же зараза съ самаго начала произвела наросты и опухоли по всему тѣлу; и я видѣлъ, продолжаетъ томъ же писатель, крестьянина, который почти на всѣхъ тѣлесныхъ частяхъ, даже и между ножныхъ перстовъ и по всему лицу имѣлъ опухоли, подобныя наращеніямъ, бо-

лѣзню явѣ причиняемымъ. Предположивъ сіе слѣдуещѣ заключишь, что какъ сѣмена одного и тогожѣ растѣнія, по различію теплоты, воздуха, земли и земленашества, производяшѣ часто различные листья, цвѣты и плоды: такъ равно и зараза явсѣ могла произвести въ нашемъ климатѣ другія болѣзни, чрезъ повиновеніе плошкаго соишія и употребленіе лѣкарствъ, между собою различествующія. Зри Вивліюшеки его врачебной Томъ I. сшран. 434. Врачъ Шиллингъ производитъ начало болѣзни явсѣ отъ ядѣнія плода одного растѣнія, музою именуемаго, который обыкновенно еѣ шѣхѣ сшраныхъ вмѣсто хлѣба употребляется. Зри его книгу о болѣзни почти неизвѣстной въ Европѣ, отъ Американцовъ называемой явсѣ сшран. 9. §. 73.

4. Сшран. 2. N. 6. Нѣкоторые писатели производяшѣ начало любострасшной болѣзни отъ сообщенія со блудницами, отъ соишія сѣ прокаженными, отъ влїянія небесныхъ свѣтилъ и планетъ, такъ же отъ порчи и гнилости воздуха, причиняемой частыми дождями. Иные производяшѣ оную отъ поврежденія печени, отъ заразительныхъ водъ, отъ питья винограднаго вина, кошорое Гишпанцы осквернили кровію прокаженныхъ. Иные наконецъ производяшѣ оную отъ ядѣнія челоуческой плоти, отъ сообщенія людей сѣ кобылицами, отъ угрызенія или ядѣнія нѣ-

. кото-

которой Американской ядовитой ехидны. Зри Грунеровы древности болѣзней стран. 80. 81. Напослѣдокъ иные думаютъ, что любострастная зараза отъ самого Бога низпослана въ наказаніе блудниковъ. Но тако мыслящіе должны бы взять въ разсужденіе и то, что весьма часто невинные младенцы, жены, машери и кормилицы, сеюжъ прилипчивою заразою безъ всякой ихъ собственн-ной вины, бѣдственно страждутъ.

5. Стран. 3. §. 5. Нѣкоторые писатели находятся въ шакѣ мнѣніи, что любострастная зараза есть кислаго свойства; по тому что она размягчаетъ кости, фиолетовые соки дѣлаетъ красными, и при томъ лечуется щелочными солями и ртутью, о коей думаютъ, что она въ себя всасываетъ кислоту. Зри Цезана сочиненіе о любострастныхъ болѣзняхъ издан. Париж. 1774. стр. 205. Однакожъ еще не совершенно доказано, что бы любострастная зараза была лечуема Алкалическими лѣкарствами; такъ же и то, какимъ бы образомъ сулема, весьма изобилующая сольною кислотою, могла въ себя всасывать любострастную кислоту.

6. ——— N 8) Любострастная зараза безвременная или внезапно случившаяся, о коей повѣснвуютъ, яко бы она сама собою безъ нечислаго совокупленія раждается, какъ то нѣкоторые писатели примѣчаютъ; не есть настоящая таковая зараза, но по мнѣ-

нiю Г. Пленка самородная порча клейкой слизи, въ мочеиспускательномъ стволѣ ошдѣляющейся; или скрышная любострастная болѣзнь, чрезъ плоское соитiе или другимъ какимъ нiесшъ образомъ причиненная и обнаруженная.

7. — §. 2) Сюда шакъ же принадлежишъ зараза, отъ бабокъ или другихъ, кои у родильницъ иногда мако устами высасываютъ, имъ же сообщенная. Бланкардъ, Блохсъ и прочiе врачи своими опытами сiе самое подтверждаютъ.

8. Стран. 12 N. 8) Сiе правило, чтобъ долго употреблять ршуть, въ лѣченiи любострастной болѣзни, есть весьма важно. Г. Пленкъ говоритъ, что онъ видалъ таковыя шишки около задняго прохода и язвы въ гортанѣ, кои хотя сперва и умалялися отъ внутренняго ршущи употребленiя: однакожъ чрезъ долгое время пребывали въ одномъ состоянiи; и болящiй, который безъ труда легко и чрезъ долгое время внутренно принималъ ршуть, отъ того нанослѣдокъ мучился различными болѣзненными припадками, какъ то усталостью, небольшою лихорадкою, потерянiемъ позова къ пици, кашлемъ, жаромъ, во устахъ и въ гортани ощущаемыми. Всѣ же оныя припадки совершенно исчезали, когда онъ переставалъ употреблять ршуть внутренно; а язвы гортанныя и шишки проходныя одними внѣшними средствами, безъ вну-

внутренняго ртути употребленія, легко врачевались; какъ и примѣры сіе доказывающіе, въ послѣдующихъ примѣчаніяхъ о любострастной жабѣ, вычислены будутъ. Правило, ошѣ многихъ повворяемое о перемѣнѣ ртути, на какой нѣсть другой искусствомъ приутовленной соспавѣ, въ шакомъ случаѣ, когда болѣзнь безпрерывно въ одномъ положеніи продолжается, въ практикѣ г. Пленка, по собственному его признанію, никогда нужно не было; да и въ объявленномъ случаѣ едва ли оное могло бы приличесшвоватъ.

9. Стран 15, N) 1. Нѣкоторые писатели думашѣ, что любострастная бѣлая грыжа впервые оказалась въ 1540 году; но Александръ Венедиктѣ примѣшилъ оную еще въ 1493 году, какъ то доказываетъ Галлерѣ въ вліюиѣ дѣяшельнаго врачевства. зри Томъ 1. Стран. 475. А та бѣлая грыжа, о коей пишешѣ Бекешѣ, якобы она въ Лондонѣ еще въ 1340 году примѣчена была; имѣла, какъ кажешся, свое начало ошѣ одной похопливой нечистоты; по тому что весьма легкими лѣкарствами совершенно врачуема была, какъ сіе доказывашѣ философическія дѣянія, а особливо врачи Лезеке и Геклерѣ то же подтверждаютъ.

10. — N. 2. Бѣлая грыжа называется gonorrhoea. Сіе наименованіе сложено изъ греческихъ словъ γόνι сѣмя и ρεώ, теку и по какъ въ любострастной бѣлой грыжѣ, то-
кмо

кмо клейкая слизь или мокрота, а не сѣмя изъ мочеиспускательнаго ствола, каплями вонъ истекаетъ; то въ разсужденіи сего лучше бы назвать оную другимъ греческимъ же сложнымъ словомъ, а именно, *leucorrhoea viridis* т. е. теченіе бѣли мужское. Что жъ насножащее сѣмя въ случаѣ бѣлой грыжи отнюдь не истекаетъ; сіе доказывається пѣмъ, что подверженные сей болѣзни могутъ свободно выбрасывать сѣмя. Тожъ самое и другими доказательствами подтверждается.

II. — Н. 3. Г. Пленкъ имѣлъ случай раздроблять на части мертвое тѣло воина скончавшагося отъ груднаго колошья, которое было сопряжено съ жестокою бѣлою грыжею: при чемъ онъ видѣлъ весь мочеиспускательной стволъ покрасившій и желтую слизь истекающую изъ скважинокъ онаго ствола. Однакожъ онъ нигдѣ тамо не нашелъ никакой язвы. Тожъ самое недавно примѣтилъ и врачъ Столь, который въ мертвомъ трупѣ, любостраспною болѣзнію зараженномъ обрѣлъ малое воспаленіе мочеиспускательнаго ствола, проспировавшееся отъ устья онаго на два дюйма далѣе, также и предъ самою пѣшкою. Язвы же нигдѣ болѣе не обрѣтались: все прочія части ствола, равно какъ ядра и пузырьки сѣменные были совершенно здоровые. Вр. Морганъ вычисляетъ многія членораздробленія надъ мертвыми тѣлами, бѣлою грыжею зараженныхъ, учиненныя. Зри причины болѣзней послан. 40. 12.

12. Спран. 14. N. 4. Врачъ Тодѣ утверждаетъ, что ядъ бѣлой грыжи не есть любострастная зараза, но особливаго рода ядовитая приличивость, не причиняющая обыкновенной любострастной болѣзни, но производящая другія немочи, рпушью ошню (б) неуврачуемая. Противъ доказательствъ, которыми сей ученый мужъ, старался подтвердить свое мнѣніе, г. Профессоръ Рихтеръ предлагаетъ весьма важныя сомнѣнія. Г. Пленкъ разсуждая о семъ, пишетъ тако: хотя и чувствую самъ о себѣ, что я не въ силахъ нахожусь вмѣшиваться въ то преніе, кое споль великіе мужи между собою имѣли о свойствѣ бѣлой грыжи любострастной: однакожь любя истинну, принужденнымъ себя нахожу, сочиняться объ упомянутомъ мнѣніи Тодіа. Изъ первѣйшихъ его доказательствъ, для чего бѣлая грыжа не есть любострастная болѣзнь, есть примѣчаніе его слѣдующее: что бѣлая грыжа лѣчишя безъ рпуши, и что рпушь въ сей болѣзни не пользуется. Противъ перваго доказательства г. Пленкъ отвѣтствуетъ тако: что любострастную заразу нельзя споль легко и удобно искоренить изъ другихъ частей человѣческаго тѣла, какъ изъ мочеиспускательнаго спвола и изъ рукава матки; слѣдственно и бѣлая грыжа безъ рпуши часто врачуется; чтожъ касается до употребленія рпуши въ случаѣ бѣлой грыжи, въ томъ могу, говоритъ Пленкъ, увѣрить всяка-

ка-

каго, что я одними рпушьными впрыскиваніями совершенно излѣчилъ многія бѣлыя грыжи у мужчинъ, и печенія бѣли у женщинъ; хотя въ прочемъ и не въ силахъ нахожусь отвѣснповать на нѣкоторыя другія его доказательснва, изъ коихъ есть и сіе: для чего напр. бѣлая грыжа на островъ Ошайпскомъ еще и понынѣ непримѣчена, хотя любоснрасшная болѣзнь давно уже многихъ людей тамо заразила? Зри Тодія врачебную и Рихтерову лѣкарскую Бивліотеку.

13. ——— Н. 5. Крайне должно различать бѣлую грыжу любоснрасшную отъ нелюбоснрасшной. Ибо Пленкъ видѣлъ испареніе или истеченіе гнойное произшедшее отъ одной шокмо нечистоты дѣшородныхъ частей; а имянно, отъ природной незалупы бывшей въ шрехлѣпнемъ младенцѣ. Тожъ самое примѣшилъ Аликсъ, который пишетъ, что бѣлой грыжѣ подверженъ бытъ можетъ всякъ шотъ, кто имѣетъ сошніе съ женщиною страждущею шеченіемъ острой и ѣдкой бѣли, хотя бы она была и нелюбоснрасшная. Вр. Вгшпъ видѣлъ бѣлыя грыжи приключившіяся отъ лошного вещества, въ мужескомъ дѣшородномъ удѣ зашѣдшаго. Офшердингеръ примѣшилъ бѣлую грыжу причиненную желчными нечистотами, въ перьвыхъ пищенріемныхъ снезяхъ скопившимися. Бренделъ ушсерждаетъ, что ядовитыхъ мокротъ истеченіе, изъ мочеиспускательнаго ствола бывающее, есть припадокъ пре-

прекрасившагося почечуя. Фордисъ, Соважъ и другіе славные мужи примѣнили, что гное-
ное шеченіе мокротъ воспослѣдовало отъ у-
потребленія новаго пива, отъ шпанскихъ мухъ
и отъ острой пищи. Напоследокъ Г. Пленкъ
вишешъ, что онъ самъ видѣлъ, въ совершен-
но здоровомъ человѣкѣ шакое гноешеченіе
причиненное каменною болѣзнію мочевого пу-
зыря, которое иногда само собою прекраща-
лось. Всѣ шакое бѣлыя грыжи нелюбоспра-
снныя познаются тѣмъ, что онѣ недолго
продолжаются: иногда гноешеченіе случается:
иногда оно прекращается: что женщины съ
мущинами, оному подверженными совокупля-
ющіяся, отъ того не заражаются; и что по
большей части, по уврачеваніи болѣзни, отъ
коей оныя произошли, сами собою и безъ лѣ-
карствъ прекращаются; напротивъ того бѣ-
лая грыжа сѣменная, или истеченіе сѣмени,
причиненное бездѣйствіемъ сосудовъ выбрасы-
вающихъ, или неумѣреннымъ плотскимъ соиті-
емъ, или ночнымъ невольнымъ сѣмени испражне-
ніемъ, различается тѣмъ, что отъ того случаю-
тся настоящее изсушеніе тѣла, оскудѣніе силъ,
и истеченіе настоящаго сѣмени примѣчается.

14. Стран. 17. N. 2). а. Нѣкоторые врачи
въ семъ случаѣ похваляютъ вытяжку огу-
речника и воловьяго корня: другіе совѣту-
ютъ употреблять вытяжку борца: а инныя
напоследокъ въ теченіи сего гноешеченія по-
чишаютъ полезною вытяжку дикаго аврана.

15. — 18. с) Внутреннее ршущи употребленіе, хотя и переищяешъ ядовитость бѣлой грыжи въ мокроту неѣдкую: хотя при томъ и защищаешъ болящаго отъ заразы любоспρασтнаго яда, однакожъ не совершенно врачуешъ оную; ибо таковая зараза сокрывается въ клейкой слизи, изъ ложинокъ мочеиспускательнаго ствола иссекающей, и безпрестанно оную поршишъ, подобно гнили; а ршуть въ семъ случаѣ внутренно будучи употребляема, почти никакой силы надъ оною не производитъ. Напрошивъ того ршущее впрыскиванье, посредствомъ насоса, легко разрушаетъ какъ оную слизь, такъ и сокрывающуюся въ ней любоспраспную заразу. Отсюду явствуетъ, что таковое впрыскиванье гораздо болѣе способствуетъ къ совершенному излѣченію бѣлой грыжи; нежели внутреннее ршущи употребленіе.

16. Стран. 26. N. 3. Маленькія свѣчи, изъ бараньихъ струнъ прѣуготовленныя, въ мочеиспускательной стволѣ, когда онъ есть чрезмѣрно сожашъ, легчѣ и удобнѣе запускать можно, нежели восковыя свѣчи Гулардовы. сверхъ того струны размягченныя, сильно вздуваются, болѣе расширяющъ дуло мочеиспускательнаго ствола, и слѣдственно по своей гибкости долѣе въ ономъ стволѣ, безъ раздраженія, въ немъ оставлены быть могутъ. Но еще и симъ предпочишаемы быть должны малыя свѣчи, внутри дуплестыя,

изъ упругой смолы содѣланныя, кои не только разширяютъ мочеиспускательной стволъ, но и въ немъ оставлены будучи нимаю не препятствуютъ свободному мочи шеченію. Въ прочемъ крайне должно беречься, чтобъ опиюдѣ не употреблять свинцоваго кашешера, или мочеваго выпускника, ртутью смазаннаго: ибо свинецъ легко отъ ртутуи преломляется; а свинцовый отломокъ въ мочевомъ пузырьѣ оставшись, подаетъ случай къ возрожденію каменной болѣзни.

17. — 30. N. 2). Касательно ноздреватаго рака, Г. Пленкъ утверждаетъ, 1) что онъ посредствомъ перевязки, совершенно уврачевалъ мушину лѣтъ 32, имѣвшаго ноздреватой наростъ, величиною въ два кулака, бывшій на самой плѣшкѣ и крайней плоти; 2) что онъ же видѣлъ другаго больного страдавшаго ракомъ чувственожилымъ, кошорымъ вся середина дѣшороднаго мужескаго уда разбѣдена и испорчена была; и для того, хотя весь дѣшородный удъ былъ отнятъ, однакожъ ракъ снова въ лѣвомъ паху оказался, и болящему причинилъ гибель изсушеніемъ шѣла, отъ рака воспослѣдовавшимъ.

18. — 32. N. 1. Часто у младенцовъ и юношей, имѣющихъ самородную узкость или сожатіе крайней плоти, отъ нечистоты, подъ онымъ покровомъ скопившейся, незалупа воспаляется и гнойная мокрота отшуда воиъ истекаетъ: но она будучи нелюбострастною,

легко зрачуется омовеніемъ дѣтороднаго уда, состоящимъ изъ молока или смягчительнаго отвара. Вр. Аликсѣ видѣлъ такой случай надъ однимъ деревенскимъ мужикомъ, котораго отъ глухого борообрѣя будучи считаемъ зараженнымъ любовопрасною болѣзнію, могъ бы быть подверженъ разводу супружества, если бы сей мужъ не объяснилъ судьямъ, что она болѣзнь не была заразительною. Зри лѣкарскія его примѣчанія кн. II. стран. 64.

19. — 42. N. 3). Первыи, сколько извѣстно, Гиршель совѣтуеиъ прививать бѣлую грыжу, въ случаѣ зашвердѣлости яичекъ. Образецъ или способъ прививанія оной, отъ него предлагается слѣдующій; а именпо, маленькая свѣча запускается въ мочеиспускательной стволъ мушины, бѣлою грыжею ядовитою зараженного, и она въ немъ оставляется чрезъ нѣсколько часовъ, поколѣ шаковая свѣча хорошо бѣлогрыжнымъ веществомъ напоится; и тогда оную отшуда вынувши немедленно вкладываютъ въ мочеиспускательной стволъ другаго мушины спраждающаго болѣзнію, отъ прекращенія бѣлой грыжи происходящую, и въ ономъ чрезъ 4 или 6 часовъ содержишся, поколѣ жаръ и нѣкоторыя другіе припадки, бѣлой грыжѣ свойственныя, окажутся. Такимъ же образомъ Вр. Офдеркирхенъ впускалъ маленькую свѣчу, любовопраснымъ ядомъ напоенную, въ мочеиспускательной стволъ 30-лѣтнаго воина спрдаваша-
го

го затвердѣлою окрѣпlostью лѣваго ядра, которое было величиною въ два кулака, твердо какъ дерево; болѣло шокмо во время прикосновенія; причиною же сего была бѣлая грыжа, за 4 года предѣ тѣмъ въ немъ прекратившаяся. Онъ ту свѣчу въ сшволѣ больного оставилъ чрезъ 7 часовъ; по прошествіи коихъ бѣлая грыжа купно съ обыкновенными своими припадками оказывалась начала; которую помянушый врачъ, двумя вновь на другой день запущенными малыми свѣчами, привелъ до такой степени, что бѣлогрыжный гной подобно струи вонъ истекашь началъ; а по томъ уже онъ сію болѣзнь лѣчилъ по правиламъ искусства. По умаленіи же онаго гноетеченія примѣшилъ онъ, что и болящее яичко въ самомъ дѣлѣ величиною умалилось; и для того онъ учинилъ новую прививку, и повторялъ дошолъ, поколѣ зараженное яичко содѣлалось столь мало, что съ другимъ здоровымъ совершенно въ величинѣ и мягкости сравнялось. Послѣ чего сей опытъ онымъ же врачомъ въ болѣзняхъ яичекъ весьма часто и всегда съ хорошимъ успѣхомъ былъ повторяемъ. Однакожъ прививка учиненная посредствомъ добраго бѣлогрыжнаго гноя рѣдко была удачна; ибо у премногихъ больныхъ отъ того бѣлая грыжа настоящая не воспослѣдовала, а у нѣкоторыхъ она оказалась шокмо мокротная, настоящую болѣзнь не искоряющая. А какъ

въ частной врачебной практикѣ бѣлогрыжная прилипчивая зараза не всегда обрѣщается: въ разсужденіи сего, по совѣту врача Ланге, малыя свѣчки числомъ 7 любоспρασнымъ ядомъ смазанныя, и сухою хлопчатую бумагою обверченныя, чрезъ 4 или 5 мѣсяцевъ всегда хранились въ банкѣ хорошо закупоренной. При всемъ же томъ изъ числа оныхъ свѣчъ только одна произвела прививочную бѣлую грыжу, которая однакожъ вспухшее и болящее яичко совершенно разбить не могла.

20. стран. 49. N. 3. Врачъ Цуберъ въ мертвомъ шрупѣ одного старика, жившаго прежде невоздержно, по разрѣзаніи мочевого пузыря, нашелъ въ ономъ великое ноздреватое шѣло, возродившееся изъ самой предстательной желѣзы, которое наполняло всю впадину онаго пузыря, выключая токмо дно онаго. Оно при своемъ началѣ было твердо, прочая же онаго часть мало по малу казалась мягчѣ, и ни къ одной сторонѣ мочевого пузыря не приросшала. А какъ отъ того жѣ шѣла шейка онаго пузыря расширена была, то отъ того происходило, что моча подъ онымъ шѣломъ безпрестанно вонъ истекала. Таковая затвердѣлость предстательной желѣзы, любоспрасною заразою непрерывно раздражаема будучи, купно со прочими сосудами и чувствственными жилами, въ вышеописанное ноздреватое шѣло превращи-

тилась. Зри Диссертацію о болѣзняхъ моче-
ваго пузыря. Спрасб. 1771.

21. — 53. N. 2). Таковое сѣченіе задня-
го прохода, надѣ нѣкоторымъ больнымъ съ
хорошимъ успѣхомъ произвелъ въ дѣйстви вр.
Брамбилла, какъ о семъ свидѣтельствуемъ
вр. Фонъ Свишенъ въ своихъ толкованіяхъ
Том. V. стран. 45. Вр. Шарпъ четыре раза
видѣлъ заднюю кишку столь сокращенную
около задняго прохода, что у одного изъ
таковыхъ больныхъ дупло оной кишки едва
могло въ себя вмѣщать сѣволъ гусинаго пе-
ра.

22. стран. 54. N. 1). Врачъ Деазъ до-
казываетъ многими примѣчаніями, что опухо-
ли и наращения любострастныя, около зад-
няго прохода случающіяся, и отъ позто-
реннаго слинотеченія, либо не совсѣмъ ис-
кореняются, либо не совершенно врачуются.
А Г. Пленкъ свидѣтельствуемъ о себѣ, что
онъ самъ премногихъ больныхъ, таковыми
опухольми страдавшихъ; обыкновенными сво-
ими средствами совершенно уврачевалъ чрезъ
3 или 4 недѣли. Однакожъ онъ сознаетъ и
то, что врачеваніе было безуспѣшно, когда
онъ вмѣсто щолочной воды, для таковыхъ
наращеній употреблялъ адской камень, зеле-
ной купоросъ, или сурьмовое масло. Вр. Гар-
дингеръ видѣлъ таковыя же наращения столь
зашвердѣлыя, что оныя никакими разбѣдаю-
щими лѣкарствами испребишь не возможно

было; но когда оныя посредствомъ луку, въ маслѣ развареннаго сперва были размягчены, а по томъ съ верху присыпаемы порошкомъ козацкаго можжевельника, то отъ того совершенно исчезали.

23. — 55. N. 3). Вр. Пленкѣ пишетъ, что онъ недавно видѣлъ въ больницѣ беременную женщину, у коей устье задней кишки обложено было наращеніемъ величиною съ дѣтскую головку, состоящимъ изъ пухлинъ въ длину продолжающихся болѣе чѣмъ на 6 дюймовъ, такъ что она больная отнюдь не имѣла испражненія низомъ, и отъ жестокой боли часто днемъ и ночью страдала судорогами и корчею; и для того на другой день по приходѣ ея въ больницу, оное наращеніе похожее на превеликую голову цвѣшной капусты, возлѣ самаго прохода ножницами отрѣзано было. Кровошеченіе при томъ было не велико: судорга послѣ сей операціи совершенно прекратилась, и болящая чрезъ внутреннее ртуши употребленіе вскоре выздоровѣла. Но спустя не много послѣ того, приключился ей кровавый поносъ, бывшій тогда въ осеннее время повальнымъ; и хотя она тогда жъ родила благополучно: однакожъ послѣ родовъ впала въ глубокій сонъ и скончалась.

24. — 57. N. 4). Вр. Соважъ во своей носологіи дѣлаетъ примѣчанія о томъ, что отъ употребленія отвара стебельковъ песьяго
грозда

грозда иногда скрытые паховики любострастные наружу оказывались. Том. II. стран. 549.

25. — 58. N. 2). Г. Пленкѣ, посредствомъ прижиганія, чрезъ 3 или 4 недѣли весьма удачно врачевалъ многіе паховики, коихъ онъ опіюмъ не могъ разогнать ни пластыремъ ни мазью рпушьными. Онъ утверждаетъ, что паховики, однимъ тѣкимъ камнемъ прижигаемы будучи, иногда чрезъ полчаса совершенно исчезали. Боль опію разѣдающаго лѣкарства была не велика: язва опію того никогда худая не случалась: и паховики мало по малу загноившись, совершенно исчезали. Но когда, по совѣту другихъ врачей, большая часть адскаго камня чрезъ 12 часовъ, или и того долѣе, къ паховику приложена будучи, на ономъ оставлена была, то опію того жестокая боль, воспаленіе и лихорадка больному приключались; иногда опію того паховикъ превращался въ аншоновъ огонь; а всего чаще случалась язва великая, во всѣ стороны кругомъ распространяющаяся, весьма трудно врачуемая, иногда въ язвеннаго рака премѣняющаяся; какъ то сей же врачъ многократно въ больницахъ, гніющимъ воздухомъ наполненныхъ, видѣлъ собственнымъ опытомъ.

26. стран. 78. N. 8). Г. Пленкѣ пишетъ, что у одного мушины, котерый у себя имѣлъ любострастнаго паховика чрезъ цѣ-

лая 17 лѣтъ сряду; напоследокъ оный вдругъ содѣлался величиною болѣе трехъ кулаковъ; въ прочемъ хотя былъ весьма пвердъ, неравенъ, и не причинялъ никакой боли, однакожъ болящаго погубилъ изсушеніемъ соковъ и оскудѣніемъ силъ плесныхъ. Вр. Пишшенъ видѣлъ, что любоспастный паховикъ внезапно превратился въ ноздреватаго, грибу подобнаго рака, величиною съ человеческую голову; отъ чего болящій, пришедъ въ оскудѣніе соковъ и силъ, бѣдственно погибъ. Зри дѣяніе практическихъ случаевъ о ядѣ. ч. VI. стр. 5.

27. — 62. Гл. II. Соважъ пишетъ, что у одного мушины, любоспастнымъ ядомъ зараженнаго, все чрево было чрезмѣрно вспухшее, и брюшный зажный шукъ былъ чрезмѣрно затвердѣвшій; но что по употребленіи ршутныхъ лѣкарствъ и послѣ вторичнаго смазыванія чрева неаполитанскою мазью, вся швердосъ и опухоль чрева совершенно исчезла. Носологіи томъ. II. стран. 490.

28. — 65. Н 3. Г. Пленкъ пишетъ, что онъ недавно уврачевалъ многіе лишаи приключившіеся одной женщиѣ на груди, рукахъ и ногахъ, посредствомъ смыванія оныхъ ршутнымъ составомъ. Вр. Фаберъ и Шмуккеръ предлагающъ многіе примѣры лишаевъ причиненныхъ скрытною любоспастною заразою. Зри лѣкарскія письма I. 106.

29. — 66. N. 2. Вр. Кеглеръ видѣлъ въ больницѣ учрежденной въ Неаполѣ для лѣченія младенцевъ, головными спрупьями зараженныхъ, что въ оной находилось дѣтей числомъ 400; изъ котораго числа было 283 шаковыхъ, кои произошли отъ родилелей, любоспρασтною болѣзнію зараженныхъ, и въ той же самой больницѣ пользовавшихся. Врачъ Розенштейнъ утверждаетъ, что головныя спрупья, кои посредствомъ гребешковъ, шляпъ, или колпаковъ отъ одного больного другому сообщаются, суть любоспрастнаго свойства; ибо онъ внутреннимъ и внѣшнимъ употребленіемъ ршутной водки Фон-Свишеновой врачевалъ жестокія головныя парши. зри руководство къ познанію и врачеванію дѣтскихъ болѣзней стр. 662. Г. Пленкъ счастливо лѣчилъ многихъ больныхъ и взрослыхъ, спрупья головныя имѣвшихъ, внутреннимъ камединой ршуты употребленіемъ, присоединяя къ шомужъ и омовеніе главы посредствомъ водянаго ршутнаго раствора, а иногда и безъ онаго.

30 — 67. N. 3. Бернардинъ Томитанусъ писатель жившій почти около ста лѣтъ по открытіи любоспрастной болѣзни, говоритъ тако: протекшихъ вѣковъ люди видѣли, что у многихъ всѣ зубы вонъ выпадали; а нынѣ рѣдко сіе видимъ; на противъ того весьма часто примѣчаемъ, что у многихъ власы, брови и брада низпадаютъ. Антонъ

Муза Брассаволь примѣчаетъ, что у нѣкоторыхъ людей ногти, власы и зубы отъ любострастной болѣзни падали. зри фонъ Свишена толкован. том. V. стран. 406.

31. стран. 68. N. 1. Вр. Раймондъ предлагашъ слѣдующее примѣчаніе: жена 50 лѣтъ имѣла очи чрезмѣрно вспухшія и покраснѣвшія, слабое зрѣніе, около очей не было ни рѣсницъ, ни бровей, ноздри у ней были зіяющія, вонючую мокроту испускающія, чело сморщенное, вся голова плѣшивая, нижнія ушныя части чрезмѣрно толстыя, вся кожа на шѣлѣ была обнаженная отъ власовъ, лоснящаяся, толстая, жеская, шероховатая, во многихъ мѣстахъ зашвердѣвшая, зудъ по всему шѣлу равномерный, тяжелое дыханіе, духъ изо рта исходящій вонючій, тягость въ головѣ, и тупый слухъ. Мужъ же ея былъ зараженъ любострастною болѣзнію, которая и была причиною описанной болѣзни его жены. И такъ когда оной больной предписаны были ршущныя лѣкарства, то по употребленіи оныхъ чрезъ цѣлыя два мѣсяца, больная совершенно выздоровѣла, кожа у ней здѣлалась гладкая и мягкая, волосы на головѣ выросли, зрѣніе и слухъ получили прежнюю свою силу и дѣйствіе. Видъ проказы въ флорентинской больницѣ с. Евсевія, внѣшнимъ употребленіемъ сулемы врачеванный, кажется бытъ любострастнаго свойства. Зри сочиненіе о болѣзняхъ опасныхъ стран. 357.

32. — Н. 2. Врачъ Шиллингъ говоритъ въ книгѣ о проказѣ снран. 39. и 40. что ничто столь часно не случается, какъ сопряженіе прокаженного и любострастнаго яда вмѣстѣ; ибо больные, проказою зараженные, какъ въ началѣ, такъ и въ продолженіи болѣзни, чуднымъ образомъ возбуждаются къ частому соитію; и по тому безпрерывно раздражаемы и поощряемы будучи, весьма часно совокупляются; и тако какъ сами сообщаютъ прокаженной ядъ другимъ, такъ и отъ другихъ заимообразно любострастнымъ ядомъ заражаются. Болѣзненные же припадки сихъ обѣихъ заразъ суть найпаче язвы ракомъ пораженные, на дѣтородныхъ частяхъ случающіяся, кои сопротивляются дѣйствию всякаго рода лѣкарствъ. Въ такомъ случаѣ сей врачъ испытывалъ употребленіе ртуты; но всегда видѣлъ худыя отъ того слѣдствія, и происшедшіе болѣзненные припадки; и изъ многихъ опытовъ узналъ напоследокъ, что ртуть ко искорененію прокаженного яда есть вовсе неспособна: что проказа отъ употребленія ртуты еще болѣе ожесточается, и по большей части причиняетъ весьма гнѣвчѣй кровавый поносъ. Нѣкоторые писатели думаютъ также и то, что проказа древнихъ была не что иное, какъ настоящая любострастная болѣзнь, или что сія послѣдняя возмѣла свое начало отъ соитія мужины

щины съ прокаженною женою. Однакожъ надлежитъ вѣдать, что настоящая проказа не заражаетъ дѣтородныхъ частей, ринутъю не лечуется, и давно уже, еще прежде познанія любострастной болѣзни, врачамъ была уже извѣстна.

33. стран. 71. N. 3). Ланжъ въ кн: о окоболѣннѣ стр. 75. предлагаетъ слѣдующую повѣсть: одинъ мясникъ, бѣлою грыжею спрадавшій, за однимъ разомъ выпилъ нѣсколько унцовъ терпеншиннаго масла, въ надеждѣ, чѣмъ тѣмъ скорѣе ему освободиться отъ сей его болѣзни. Послѣ такого пріема въ самомъ дѣлѣ скоропостижно она прекратилась; но оба глаза у него вдругъ поражены были: прежестокимъ воспаленіемъ, чего ради врачъ хотѣлъ было, посредствомъ свѣчи смазанной бѣлогрыжнымъ гноемъ, привить ему бѣлую грыжу; однакожъ больной отъ того отрекся, сказуя, что онъ легчайшимъ способомъ снова произведетъ оную. И такъ посѣпивъ вторично ту же женщину, онъ коей онъ досталъ прежнюю болѣзнь, на другой день самимъ дѣломъ почувствовалъ въ себѣ преизобильное теченіе гнойнаго вещества, вскорѣ воспаленіе сечей умалилось, и однимъ внутреннимъ камединой ртутіи употребленіемъ, чрезъ 6. недѣль совершенно отъ обѣихъ оныхъ болѣзней выздоровѣлъ.

34. — 74. N. 2. Вр. Фонъ Свищенъ, однимъ токмо внутреннимъ употребленіемъ сулемы,

демы, совершенно излѣчилъ пяшно роговой очной оболочки.

35. — 77. N. 1). Вр. Розенштейнъ въ кн. о дѣтск. бол. стран. 643. Фабръ о любостр. бол. 1. 12. и Пешитъ, совершенно у-врачевали свищъ бывшій въ обоихъ слезныхъ мѣшечкахъ, и язву въ нѣбѣ, отъ скрышной любострастной болѣзни происшедшій, посредствомъ ртутнаго натиранія.

36. — 78. N. 2. Г. Пленкъ пишетъ, что онъ видѣлъ бѣльмо, одному воину приключившееся отъ бѣлой грыжи, совершенно испребленное употребленіемъ камединой ртути; а Соважъ утверждаетъ, что бѣльмо отъ любострастной заразы происшедшее иногда отвращается водкою, въ коей сулема растворена. Но иногда оба сѣи средства не имѣютъ желаемого успѣха.

37. — 79. N. 1. Вр. Цакутъ пишетъ, что онъ видѣлъ любострастную слѣпопу, вскорѣ послѣ нечистаго соишья приключившуюся, и сопряженную съ язвами, пупырышками и болячками по всему лицу. Врачебн. практ. сошн. V. Примѣч. 49.

38. — N. 2. Вр. Бургавъ, Гейстеръ, Боннетъ и Смитъ пишутъ о любострастной слѣпотѣ, уврачеванной посредствомъ слинотеченія. Зри Шмуккера лѣкарск. письма. ч. II. 24.

39. — 80. N. 3. Г. Пленкъ употребленіемъ камединой ртути уврачевалъ многихъ глухихъ, отъ прекращенія бѣлой гры-

жи слуха лишившихся. Вр. Тринка въ кн. о глухотѣ собралъ многія примѣчанія опомѣ, что любострастная глухоша ршутью ош-вращается.

40. — 82. N. 2. Вр. Тоде въ лѣкарск. вивліоѳекѣ приводитъ случай такой: одинъ юноша имѣвшій бѣлую грыжу или шанкрѣ, случайно и чрезъ весьма малое время принужденъ былъ употребить свой карманной платокъ, прикрывъ онымъ свой болящей удѣ, жалѣя чшобѣ незамарать чистой своей рубашки; по томъ получа другое полощенце для перемѣны, позабывши немедленно положить томъ же свой платокъ въ карманъ, и употреблялъ его по томъ при сморканіи носа; ошѣ чего вскорѣ та жѣ самая болѣзнь оказалась и въ самомъ носу, которая существовала въ дѣшородныхъ его частяхъ; по чему онъ и назвалъ ее шанкромъ носовымъ.

41. — 85. N. 2. Вр. Северинъ въ кн. о скрытномъ свойствѣ нарывовъ, Неапол. 1763, представилъ изображеніе всего лица страннымъ образомъ обезображенного закоренѣлою любострастною болѣзнію. Г. Пленкѣ видѣлъ одну деревенскую женщину, у которой весь носъ совершенно исчезлъ ошѣ засшарѣлой любострастной болѣзни, а вмѣсто онаго было токмо маленькое возвышеніе, величиною едва съ горошинку, съ малымъ такой же величины отверстіемъ; уста же и губы у нее были чрезмѣрно сожаты, и почти срослися такъ,

такъ, что едва можно было запустить въ ротъ послѣдній составъ перста мизинца.

42. — 90. N. 2. Вр. Гавеманъ думаетъ, что оскудѣнiе добрыхъ соковъ, выйными зобами причиненное, весьма часто происходитъ отъ перемѣнившагося или переродившагося любострастнаго яда. Зри соч. о любостр. многообразн. болѣзн. стр. 55.

43. — 92. N. 3. Г. Пленкъ пишетъ, что онъ многихъ больныхъ страдавшихъ долговременными горшанными язвами, чрезъ нѣскольго недѣль совершенно уврачевалъ, смазывая язвенныя мѣста перушкомъ обмоченнымъ въ ршутъную маспихинную эссенцію; и что оныя больные отъ долговременнаго употребленія камединой ршуты, сулемы, мореной ршуты, онъ напирания ршутью, и отъ слинотеченія отнюдѣ не получали никакой пользы.

44. N. 4). Вр. Меца и Стракъ пишутъ, что испорченное и невозможное глошаніе, съ насшоящими признаками, отъ скрышной любострастной болѣзни приключившееся, ршутью совершенно уврачевано было. Зри примѣч. о болѣзи. съ пяши. стр. 233. Вр. Дунканъ видѣлъ испорченное глошаніе послѣдовавшее по излѣченіи любострастныхъ горшанныхъ язвъ. Зри врачебн. Случ. Стр. 176.

45. — 93. N. 5. Вр. Русселъ весьма похвалаетъ корку волчьяго перца въ любострастной костной боли и опухоли. Онъ доказываетъ 16 примѣрами практическими, что
кос-

костныя опухоли бывшія величиною съ ту-
рецкой орѣхъ, часпо въ теченіи одного мѣ-
сяца сею единою коркою были разбины и
разогнаны: однакожъ оная въ костныхъ на-
ращеніяхъ мало принесла пользы. При чемъ
онъ же описываетъ два случая такія, гдѣ
была настоящая костредица, которая бла-
гополучно отвращена тѣмъ, когда послѣ при-
ложеннаго адскаго камня бляшки гнѣющей кос-
ти отдѣлились, и по томъ уже оная упо-
требляема была. Зри врач. примѣч. том.
3. стр. 189. Вр. Рацуксъ похваляетъ взваръ
сшебельковъ песьяго грозда для лѣченія про-
стыхъ опухолей. Зри журналъ врачебн. Т.
22. стр. 236.

46. — 95. N. 2. Вр. Морганъ видѣлъ спа-
рушку, у коей лѣвая зашылочная кость и
ближайшая къ ней часпъ лбинной кости отъ
любострастной болѣзни столько разѣдена
была, что мозгъ на три дюйма въ попереч-
никъ, чрезъ сквозное отверстіе былъ виденъ
такъ, что можно было, при испытаніи бѣс-
нѣя боевой ручной жилы, явственно очами
видѣть, что и самый мозгъ въ одно и то жъ
самое время купно съ оною боевою жилою попе-
ремѣнно то поднимался въ верхъ, то опу-
скался внизъ; мозговая же внѣшняя оболочка
была лоснящаяся и чистая. Зри причин. бо-
лѣзни кн. IV. послан. 58. Вр. Либавій ви-
дѣлъ, что у одной любострастной женщи-
ны вся правая височная кость, половина бли-
жай-

жайшей шѣмной кости, и мозгъ даже до самыхъ пусырей, гнилью были испорчены а напослѣдокъ страждущая, бывъ поражена смертельнымъ сномъ, бѣдственно погибла. Вр. Трѣосень и Сталпаршъ фонъ Дервилъ приводящъ примѣры, что у одной любострастной женщины отломокъ лбинной кости величиною въ нѣсколько дюймовъ, отъ средняго черепнаго шука отдѣлился, чрезъ употребленіе ртутныхъ лѣкарствъ, и отъ того послѣдовала язва гнѣсная, весьма вонючую сукровицу испочающая. Зри врачебн. примѣч. сошн. 1.

47. — 95. N. 2). въ Анатомическихъ театрахъ можно видѣть разныя кости человѣческія, разнымъ образомъ испорченныя. Напр. весь головной черепъ и всѣ личныя кости, костеѣдицею такъ разбѣдены, что подобно решету, многочисленными сквозными дирами, власно какъ буравомъ проколоты быть кажутся. Вся связь костей таза даже у младолѣтнихъ дѣтей, найдена дирава и гнилью разбѣдена, подобно дереву гнилому и червями расточенному. Всѣ кости въ шѣлахъ человѣческихъ найдены совершенно диравыя и гнилью пораженныя сполько, что опіюдь не лзя было оныхъ соединить вмѣсто. Всѣ таковыя гнили и костеѣдицы причиняются любострастною заразою закоренѣлою, приобрѣтенною, или наслѣдственной. Врачъ Нуккѣусъ на одномъ изъ шаковыхъ костяковъ положилъ надпись слѣ-

дующую: *Amor intimis inheret medullis.* т. е. Любовь впечатлѣвается самимъ нѣдрамъ и мозгамъ. Желаящiе въ семъ болѣе удостовѣриться, могутъ читать сочиненiя врачей, а особливо Кнолла, Гофмана, Олишша, Шезелдена, Моргана, Нуккiя и проч.

48. — 99. N. 4. Испорiи о косиыхъ, любоспразтною заразою размягченныхъ, и ошъшого преломившихся, описаны во врачебныхъ Аглинскихъ примѣчанiяхъ. Лонд. кн. IV. стр. 216.

49. — N. 5. Врачъ Рейхель описываетъ костеѣдицу бедровой коси, которая сама собою переломилась. Зри примѣч. врач. кн. III. 7. IV. стр. 580.

50. — 100. N. 4. Г. Пленкъ описываетъ случай такой: одинъ больной имѣлъ опухоль въ лѣвомъ яичкѣ безболѣзненной, болѣе года ошъ прекращенiя бѣлой грыжи ему приключившуюся; ошъ чего онъ часпо мучился ячменцемъ, на очныхъ вѣкахъ у него нараспавшимъ, и опухольми членовными, а особливо на внѣшней части лѣваго, и на внутренней сторонѣ праваго колѣна бывшими, кои ему причиняли жестокую боль, а при томъ рѣбли и краснѣли. По употребленiи камединой ршущи, бѣлая грыжа прежде того прекратившаяся, снова ошрыгнулась, пухлина яичка и всѣ прочiя костныя опухоли чрезъ 6 недѣль совершенно исчезли.

51. — 116. N. 3. Вр. Стеркѣ примѣшилъ воздушно-водяную болѣзнь матки у двухъ женъ. Зри годъ врачебн. II. стр. 204. Онъ пишепѣ, что обѣ оныя женщины чрезъ многіе годы сряду страдали жестокою любовспасною бѣзвѣю, такъ что истекающая влага была совершенно гнойная, весьма вонючая и споль осирая и ѣдкая, что отъ оной весь рукавъ матки и виѣшнія дѣтородныя части совершенно разѣдены и испорчены были. Моча всегда истекала съ превеликимъ трудомъ. Напослѣдокъ по употребленіи многихъ лѣкарствъ, у одной изъ нихъ печеніе бѣли совершенно прекратилось, и язвы на дѣтородныхъ частяхъ бывшія зажили; а у другой бѣль умалилась, и меньше прежняго ее обезпокоивала. Однакожъ обѣ онѣ послѣ того въ себѣ чувствовали безпрестанной жаръ съ болью въ нижней чрева части, иногда великую тоскливость, позывъ власно какъ бы къ испражненію низомъ, и боль въ брюхѣ къ рукаву матки и къ пахамъ простирающуюся. За симъ часто слѣдовали легкіе омраки, такъже частые и вонючіе вѣпры съ прескомъ и великою силою изъ матки переднимъ проходомъ вонъ исходящіе; а за оными вскорѣ мокрошы гнойныя, съ волокнами смѣшанныя, подобно огню жигучія, и весьма ѣдкая вонъ истекали. По и сіе печеніе мокрошъ вскорѣ прекратилось. Но протесшвыи 1, 2, или 3 дня снова шѣжѣ

припадки возвращались, вѣтры исходили, тнойныя и вонючія мокропы испекали, и власно какъбы нѣкоею силою вонь изгоняемы были. Все же сіе чрезъ нѣсколько недѣль сряду продолжалось. Тогда опухоль весьма твердая, упругая и полукруглая въ нижней чрева части оказываться начинала; но по исходѣ вѣтровъ и испеченіи мокротъ чрезъ рукавъ машки, всегда оная умялась и становилась мягчѣ. Величина сея опухоли мало по малу прибавлялась, и чѣмъ больше оная становилась, тѣмъ меньше было вѣтровъ, кои на послѣдокъ и совсѣмъ прекращались, и тогда уже оная опухоль получила скоропостижное и явственное приращеніе. Обѣ же тѣ больныя имѣли непрерывную лихорадку, и около вечера всегда у нихъ дѣлались великій и частый ознобъ и потягоша, за коими сильный жаръ и неутолимая жажда слѣдовали; отъ чего безпокойный сонъ, брѣдъ, судорга и корча сухихъ жилъ приключались. На послѣдокъ по долговременномъ изсушеніи тѣла, обѣ оныя женщины бѣдственно погибли. До смерти же ихъ въ обѣихъ припадки были совершенно одинакія. Испражненіе низомъ всегда было свободное: но моча всегда истекала съ трудомъ, была вонючая, а иногда и совершенный былъ мочи запоръ.

Въ трупъ первой больной, у коей бѣль прекратилась отъ употребленія лѣкарствъ,
по

по вскрытіи мершваго шѣла, найдена матка твердая, упругая, величиною съ человѣческую голову. Какъ скоро матка ножичкомъ прорѣзана была, то изъ ея дупла весьма вонючій воздухъ съ великою силою вонъ выскочилъ, въ самой же ея впадинѣ найдена гнойная и весьма вонючая мокрота. Все вещество матки было тонкое, плѣнчатое; а вся внутренняя ея поверхность язвами покрыта и антоновымъ огнемъ поражена была. Внѣшнее рыльце матки было совершенно затвердѣвшее и сросшееся, а внутреннее гнилью разѣденое. А въ рукавѣ матки найдены разныя наращенія ноздреватыя, съ многими знаками, послѣ зажилыхъ язвъ оставшимися.

Въ трупѣ другой больной найдена матка вспухшая, власно какъ надутая, упругая, величиною гораздо меньше противъ первой; а во впадинѣ ея такая же гнойная мокрота, съ великимъ количествомъ весьма вонючаго воздуха. Вся внутренняя ея поверхность была покрыта гнѣющими и гнусными язвами, и отъ гнили разѣдена. Рыльце матки не было сросшееся, но токмо завалено скипѣвшеюся и затвердѣвшею кровію, а при томъ и отъ гнили попорчено. Весь рукавъ матки и внѣшнія дѣтородныя части язвами покрыты были.

52. — 120. N. 3. Вр. Соважъ носол. том. II. стр. 540. пишетъ, что у одной любострастной

женщины была опухоль сосцовъ съ язвами, величиною больше дѣтской головки, кошорая чрезъ употребленіе ртутіи вскорѣ содѣлалась менѣ кулака; но какъ оную лѣкарствами отвратить не возможно было, того ради по необходимости весь оставшій ракъ былъ искусствомъ вырѣзанъ и опиятъ. Онъ же видѣлъ у любострастной дѣвицы двѣ опухоли въ сосцѣ, величиною съ куриное яйцо, сопряженные съ жестокою болью и опухолью бывшею въ подкрылочныхъ желѣзахъ, и съ язвами во рту. Всѣ же оныя припадки исчезли отъ употребленія сулемы въ водкѣ растворенной. Вр. Бирхенъ въ книг. о ракѣ, утверждаетъ, что всякія затвердѣлости зобныя причиняются любострастнымъ ядомъ: что ракъ зобный и любострастный есть одного и того же свойства: и что онъ врачуется ртутью, коей прочіе виды рака сопротавляются.

53. — N. 4. В. Фогель пишетъ, что онъ видѣлъ на сосцахъ нѣздреватое, взваромъ сарсанарели уврачеванное. Зри лѣкарск. опытовъ сборъ 1. отдѣл. 26.

54. — 121. N. 5. Вр. Биргенъ подтверждаетъ, что онъ однимъ употребленіемъ ртутной водки, сложенной изъ 4-гранъ сулемы и одного унца хлѣбнаго спирта, совершенно уврачевалъ многіе виды рака, аншоновымъ огнемъ пораженнаго. Онъ думаетъ, что тошъ ракъ, который номою назывался, и
слу-

случается у дѣтей на губахъ, есть любострастнаго свойства, и слѣдственно ртутью водкою оной лѣчить можно. Таковыя виды рака, на мошонкѣ и виѣшнихъ дѣпородныхъ женскихъ частяхъ случающіеся, тѣмъ же самымъ средствомъ совершенно уврачеваны были. Зри сочин. его о признакахъ рака. Спр. 82, 84, 120.

55. — 125. N. 4. Вр. Столлъ пишетъ, что отъ употребленія ртуши, нечислоты въ желудкѣ умножаются, или производятъ наныщеніе и опухоль живота. Зри способъ врачев. бол. ч. II. стр. 266.

56. — гл. V. N. 2. Монро вычисляетъ примѣры лихорадки четверодневной, причиненной любострастною болѣзнію. Тщешно отъ оной предписаны были лѣкарства противулихорадочныя; ибо она лихорадка отъ таковыхъ лѣкарствъ еще болѣе усиливалась; по тому что будучи любострастною, сопротивлялась всѣмъ онымъ средствамъ; но какъ скоро мореная ртуть употреблена была даже до произведенія слинопеченія, тогда она лихорадка совершенно прекратилась. Подобныя сему примѣры представляются и отъ врачей Валлоніуса и Деидіера.

57. — 126. N. 4. Когда перемежающаяся лихорадка не происходитъ отъ любострастной заразы; но есть токмо случайнымъ ея припадкомъ: тогда надлежитъ соединять вмѣстѣ и лѣкарство противулихорадочное и про-

тивуюлюбострастное, съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы объ болѣзни вдругъ отвращены были. Г. Пленкъ утверждаетъ, что онъ отъ такового сопряженія лѣкарствъ видѣлъ весьма счастливые успѣхи. Зри сочинен. Врач. Верлгофа и Тедена.

58. — 127. N. 3. Вр. Риверѣй пишетъ, что когда одному больному отняли руку, и рана зажила, то вдругъ послѣдовала жестокая повсюду судорга; чего ради отняли и оставшую часть руки: но тщетно. Врачи подозрѣвая, не сокрывается ли любострастная зараза въ самой крови, оставшись въ ней отъ прекращенія когданіеспъ бывшей бѣлой грыжи; и для того предписали болящему ршутъныя лѣкарства, коими произведенное слинопеченіе, совершенно прекратило бывшую судоргу. Впрочемъ поелику ршутью врачуется и повсюдная судорга раждающаяся отъ разныхъ причинъ; то по мнѣнію Г. Пленка, и не лзя дословѣрно утвердить, въ самомъ ли дѣлѣ описанная судорга имѣла свое начало отъ любострастной болѣзни?

59. — 127. N. 3. Вр. Розенштейнъ и Блокъ видѣли 6 лѣтняго отрока страдавшаго почти чрезъ три года сряду припадками падучей болѣзни, въ неизвѣстное время случающимися, также головными струпьями и гнилью внутрикостною въ хребетныхъ ручныхъ и ножныхъ костяхъ бывшею; который больной, камединою и мореною ршутью съ

ду-

дурнымъ духомъ смѣшенною и внутренно употребляемою, чрезъ 7 мѣсяцевъ безъ произведенія слиношеченія совершенно выздоровѣлъ. Язвы внутрькостныя зажили посредствомъ бальсамическаго ршутнаго раствора и неаполитанской мази. Въ теченіи же онаго времени чрезъ день сиживалъ онъ въ тепловатой цѣлищельной ваннѣ или купѣли.

60. — 128. N. 2. Вр. Соважъ видѣлъ 40 лѣтъ мушину страдавшаго чрезъ многіе годы сряду язвами дѣшородныхъ часшей, который еще сверхъ того послѣ бѣлой грыжи, безрассуднымъ образомъ прекращенной, былъ пораженъ несовершеннымъ параличемъ нижнихъ удовъ, такъ что едва онъ на ногахъ стоять могъ. По совѣту лѣкаря онъ сѣлъ по поясъ въ ванну теплую, съ свинцовыми бѣлилами смѣшенную; отъ чего въ немъ совершенное нижнихъ часшей расслабленіе воспослѣдовало. Тщешно сулема и прочіе ршутныя составы чрезъ цѣлые два мѣсяца употребляемы были. А Г. Пленкъ видѣлъ 53 лѣтъ старика, любострастными костными опухолями страдавшаго, который отъ употребленія теплыхъ Бадскихъ водъ, въ Австріи, пораженъ былъ параличемъ цѣлой половины тѣла: однакожъ посредствомъ отвара стебельковъ песьяго грозда и камединой ршуты снова отъ оной болѣзни выздоровѣлъ.

61. — 129. Гл. III. N. 3. Левелингъ описываетъ головной черепъ воина, страдавшаго

нѣкогда любострастною болѣзнію, который по томъ получилъ падучую болѣзнь, и на послѣдокъ отъ апоплексіи умеръ.

62. — 131. N. 2. Многія болѣзни наиболѣе ночью ожесточаются и усиливаются, какъ то лихорадки, боли, цынготныя немочи и проч. но всѣ таковыя недуги особливими своими признаками легко распознаются отъ любострастныхъ болѣзней. Въ прочемъ извѣстно и то, что и послѣднія иногда ночью отнюдѣ не ожесточаются. Зри сочинен. врач. Триллера, Сполла и Пленка.

63. — 135. Гл. VII. N. 2. Г. Пленкъ видѣлъ 2 полководцовъ, кои оба отъ паховика, ртутными лѣкарствами разогнаннаго, хромали на одну ногу и страдали шіагрою, или болью въ сѣдалиной кости чувствуемую. Одинъ изъ нихъ чрезъ три мѣсяца сряду оными припадками страдавшій, почти чрезъ мѣсяцъ совершенно вылѣчился камединою ртутью и проносными лѣкарствами; а другіе страдавшій жестокою болью, въ сѣдалиной кости, около 18 мѣсяцевъ продолжавшаяся, на послѣдокъ получилъ желчную лихорадку, которая сперва причинила то, что болѣзненное вещество засѣло около болящаго мѣста; по томъ въ членосоединеніи возгноеніе, а за тѣмъ костьеѣдица и смерть послѣдовали. Таковая хромоногая ходьба отъ сокращенія ли мышечныхъ волоконъ, или отъ другихъ причинъ зависитъ? дальшему впредъ изслѣдованію предвсѣщается. 64.

64. — 136. N. 3. Багавей пишетъ, что онъ долго лечилъ больного спирадавшаго шлагрою, и по шцетномъ употребленіи самыхъ лучшихъ лѣкарствъ, болящій былъ безнадеженъ; но когда онъ случайно о себѣ объявилъ, что онъ за 20 лѣтъ предъ тѣмъ имѣлъ у себя любострастные паховики, и что оныя худо лечимы были: то шѣмъ и подалъ подозрѣніе думать о себѣ, что и въ самомъ дѣлѣ онъ былъ подверженъ заразительной болѣзни. Чего ради какъ скоро началъ употреблять взваръ сарсапарели, сурьму и прочія ршущныя лѣкарства, то въ короткое время онъ своей болѣзни совершенно выздоровѣлъ.

65. — 146. N. 4. Поелику ршущъ гонитъ мѣсячную кровь, а слинопеченіе истощая соки у матери, и употребнаго плода лишаетъ пищи; въ разсужденіи сего многихъ врачей есть мнѣніе такое, чтобъ врачеваніе любострастной болѣзни всегда откладывать до того времени, когда роды окончатся, дабы ршущъ не причинила выкидываніе или недоношеніе. Однакожъ поелику любострастный ядъ ежедневно болѣе и болѣе заражаетъ и мать и дитя; а что случается, что и безъ употребленія ршущи употребный плодъ гнилью пораженный причиняетъ выкидываніе; въ разсужденіи сего мнѣніе г. Пленка есть сіе, чтобъ беременнымъ женамъ давать камединую ршущъ, и опытами подтверждаетъ, что сей

сей пріятный ртутный составъ счастливо врачуеѣ любовстрастную болѣзнь беременныхъ, отнюдѣ не причиняя выкидыванія; и что произведеніе слинотеченія и острыя ртутныя лѣкарства, во время беременности не безопасно употребляемы быѣь могутѣь.

66. — 148. N. 4. Вѣ Парижѣ есѣь нарочито учрежденный домѣь, откуда кормилицы, матерямѣь, дѣтей своихъ воспышываѣь нехотѣющимѣь, посылающѣься. Весьма прилѣжное отѣь врачей сего дома прилагаетѣься стараніе о томѣь, чтобѣь ни кормилицы любовстрастныя, ни младенцы зараженные вѣь оной домѣь принимаемы не были. Однакожѣь случилось однажды, что дѣтя любовстрастнымѣь ядомѣь зараженное ввѣрено было здоровой кормилицѣь, отѣь чего какѣь та самая кормилица, такѣь и другое дѣтя совершенно здоровое, отѣь того вскорѣь заразились. Зри Гардана опис. Учрежд. Дома о кормилицахѣь вѣь Парижѣь. 1775. стран. 16.

67. — 150. N. 7. Вр. Пленкѣь ушверждаетѣь, что онѣь многимѣь беременнымѣь жѣьнамѣь, любовстрастною болѣзнію зараженнымѣь, во время ихѣь беременности, давалѣь камединую рѣтуѣь и видѣьлѣь дѣтей отѣь нихѣь рожденныхъ совершенно здоровыхъ. Однакожѣь пишетѣь и сѣь, что однажды видѣьлѣь онѣь новорожденного младенца отѣь матери употреблявшей много рѣтуѣь, во время своей беременности, у коего передняя частѣь выи
была

была такъ вспухшая, что величиною равнялась съ дѣтскою головкою, и который вскорѣ послѣ родовъ умеръ. Ршуть ли, будучи безсильна произведши въ зародѣ слинопеченіе, причинила оную опухоль? Нѣкоторые однакожъ сомнѣваются, чтобы ршуть данная беременной могла проникнуть даже въ самого зарода. Но вр. Левреншъ примѣтилъ, что воды содержимыя въ младенческихъ оболочкахъ, у тѣхъ беременныхъ женъ, которыя въ продолженіи ихъ беременности, ршутью напирали тѣло, были песочнаго или свинцоваго цвѣта: что онѣ на красной мѣди производили бѣлой цвѣтъ: и что первородный калъ дѣтскій былъ свинцоваго цвѣта. Отсюду явствуетъ, что ршуть отъ беременной матери преселяется даже въ самыя нѣдра утробнаго плода.

68. — 151. N. 2. Вр. Гулардъ сочинен. лѣкарск. ш. II. стр. 19. описываетъ женщину имѣвшую на разныхъ частяхъ тѣла сыпь съ пупырышками, прыщами и язвами. Мужъ ея за 15 лѣтъ предъ тѣмъ имѣлъ любострастные паховики и язвы на дѣтородныхъ частяхъ. Оная женщина посредствомъ употребленія ршутьныхъ лѣкарствъ одиножды отъ ея болѣзни совершенно исцѣлена была. По томъ снова отъ своегожъ мужа заразившись напоследокъ умерла отъ своей болѣзни. По смерти же ея, мужъ жилъ еще 25 лѣтъ, отнюдь не чувствуя въ себѣ никакихъ болѣз-

нен-

ненныхъ припадковъ. Вр. Прессавенъ въ сочин. о любостр. бол. Женев. 1773. стр. 22. описываетъ также женщину зараженную любострастною болѣзнію: утверждаетъ, что мужъ оной жены вовсе не былъ причастенъ той болѣзни: и примѣрами доказываетъ, что мужчины здоровые, сообщаясь съ зараженными женами, могутъ быть свободны отъ сея заразы. Однакожъ таковое мнѣніе требуетъ дальшаго подтвержденія.

69. — Н. З. Г. Пленкъ видѣлъ благородную дѣвицу, любострастною кормилицею воспитанную, у которой на 13 году, когда надлежало быть у нее впервые мѣсячному кровотеченію, внезапно вмѣсто того послѣдовало сильное печеніе бѣли преосрой и весьма бѣдкой, съ открывшимися головными язвами; что все посредствомъ ршутныхъ лѣкарствъ благополучно отвращено было. При чемъ онъ же утверждаетъ, что какъ зараза отъ воспы, кори и уязвленія бѣшеной скотины: такъ равно и любострастный ядъ могутъ долго-временно въ тѣлѣ сокрываться, поколѣ явно открояются. Вр. Розенштейнъ подтверждаетъ то же многими наблюденіями и слѣдующими примѣрами: 1) двулѣтняя дѣвушка заразившись отъ своей няньки, которая ее кормила ницею, сперва во своихъ устахъ разжеванною, не прежде, какъ по прошествіи 9 лѣтъ послѣ того въ себѣ почувствовала припадки отъ заразы происходящіе. 2) два младенца род-

ные

ные братья отъ кормилицы заразившись, не прежде въ себѣ почувствовали оную заразу, какъ достигши уже 30 лѣтъ. 3) отрокъ наслаждался совершеннымъ здоровьемъ даже до 11 году своего возраста, по томъ когда ему въ сіе время привили возну, впрочемъ весьма благополучную, тогда съ нею купно въ немъ оказались и знаки любострастной болѣзни; ибо онъ прежде въ своемъ младенчествѣ заразился отъ своей матери, которая въ самомъ дѣлѣ нѣкогда спралада (Французскою болѣзнію. Фонъ Свишена толкован. т. V. стр. 385.

70. — 153. N. 1). Ожесточеніе болѣзней въ ночное время не во всѣхъ любострастныхъ недугахъ случается, по примѣчаніямъ вр. Пленка и Блокса.

71. — 154. N. 1). Вр. Гренгеръ примѣшилъ, что употребленіе ртутіи есть вредно цынготическѣ. Онъ видѣлъ, что отъ одного золотника ртутной мази, коею тѣло одного салдана, любострастною и цынготною болѣзнями спраладаваго, смазано было; слинотеченіе кровавое, опухоль десенъ, боль зубовъ, весьма вонючая харкотина, обмороки и великая слабость приключились. Вр. Крамеръ утверждаетъ, что 400 салдавъ цынготныхъ отъ употребленія ртутіи бѣдственно погибли. Вр. Гулардъ примѣшилъ, что два цынготные салданы, будучи положены въ той же палатѣ, гдѣ лежали любостра-

страстные больные, ртутью лѣчимые, отъ воздуха, испареніемъ слиноточащихъ зараженнаго, получили опухоль головы, сильное слинопеченіе, и весьма худыя язвы во рту. Вр. Гемпель испыталъ, что ртутьныя напиранія чинимыя цынгошнымъ, или цынгою вмѣстѣ и любострастною болѣзнями зараженнымъ, произвели смертельныя приключенія; ибо отъ ртути ланины аншоновымъ огнемъ поражены были, и скорая смерть послѣдовала. Вр. Михаелисъ опытомъ подшверждаетъ, что многіе цынгошно - любострастные, отъ обѣихъ сихъ болѣзней получили совершенное исцѣленіе, посредствомъ соннаго зѣлья, лѣкарственной корки и купороснаго масла.

72. 159. N. 7. 1). 2.) Работники въ рудокопныхъ ртутьныхъ заводахъ шрудящіеся весьма скоро отъ ртути получаютъ слинопеченіе; а шѣ, у коихъ сего нѣтъ, вскорѣ поражаются дрожаніемъ всѣхъ членовъ. Парныя бани, потовыя и проносныя лѣкарства суть въ семъ случаѣ наилучшимъ средствомъ. Наднѣ ванны или купѣли, даже и долговременно употребляемой, всегда ртуть ославшая обрѣшается. Ртуть также найдена и въ той купѣли, въ коей сиживали больные спрдавшіе дрожаніемъ членовъ причиненнымъ отъ поглощенія ртутьныхъ паровъ. Вр. Муррай пишетъ, что старики, отроки, и холоднаго сложенія мужчины и женщины часто отъ употре-

потребленія ршупи дрожаніемъ членовъ; на-
противъ шого люди горячаго сложенія, пое-
лику въ шѣлѣ ихъ ршупьные шарики легчѣ
и скорѣе обращаются, наиболѣе слиношече-
нію подвержены бывають. Онѣ видѣлѣ сал-
даша, который давно зараженъ будучи лю-
боспращною болѣзнію, отъ долговременнаго
ршупи употребленія, пришедши въ крайнее
иснощеніе, спрадалѣ еще ломошою, болью
въ соспавахъ, и язвами бывшими въ носу и
на прочихъ шѣлесныхъ частяхъ, и всегда
послѣ употребленія ршупи всѣ оныя при-
падки еще болѣе усиливались. Но когда онѣ
тому больному ежедневно началъ давань
сурьмы гранѣ по 7, смѣшавъ оную съ золот-
никомъ сахару, прибавляя каждаго дня еще
большее сего количество, а для питья взваѣ
деревъ; тогда болящій чрезъ нѣсколько дней
получилъ поносъ, по шомъ весьма сильно по-
шѣлѣ; послѣ чего ломота умалилась, язвы при-
сыпаемы будучи порошкомъ ломаноса, начали
испочашъ доброй гной, носовыя косточки
гнилью пораженныя, по отдѣленіи согнив-
шихъ бляшекъ исправились, и болящій по
прошествіи немногихъ недѣль совершенно вы-
здоравлилъ.

73. — 160. N. 3. Вр. Пейриллиъ похва-
ляетъ особливо щолочную летучую соль
для врачеванія любоспращной болѣзни. Но
г. Пленкѣ одиножды самъ испыталъ весьма
худое отъ сея соли дѣйствіе. Вр. Муррай

Часть III.

О

пи-

пишетъ, что когда онъ по совѣту вр. Пейрилла далъ предписанное отъ него количество оной больному сирадавшему ядовитою и застарѣлою бѣлою грыжею; то онъ того болящій вдругъ почувствовалъ прежестокій жаръ при испусканіи мочи, которая вонъ истекала, съ кровію смѣшенная. Чего ради онъ ему предписалъ пить много клейкаго отвара, но на другой день бѣлая грыжа совершенно прекратилась, и лѣвое ядро оказалось пораженное опухолью и воспаленіемъ. Другому юношѣ, онъ язвъ любострастной болѣзни жестоко обезображенному, онъ же предписывалъ сіе самое лѣкарство, хотя и съ большею притивъ прежняго осторожностью; но язвы при умноженіи боли начали воспаляться, и болящій столь сильно тосковалъ, что надлежало вовсе оставить упомянутое лѣкарство.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е Ш.

Алфавитное оглавление содержаній.

	страи.
Безгласіе	85
Безобразіе носа	84
Безпрерывный позывъ къ испражненію низомъ.	140
Безсонница	151
Боли	130
Боль костная	136
Болѣзненное теченіе мокротъ	140
Болѣзни внутреннія	122
— Внѣшнія	13
— Выйныя	89
— Горшанныя	—
— Грудныя	137
— Дѣтородныхъ частей	13
— Женскаго пола	102
— Женъ беременныхъ	146
— Закожныя	62
— Изнуришельныя	142
— Костныя	92
— Лихорадочныя	122
— Любострасныя внутреннія и внѣш-	—
нія	13. 122
— Матки	114
— Младенчeskія	147
— Многообразныя	152
— Многосложныя	154
— Носовыя	82
— Очныя	70
— Паховыя	56
— Предстательной желѣзы	44
— Промежности проходной	50


Болѣзни разслабляющія тѣло	128
— Скрышныя	151
— Сосцовѣ	117
— Судорожныя	126
— Сѣменные	40
— Устные	86
— Ушныя	80
— Членовныя	99
Бѣлая грыжа	73
Бѣль	108
Бѣльмо	78
Воздушно-водяная болѣзнь	116
Воспаленіе дѣшор. Частей	106
Воспаленіе предст. желѣзы	44
— Сосцовѣ	117
— Ядерѣ	40
Востаніе плоти	55
Врачебныя предписанія и примѣчанія	162. 182
Главоболѣніе	130
Глухота	80
Гниль внутрь-костная	96
Гноетеченіе задняго прохода	141
— Очное	73
— Ушное	80
Жаба	90
— Загноеніе очной камеры	76
— Задохѣ	137
Залупа незалупная	34
Запорѣ мочи	22
Затвердѣлость дѣшор. частей	108
— Сала или шука	62
— Ядерѣ	41
Зобѣ выйный	89
Зудѣ	67

Изсушеніе тѣла	-	142
Кашель	-	138
Колошье грудное	-	132
— ВЪ животѣ	-	153
Корча плоти	-	37
Костеѣдица	-	95
Костная опухоль	-	92
Костный наростѣ	-	94
Лихорадка воспалишельная	-	123
— Желчная	-	124
— Медлѣнная	-	—
— Перемежающаяся	-	125
— Простая любоспращная	-	122
Лишаи	-	65
Ломкость костей	-	98
Ломота	-	134
Молочница	-	86
Мочезадержаніе	-	22
Мочешеченіе гнойное	-	141
Напряженіе дѣтор. уда	-	35
Наращеніе задняго прохода	-	53
Наростѣ кости	-	94
Нарывѣ предстательной желѣзы	-	46
Насморкѣ	-	82
Невстаниха	-	39
Незалупа	-	32
Низпаденіе власовѣ	-	66
Одышка	-	137
Окоболѣніе	-	70
Окрѣплость предстат. желѣзы	-	48
Опухоли задняго прохода	-	53
Опухоль костная	-	92
Опухоль членовѣ	-	99
Падучая немочь	-	127

Параличь нижнихъ удовъ	128
Половины шѣла	129
Паховики	56
Помраченіе зрѣнія	79
Порча ногтей	67
Похоть любострастная	57
Прекращеніе кровоочищенія	114
Предохраненіе отъ любостр. болѣзни	160
Пріапизмъ	35
Проказа	68
Простуда	135
Пузырки кристалловидные	26
Пупырышки дѣшороднаго уда	27
Закожные	64
Пятна закожныхъ	62
Роговой оболочки	74
Ракъ сосцовъ	119
Размягченіе костей	97
Свербежъ	67
Свищъ задняго прохода	52
Промежности проходной	50
Слезный	77
Скирръ предстоящей желѣзы	48
Скорченіе плоти	36
Слабость	128
Слиноотеченіе	140
Слѣпоота	79
Сожатіе задняго прохода	53
Сорашенія членовъ	100
Сирупъ головныя	65
Судорга повсюдная	126
Теченіе бѣли	102
Трудное мочетеченіе	20
Трѣщины	63

Хрипота	139
Чахотка	145
Чесошка	63
— Бранная	89
Шанкръ	29
Шиагра	135
Язвы дѣтородныхъ частей	109
— Закожные	69
— Машки	115
— Мочеиспускательнаго сѣзвѣла	31
— Мошенки	42
— Нѣбныя	88
— Носовыя	83
— Плѣшки	28
— Роговой очной оболочки	75
— Рукава машки	111
— Сосцы	118
Ячменецъ	77

Третьей и послѣдней части конецъ.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8

Centimetres

TIFFEN® Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

